

**ANALIZĂ MATEMATICĂ I**

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 F}{\partial y \partial x}$$

# PREFAȚĂ

În ultimile decenii, majoritatea disciplinelor de matematică și-au schimbat mult aspectul fie printr-o precizare a conținutului, fie adoptând o formă nouă de expunere care să corespundă procesului general de modernizare a matematicii. Evident că, analiza matematică nu poate rămâne în afara acestei evoluții. Dacă nu poate fi vorba de o schimbare de fond a conținutului analizei matematice, în schimb credem că forma de expunere trebuie să sufere unele modificări.

În ansamblul disciplinelor care fac parte din planul de învățământ al unei facultăți tehnice, analiza matematică trebuie să se coreleze cu alte discipline ca algebra, matematici speciale, analiză numerică și altele.

În cartea de față pe care autorii o prezintă, printre altele o importanță deosebită s-a acordat modernizării ca formă a analizei matematice. O modernizare exagerată și forțată în detrimentul conținutului clasic al analizei matematice ar constitui un eșec. Din această cauză una din direcțiile importante a fost aceea de a găsi măsura potrivită de expunere care să echilibreze într-un tot forma și conținutul, intuiția rămânând în unele locuri o metodă de bază pentru înțelegerea anumitor noțiuni.

Cartea "**Analiză matematică I**" constituie un prim volum al unei serii de lucrări dedicate studiului unor capitole importante ale analizei matematice moderne. În volumul de față sunt studiate unele noțiuni fundamentale, cum ar fi cele de limită, continuitate, diferențiabilitate, schimbări de variabilă și de funcție, folosindu-se conceptul de spațiu topologic și spațiu metric.

Am ales acest cadru întrucât permite, pe de o parte, o tratare unitară a unor probleme fundamentale, fiind suficient de larg pentru a include principalele probleme ce intervin frecvent în diferite domenii teoretice și practice, iar pe de altă parte, permite o deschidere spre abordarea lor într-un cadru mai general.

Având în vedere că problemele care fac obiectul analizei matematice nu sunt ușor accesibile, am urmărit introducerea motivată a noțiunilor și problemelor, o tratare care să se sprijine pe exemple cât mai sugestive și am încheiat fiecare capitol cu un paragraf de **exerciții rezolvate** în care sunt prezentate un număr mare de exerciții de dificultăți diferite rezolvate complet.

Cartea se încheie cu un capitol ce propune spre rezolvare un număr foarte mare de exerciții corespunzătoare fiecărui capitol tratat, din dorința de a da posibilitatea cititorului să se autoverifice în ce grad a înțeles noțiunile prezentate.

Sperăm ca lucrarea să fie utilă atât studenților ce studiază în programa universitară analiza matematică, profesorilor de licee care-și pregătesc examenle de definitivat sau grad, cât și tuturor celor care doresc să învețe și să aprofundeze matematica modernă a zilelor noastre, facilitându-le înțelegerea mai precisă și mai aprofundată a unor noțiuni și modele matematice de mare finețe.

Autorii

# CUPRINS

CUPRINS.....	5
CAPITOLUL I RELAȚII MULȚIMI NUMĂRABILE ȘI NENUMĂRABILE .....	7
1. Relații. Definiție. Proprietăți generale.....	7
2. Tipuri de relații .....	8
3. Numere cardinale.....	10
4. Exerciții rezolvate.....	12
CAPITOLUL II SPAȚIU TOPOLOGIC. SPAȚIU METRIC. SPAȚIU BANACH .....	19
1. Spațiu topologic .....	19
2. Caracterizarea topologică a punctelor unei mulțimi .....	21
3. Spațiu metric .....	23
4. Normă. Spațiu vectorial normat.....	25
5. Exerciții rezolvate.....	29
CAPITOLUL III CARACTERIZAREA TOPOLOGICĂ A MULȚIMILOR. ȘIRURI ÎN SPAȚII TOPOLOGICE, ȘIRURI ÎN SPAȚII METRICE, ȘIRURI ÎN SPAȚII VECTORIALE NORMATE. ....	39
1. Mulțimi mărginite.....	39
2. Tipuri de mulțimi.....	44
2.1. Mulțimi compacte.....	44
2.2. Mulțimi conexe.....	45
3. Șiruri în spații topologice, spații metrice, spații vectoriale normate .....	46
5. Subșiruri. Principiul contracției.....	54
6. Exerciții rezolvate.....	58
CAPITOLUL IV SERII .....	69
1. Serii. Generalități .....	69
2. Serii cu termeni pozitivi .....	73
3. Serii cu termeni oarecare.....	83
4. Exerciții rezolvate.....	89
CAPITOLUL V ȘIRURI ȘI SERII DE FUNCȚII.....	103
1. Șiruri de funcții .....	103
2. Serii de funcții .....	110
3. Serii de puteri.....	114
4. Formula Taylor pentru polinoame și funcții .....	118
5. Seria Taylor.....	123
6. Exerciții rezolvate.....	130
CAPITOLUL VI FUNCȚII REALE ȘI FUNCȚII VECTORIALE.....	145
1. Limită. Definiții. Proprietăți generale .....	145
2. Continuitatea.....	151

3. Exerciții rezolvate .....	159
CAPITOLUL VII DERIVATA ȘI DIFERENȚIALA .....	171
1. Derivata .....	171
2. Diferențiala .....	184
3. Unele aplicații ale diferențialei .....	190
4. Exerciții rezolvate .....	199
CAPITOLUL VIII FUNCȚII IMPLICITE. DEPENDENȚĂ FUNCȚIONALĂ. SCHIMBĂRI DE VARIABILĂ .....	225
1. Funcții implicite .....	225
2. Sisteme de funcții implicite .....	233
3. Dependență funcțională .....	236
4. Extreme condiționate .....	241
5. Schimbări de variabilă și funcții .....	247
6. Exerciții rezolvate .....	253
CAPITOLUL IX EXERCIȚII PROPUSE .....	269
BIBLIOGRAFIE .....	299

# CAPITOLUL I

## RELAȚII. MULȚIMI NUMĂRABILE ȘI NENUMĂRABILE

### 1. Relații. Definiție. Proprietăți generale

Se consideră cunoscute noțiunile de: mulțime, clasă, operații cu mulțimi și logică matematică.

**Definiția 1.1.1.** Fie  $A$  și  $B$  două mulțimi oarecare. Se numește **relație de corespondență** între mulțimile  $A$  și  $B$  tripletul notat astfel:  $\mathfrak{R} = (G; A; B)$  unde:

- $G = A \times B$ , numit graficul (graful) relației  $\mathfrak{R}$ ;
- $A$  - domeniul de definiție sau sursa relației  $\mathfrak{R}$ ;
- $B$  - codomeniul sau adresa relației  $\mathfrak{R}$ ;

#### Observația 1.1.1.

- a) Dacă  $B \equiv A$  atunci relația  $\mathfrak{R}$  este notată cu  $(G, A)$  și se numește relație în  $A$ , iar graficul său este mulțimea  $G \subseteq A^2$ .
- b)  $(x, y) \in G$  dacă și numai dacă  $x \mathfrak{R} y$ ; ( $x$  este în relația  $\mathfrak{R}$  cu  $y$ );
- c)  $(x, y) \notin G$  dacă și numai dacă  $x \bar{\mathfrak{R}} y$ ; ( $x$  nu este în relația  $\mathfrak{R}$  cu  $y$ );
- d) Fie  $P(A \times B)$  numărul părților mulțimii  $A \times B$ . Mulțimea tuturor relațiilor  $\mathfrak{R} = (G; A; B)$  este în **corespondență biunivocă** cu mulțimea  $P(A \times B)$ .
- e) Dacă  $\text{card} A = n$ , atunci  $\text{card} P(A) = 2^n$ . Într-adevăr  $C_n^k$  prin definiție reprezintă mulțimea tuturor submulțimilor cu  $k$  elemente formate dintr-o mulțime cu  $n$  elemente și  $C_n^0 + C_n^1 + \dots + C_n^k + \dots + C_n^n = 2^n$

*Exemplu:*

- a)  $A = \{1, 2, 3\}$ ,  $P(A) = \{1, \{1\}, \{2\}, \{3\}, \{1, 2\}, \{1, 3\}, \{2, 3\}, \{1, 2, 3\}\}$   
 $\{2\} \in P(A)$ ,  $\{2\} \subset A$ ,  $2 \in A$
- b) Dacă  $M$  este o mulțime și  $P(M)$  mulțimea părților lui  $M$ , atunci mulțimea  $G = \{(a, A) \in A \times P(M) \mid a \in A\}$  este graficul relației de apartenență.

**Definiția 1.1.2.** Fie  $A$  și  $B$  două mulțimi oarecare și  $\mathfrak{R} = (G; A; B)$  o relație între cele două mulțimi. Se numește **relație inversă** (reciprocă sau simetrică) a relației  $\mathfrak{R}$  relația  $\mathfrak{R}^{-1} = (G^{-1}; B; A)$  definită astfel:

$(x, y) \in G^{-1}$  dacă și numai dacă  $(x, y) \in G$  sau  $y \mathfrak{R}^{-1} x$  dacă și numai dacă  $x \mathfrak{R} y$ .

**Definiția 1.1.3.** Fie  $A, B, C$  trei mulțimi oarecare și  $\mathfrak{R}_1 = (G_1; A; B)$  și  $\mathfrak{R}_2 = (G_2; B; C)$  două relații oarecare. Relația  $\mathfrak{R} = \mathfrak{R}_2 \circ \mathfrak{R}_1$ , dată de tripletul  $(G, A, C)$ , în cazul în care există, se numește **compusa relațiilor**  $\mathfrak{R}_1$  și  $\mathfrak{R}_2$  și este definită astfel:

$x \mathfrak{R} z$  dacă și numai dacă există  $y \in B$  astfel încât  $x \mathfrak{R}_1 y$  și  $y \mathfrak{R}_2 z$ .

**Propoziția 1.1.1.** Dacă  $\mathfrak{R}_1 = (G_1; A; B)$ ,  $\mathfrak{R}_2 = (G_2; B; C)$  și există  $\mathfrak{R} = \mathfrak{R}_2 \circ \mathfrak{R}_1$ , atunci există  $\mathfrak{R}^{-1}$  și are loc relația:

$$\mathfrak{R}^{-1} = (\mathfrak{R}_2 \circ \mathfrak{R}_1)^{-1} = \mathfrak{R}_1^{-1} \circ \mathfrak{R}_2^{-1}$$

**Propoziția 1.1.2.** Compunerea relațiilor este o operație asociativă, adică, dacă  $\mathfrak{R}_1, \mathfrak{R}_2, \mathfrak{R}_3$  sunt relații care se pot compune în ordinea  $\mathfrak{R}_3 \circ \mathfrak{R}_2 \circ \mathfrak{R}_1$  atunci:

$$(\mathfrak{R}_3 \circ \mathfrak{R}_2) \circ \mathfrak{R}_1 = \mathfrak{R}_3 \circ (\mathfrak{R}_2 \circ \mathfrak{R}_1) = \mathfrak{R}_3 \circ \mathfrak{R}_2 \circ \mathfrak{R}_1$$

**Observația 1.1.2.** Relația este generalizarea noțiunii de funcție, adică:

Fie  $\mathfrak{R} = (G; A; B)$  o relație care verifică proprietatea:

$x \mathfrak{R} y$  și  $x \mathfrak{R} z$  rezultă  $y = z$ , atunci relația  $\mathfrak{R}$  este funcția  $f : A \rightarrow B$ .

## 2. Tipuri de relații

Aici se definesc câteva tipuri de relații care sunt foarte întâlnite în practică.

**Definiția 1.2.1.** Dacă  $\mathfrak{R} = (G, A)$  îndeplinește următoarele proprietăți:

1<sup>0</sup>  $x \mathfrak{R} y$  implică  $y \mathfrak{R} x$ , pentru orice  $x, y \in A$  (simetria);

2<sup>0</sup>  $x \mathfrak{R} x$ , pentru orice  $x \in A$  (reflexivitatea);

3<sup>0</sup>  $x \mathfrak{R} y$  și  $y \mathfrak{R} z$  implică  $x \mathfrak{R} z$ , oricare ar fi  $x, y, z \in A$  (tranzitivitatea), atunci  $\mathfrak{R}$  se numește **relație de echivalență** în mulțimea  $A$ .

**Definiția 1.2.2.** Dacă relația  $\mathfrak{R} = (G, A)$  verifică proprietatea [ $x \mathfrak{R} y$  și  $y \mathfrak{R} x$ , implică  $x = y$ ] atunci relația  $\mathfrak{R}$  este o **relație antisimetrică**.

**Definiția 1.2.3.** O relație  $\mathfrak{R}$  definită în mulțimea  $A$  care este reflexivă și antisimetrică se numește **relație de preordine**.

Orice relație de preordine care este și tranzitivă se numește **relație de ordine**.

**Exemple:**

a) Fie  $A$  și  $B$  două mulțimi oarecare, relația " $\sim$ " numită relația de echipotență definită astfel:

$A \sim B$  dacă și numai dacă există  $f : A \rightarrow B$ ,  $f$  bijectivă; este o relație de echivalență.

Rezolvare:

1<sup>0</sup>  $A \sim A$  Într-adevăr dacă se consideră funcția identică:

$$1_A : A \rightarrow A, 1_A(x) = x$$

Este evident că această funcție este o funcție bijectivă.

Conform cu definiția relației " $\sim$ " se obține:  $A \sim A$ .

2<sup>0</sup>  $A \sim B$  implică  $B \sim A$ .

Într-adevăr din  $A \sim B$  rezultă că există  $f : A \rightarrow B$  bijectivă; dar se știe că orice funcție bijectivă este și inversabilă și inversa sa este bijectivă. Deci există  $f^{-1} : B \rightarrow A$  bijectivă din care rezultă  $B \sim A$ .

3<sup>0</sup> Trebuie arătat că  $A \sim B$  și  $B \sim C$  implică  $A \sim C$ . Într-adevăr din faptul că  $A \sim B$  și  $B \sim C$  rezultă că există  $f : A \rightarrow B$  bijectivă și  $g : B \rightarrow C$  bijectivă; deci există  $h : A \rightarrow C$ ;  $h = g \circ f$  bijectivă. Atunci  $A \sim C$ . Verificând 1<sup>0</sup>–3<sup>0</sup> din definiția 1.2.1. s-a demonstrat că relația de echipotență este o relație echivalentă.

b) În mulțimea numerelor reale se știe că există relația " $\leq$ " definită astfel:  $x \leq y$  dacă  $x$  are imaginea pe axa reală la stânga imaginii lui  $y$ .

Relația " $\leq$ " este o relație de ordine pe mulțimea numerelor reale.

1<sup>0</sup>  $x \leq x$  (reflexivitatea):

2<sup>0</sup>  $x \leq y$  și  $y \leq x$  implică  $x = y$  (antisimetria);

3<sup>0</sup>  $x \leq y$  și  $y \leq z$  implică  $x \leq z$  (tranzitivitatea).

Orice mulțime înzestrată cu o relație de ordine de numește **mulțime ordonată**.

**Definiția 1.2.4.** Fie  $\mathfrak{R} = (G, A)$  o relație de echivalență definită în mulțimea  $A$  și  $x \in A$ , un element oarecare a lui  $A$ , atunci mulțimea notată astfel  $\hat{x}$  sau  $C_x$  și definită astfel  $\hat{x} = C_x = \{y \in A / y \mathfrak{R} x\}$  poartă denumirea de **clasă de echivalență** a elementului  $x$ , definită de relația de echivalență  $\mathfrak{R}$ .

**Definiția 1.2.5.** Mulțimea tuturor claselor de echivalență a mulțimii  $A$  definită de relația de echivalență  $\mathfrak{R}$  se numește **mulțimea cât** a mulțimii  $A$ , determinată de relația de echivalență  $\mathfrak{R}$  și se notează astfel:  $A/\mathfrak{R}$  ( $A$  factorizat la  $\mathfrak{R}$ ).

**Propoziția 1.2.1.** Fie  $\mathfrak{R} = (G, A)$  o relație de echivalență a mulțimii  $A$  ; atunci au loc relațiile:

- a)  $x \in C_2 = \hat{x}$  , pentru orice  $x \in A$  ;
- b)  $\hat{x} = \hat{y}$  dacă și numai dacă  $x \mathfrak{R} y$  .

Demonstrație:

- a) Fie  $x \in A$  un element oarecare, deoarece  $\mathfrak{R} = (G, A)$  este o relație de echivalență, datorită reflexivității acestei relații se poate scrie că  $x \mathfrak{R} x$  deci  $x \in \hat{x}$  .
- b) " $\Rightarrow$ " Se presupune că  $\hat{x} = \hat{y}$  ; rezultă  $x, y \in \hat{y}$  rezultă  $x \mathfrak{R} y$  sau  $y \mathfrak{R} x$  .  
" $\Leftarrow$ " Să presupunem că  $x \mathfrak{R} y$  și trebuie să demonstrăm că  $\hat{x} = \hat{y}$  , dar pentru aceasta trebuie arătat că:

$$\begin{cases} \hat{y} \subseteq \hat{x} \\ \hat{x} \subseteq \hat{y} \end{cases} .$$

Fie  $z \in \hat{x}$  trebuie arătat că  $z \in \hat{y}$  ; într-adevăr din faptul că  $z \in \hat{x}$  rezultă  $z \mathfrak{R} x$ , dar din ipoteză se știe că  $x \mathfrak{R} y$  , cum relația  $\mathfrak{R}$  este o relație de echivalență ea este și tranzitivă rezultă  $z \mathfrak{R} y$ . Deci  $z \in \hat{y}$  rezultă  $\hat{x} \subseteq \hat{y}$  .

Cealaltă incluziune se demonstrează în mod asemănător.

**Observația 1.2.1.**

- a) Din propoziția 1.2.1 rezultă că două clase de echivalență ori sunt disjuncte ori sunt egale și este evident că  $A = \bigcup_{x \in A} \hat{x}$  .
- b) Orice relație de echivalență pe  $A$  determină o partiție a acestei mulțimi în clase de echivalență modulo  $\mathfrak{R}$  .

### 3. Numere cardinale

Într-unul din exemplele anterioare s-a definit noțiunea de "echipotență" și s-a arătat că această relație este o relație de echivalență. Cu ajutorul acestei relații se definesc numerele cardinale și se clasifică mulțimile după numărul elementelor lor.

**Definiția 1.3.1.** Fie  $A$  o mulțime oarecare, dacă  $A \sim N$  se spune că  $A$  este o **mulțime numărabilă**. (Orice mulțime echipotentă cu mulțimea numerelor naturale este o mulțime numărabilă).

**Exemplu:**

- 1.  $\mathbb{N}_{2p}, \mathbb{N}_{2p+1}$  - sunt mulțimi numărabile
- 2.  $\mathbb{Q}$  mulțime numărabilă (Exercițiu)

Rezolvare:



1. După cum se știe, pentru a arăta că mulțimea  $\mathbb{N}_{2^p}$  este numărabilă trebuie arătat că este echipotentă cu  $\mathbb{N}$ ; adică trebuie construită o funcție cu domeniul  $\mathbb{N}$  și codomeniul  $\mathbb{N}_{2^p}$  funcție care să fie bijectivă.

Fie  $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{2^p}$ ,  $f(n) = 2n$  este evident că această funcție este atât injectivă, cât și bijectivă.

În mod asemănător se arată că  $\mathbb{N} \sim \mathbb{N}_{2^{p+1}}$ , construind funcția

$$f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}_{2^{p+1}}, f(n) = 2n + 1.$$

Fie  $T$  mulțimea totală și  $P(T)$  mulțimea părților acestei mulțimi. Fie  $A \in P(T)$  o mulțime oarecare.

**Definiția 1.3.2.** Mulțimea  $\mathbb{C}_A = \{B \in P(T) / B \sim A\}$  se numește **cardinalul mulțimii A** sau **clasa de echivalență** definită de  $A$  în mulțimea  $P(T)$ .

Dacă:

$A$  are un element rezultă  $\mathbb{C}_A = 1$

$A$  are două elemente  $\mathbb{C}_A = 2$

$A \sim \mathbb{N}$ , atunci  $\mathbb{C}_A = \aleph_0$  se citește “alef zero” și reprezintă cel mai mic infinit.

$A \sim \mathbb{R}$ , atunci  $\mathbb{C}_A = \aleph_1$  se citește “puterea continuului” și este un infinit mai mare decât  $\aleph_0$ .

**Definiția 1.3.3.** O mulțime infinită care nu este echipotentă cu mulțimea numerelor naturale se numește **mulțime nenumărabilă**.

O categorie foarte importantă de mulțimi nenumărabile sunt mulțimile sin clasa de echivalență puterea continuului, adică cele echipotente cu mulțimea numerelor reale.

Cu numerele cardinale se pot defini operații de adunare, înmulțire și ridicare la putere (când numerele cardinale sunt finite aceste operații se cunosc). Definiția ce urmează pentru aceste operații poate fi folosită și în cazul în care numerele cardinale sunt infinite.

**Definiția 1.3.4.** Fie  $n = \text{card } A$ ,  $m = \text{card } B$ , unde  $A$  și  $B$  sunt două mulțimi oarecare din  $P(T)$ .

$$1^0 \quad n + m = \text{card } (A \cup B); \quad A \cap B = \emptyset$$

$$2^0 \quad n \times m = \text{card } (A \times B)$$

$$3^0 \quad n^m = \text{card } A^B$$

$A^B = \{f / f: B \rightarrow A\}$  - mulțimea tuturor funcțiilor ce pot fi definite  $p \in B$  cu valori în  $A$ .

$$\text{Exemplu: } \aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0 \quad A = \mathbb{N}_{2^p}, B = \mathbb{N}_{2^{p+1}}$$

$$A \cup B = \mathbb{N}_{2^p} \cup \mathbb{N}_{2^{p+1}} = \mathbb{N}$$

Mulțimea tuturor numerelor cardinale infinite este o mulțime ordonată care are un prim element și aceste este  $\aleph_0$ , dar care nu are un ultim element (deci cu alte cuvinte mulțimea numerelor cardinale infinite nu este mărginită superior, vezi exercițiul 5b).

**Propoziția 1.3.4. (TEOREMA LUI CANTOR):** Mulțimea tuturor numerelor reale cuprinse în intervalul  $[0,1]$  este o mulțime nenumărabilă.

Demonstratie: Se presupune prin absurd că mulțimea numerelor reale din intervalul  $[0,1]$  este numărabilă; atunci aceste numere pot fi puse în corespondență biunivocă cu termenii unui șir după cum urmează:

$$\begin{aligned} b_1 &= 0, a_1^1 a_2^1 a_3^1 \dots a_n^1 \dots \\ b_2 &= 0, a_1^2 a_2^2 a_3^2 \dots a_n^2 \dots \\ &\vdots \\ b_n &= 0, a_1^n a_2^n a_3^n \dots a_n^n \dots \\ &\vdots \end{aligned}$$

unde:  $a_i^j \in \{0,1,2,3,\dots,9\}$

Se arată prin construcție că mai există încă un număr subunitar care nu face parte din șirul anterior. Într-adevăr dacă se consideră numerele:

$$b = 0, a_1 a_2 a_3 \dots a_n \dots$$

unde:

$$a_1 \neq 0; a_1 \neq 9; a_1 \neq a_1^1$$

$$a_2 \neq 0; a_2 \neq 9; a_2 \neq a_2^2$$

$\vdots$

$$a_n \neq 0; a_n \neq 9; a_n \neq a_n^n$$

$\vdots$

Se observă că:

$$b \neq b_1 \text{ cel puțin prin prima cifră}$$

$$b \neq b_2 \text{ cel puțin prin a doua cifră}$$

$\vdots$

$$b \neq b_n \text{ cel puțin prin a } n \text{-a cifră}$$

$\vdots$

Deci acest număr  $b$  este subunitar, dar nu face parte din mulțimea  $\{b_n\}_{n \geq 1}$ , ceea ce arată că presupunerea că numerele reale din intervalul  $[0,1]$  este o mulțime numărabilă este falsă.

## 4. Exerciții rezolvate

**Exercițiul 1.4.1.** Fie relațiile binare  $R_1, R_2, R_3$  care au următoarele grafice:

$$G_{R_1} = \{(1,1), (1,2), (2,2), (3,2)\}$$

$$G_{R_2} = \{(1,2), (1,3), (2,2)\}$$

$$G_{R_3} = \{(1,2), (2,3)\}$$

- Să se determine domeniul, codomeniul și simetricile acestor relații
- Să se studieze reflexivitatea, simetria, antisimetria și tranzitivitatea acestor relații

Rezolvare:

- Fie  $A$  și  $B$  două mulțimi. Dacă  $\forall x \in A$  și  $\forall y \in B$ ,  $x R y$  atunci  $A = \text{Dom}R$  (domeniul lui  $R$ ),  $B = \text{Ran}R$  (codomeniul lui  $R$ ).

Ținând cont de acestea se observă că:

$$G_{R_1^{-1}} = \{(1,1), (2,1), (2,2), (2,3)\}$$

$$G_{R_2^{-1}} = \{(2,1), (3,1), (2,2)\}$$

$$G_{R_3^{-1}} = \{(3,1), (3,2)\}$$

$$\text{Dom}R_1 = \{1,2,3\}; \text{Dom}R_2 = \{1,2\}; \text{Dom}R_3 = \{1,2\}.$$

$$\text{Ran}R_1 = \{1,2\}; \text{Ran}R_2 = \{2,3\}; \text{Ran}R_3 = \{2,3\}.$$

- $R$  este simetrică dacă  $G_{R^{-1}} \subseteq G_R$

$R$  este reflexivă dacă  $G_{I_A} \subseteq G_R$

$R$  este antisimetrică dacă  $G_R \cap G_{R^{-1}} \subseteq G_{I_A}$

$R$  este tranzitivă dacă  $G_{R \circ R} \subseteq G_R$

Este evident că  $G_{R_1^{-1}} \not\subseteq G_{R_1}$ ;  $G_{R_2^{-1}} \not\subseteq G_{R_2}$  și  $G_{R_3^{-1}} \not\subseteq G_{R_3}$ . Deci relațiile

$R_1, R_2, R_3$  nu sunt simetrice.

S-a arătat că  $\text{Dom}R_1 = \{1,2,3\} = A_1$ .

$$G_{I_{A_1}} = \{(1,1), (2,2), (3,3)\}$$

Cum  $G_{R_1} \cap G_{R_1^{-1}} = \{(1,1), (2,2)\} \subset G_{I_{A_1}}$  rezultă că  $R_1$  este antisimetrică.

Analog se arată că  $R_2$  și  $R_3$  sunt antisimetrice.

Cum  $G_{I_{A_1}} = \{(1,1), (2,2), (3,3)\} \not\subseteq \{(1,1), (1,2), (2,2), (3,2)\} = G_{R_1}$  rezultă că  $R_1$  nu este reflexivă. Analog se arată că  $R_2$  și  $R_3$  nu sunt reflexive.

Cum  $G_{R_1 \circ R_1} = \{(1,1), (1,2), (2,2), (3,2)\} = G_{R_1}$  atunci  $R_1$  este tranzitivă. Se observă că  $(1,2) \in G_{R_3}$ ,  $(2,3) \in G_{R_3}$ ,  $(1,3) \notin G_{R_3}$ . Deci  $G_{R_3 \circ R_3} \not\subseteq G_{R_3}$ . Așadar,  $R_3$  nu este tranzitivă.

**Exercițiul 1.4.2.** Fie relația  $R$  care are următorul grafic:  
 $G_R = \{(m, n) \mid m, n \in \mathbb{Z}, m \mid n\}$ . Să se arate că  $R$  este o relație de preordine pe  $\mathbb{Z}$ .

Rezolvare:

Pentru ca relația  $R$  să fie relație de preordine trebuie ca  $R$  să fie reflexivă și tranzitivă.

Este evident că  $G_{I_{\mathbb{Z}}} = \{(m, n) \mid m \in \mathbb{Z}\}$  și de asemenea este evident că  $G_{I_{\mathbb{Z}}} \subseteq G_R$ . Deci  $R$  este tranzitivă. Cum  $R$  este reflexivă și tranzitivă, rezultă că  $R$  este o relație de preordine.

**Exercițiul 1.4.3.** Fie  $R$  o relație al cărei grafic este  
 $G_R = \{(m, n) \mid m \in \mathbb{Z}, n \in \mathbb{Z}; 3 \mid m - n\}$ .

Să se arate că:

- $R$  este o relație de echivalență pe  $\mathbb{Z}$ .
- Să se scrie clasa de echivalență  $\hat{x}$ ,  $x \in \mathbb{Z}$
- Să se determine mulțimea factor  $\mathbb{Z}/R$ .

Rezolvare:

a) Trebuie arătat că  $R$  este reflexivă, simetrică și tranzitivă.

Cum  $3 \mid x - x$  ( $\forall$ )  $x \in \mathbb{Z}$  se obține că  $G_{I_{\mathbb{Z}}} \subset G_R$ . De aici rezultă că  $R$  este reflexivă. Cum  $3 \mid m - n \Rightarrow 3 \mid n - m$  se obține că  $G_{R^{-1}} = G_R$ . De aici rezultă că  $R$  este simetrică.

Deoarece  $3 \mid m - n$  și  $3 \mid n - p$  implică  $3 \mid m - p$  se obține că  $G_{R \circ R} \subseteq G_R$ . De aici rezultă că  $R$  este reflexivă, simetrică și tranzitivă. Deci  $R$  este relație de echivalență.

$$b) \hat{x} = \{y \in \mathbb{Z} \mid 3 \mid y - x, x \in \mathbb{Z}\} = \{3k + x \mid k \in \mathbb{Z}, x \in \mathbb{Z}\}$$

c) Dacă  $x > 3$  atunci  $x = 3k + r$ ,  $r \in \{0, 1, 2\}$ . Atunci  $x - r = 3k$ .

$$\Rightarrow \hat{r} = \{x \in \mathbb{Z} \mid x - r = 3k\} = \hat{x}. \text{ Deci } \hat{x} = \hat{r}$$

$$\text{Dar } \hat{0} = \{3k\}_{k \in \mathbb{Z}}; \hat{1} = \{3k + 1\}_{k \in \mathbb{Z}}; \hat{2} = \{3k + 2\}_{k \in \mathbb{Z}}.$$

De aici rezultă că mulțimea factor  $\mathbb{Z}/R$  este  $\mathbb{Z}/R = \{\hat{0}, \hat{1}, \hat{2}\}$ .

**Observație:**

Relația  $R$  al cărei grafic este dat în acest exercițiu se poate generaliza la relația  $R^*$  al cărei grafic este  $G_{R^*} = \{(m, n) \mid p \mid m - n, m, n \in \mathbb{Z}, p \in \mathbb{Z}^*\}$ .

Se arată în mod analog că această relație este o relație de echivalență și  $\mathbb{Z}/R^* = \{\hat{0}, \hat{1}, \hat{2}, \dots, \widehat{p-1}\}$ .

Această relație  $R^*$  este relația de congruență modulo  $p$ .

**Exercițiul 1.4.4.** Fie  $A \subset X$  și  $\varphi_A : X \rightarrow S = \{0, 1\}$  astfel încât

$$\varphi_A(x) = \begin{cases} 1, & \text{dacă } x \in A \\ 0, & \text{dacă } x \in X \setminus A \end{cases}$$

Să se arate că pentru  $A, B \subset X$  au loc proprietățile:

- a)  $A = B \Leftrightarrow \varphi_A = \varphi_B$
- b)  $\varphi_{A \cap B} = \varphi_A \cdot \varphi_B$
- c)  $A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow \varphi_{A \cup B} = \varphi_A + \varphi_B$
- d)  $\varphi_{CA} = 1 - \varphi_A$
- e)  $\varphi_{A \setminus B} = \varphi_A - \varphi_A \cdot \varphi_B$
- f)  $\varphi_{A \cup B} = \varphi_A + \varphi_B - \varphi_A \cdot \varphi_B$

**Rezolvare:**

a) Din definiția funcției caracteristice este evident că  $A = B \Leftrightarrow \varphi_A = \varphi_B$ .

b) Din  $x \in A \cap B \Rightarrow x \in A$  și  $x \in B \Rightarrow \varphi_{A \cap B}(x) = 1 \Rightarrow \varphi_A(x) = 1$  și

$$\varphi_B(x) = 1 \Rightarrow \varphi_{A \cap B}(x) = \varphi_A(x) \cdot \varphi_B(x).$$

Dacă  $x \notin A \cap B \Rightarrow x \in A$  și  $x \notin B$  sau  $x \notin A$  și  $x \in B$  sau  $x \notin A$  și  $x \notin B$ .

Deci  $x \notin A \cap B \Rightarrow \varphi_{A \cap B}(x) = 0$  și  $\varphi_A(x) \cdot \varphi_B(x) = 0$ .

Deci  $x \notin A \cap B \Rightarrow \varphi_{A \cap B}(x) = \varphi_A(x) \cdot \varphi_B(x)$ .

c) Se raționează ca la a).

d)  $A \cup CA = X$ ;  $A \cap CA = \emptyset$ . Ținând cont de c) se obține

$$\varphi_A + \varphi_{CA} = 1 \Rightarrow \varphi_{CA} = 1 - \varphi_A.$$

e) Deoarece

$$A - B = A \cap CB \Rightarrow \varphi_{A \setminus B} = \varphi_{A \cap CB} = \varphi_A \cdot \varphi_B = \varphi_A(1 - \varphi_B) = \varphi_A - \varphi_A \cdot \varphi_B.$$

f) Deoarece  $A \cup B = (A \setminus B) \cup (B \setminus A) \cup (A \cap B)$  se obține:

$$\varphi_{A \cup B} = \varphi_{A \setminus B} + \varphi_{B \setminus A} + \varphi_{A \cap B} = \varphi_A - \varphi_A \cdot \varphi_B + \varphi_B - \varphi_A \cdot \varphi_B + \varphi_A \cdot \varphi_B = \varphi_A + \varphi_B - \varphi_A \cdot \varphi_B$$

**Exercițiul 1.4.5.** Fie  $M$  o mulțime oarecare. Să se arate că:

$$\text{card } P(M) = 2^{\text{card}M}$$

**Rezolvare:**

Fie mulțimea  $S = \{0,1\}$  și  $S^M$  mulțimea funcțiilor definite pe  $M$  cu valori în  $A$ .

Se consideră funcția  $f : P(M) \rightarrow S^M$  definită astfel  $f(A) = \varphi_A$  ( $\forall A \subset M$ ).

Este evident că proprietatea  $A = B \Leftrightarrow \varphi_A = \varphi_B$  arată că  $f$  este injectivă.

Surjectivitatea este evidentă. Deci  $f$  este bijectivă. Atunci  $\text{card } P(M) = \text{card } S^M = 2^{\text{card}M}$ .

**Observație:**

Din rezolvarea anterioară rezultă că egalitatea  $\text{card } P(M) = 2^{\text{card}M}$  este adevărată atât pentru  $\text{card}M$  finit cât și infinit. În cazul în care  $\text{card}M$  este finit adică  $\text{card}M = n$  atunci  $\text{card } P(M) = 2^n$  se poate demonstra și astfel:

Se știe că  $P(M)$  este formată din toate submulțimile mulțimii  $M$ . Conform cu definiția combinărilor, numărul submulțimilor cu  $k$  elemente  $0 \leq k \leq n$  care se pot forma dintr-o mulțime cu  $n$  elemente este  $C_n^k$ .

$$\text{Atunci } \text{card } P(M) = C_n^0 + C_n^1 + C_n^2 + \dots + C_n^n = 2^n.$$

**Exercițiul 1.4.6.** Orice reuniune finită sau numărabilă de mulțimi numărabile este o mulțime numărabilă.

Rezolvare:

Exercițiul se mai poate scrie și astfel:

$$\aleph_0 + \aleph_0 + \dots + \aleph_0 = \aleph_0$$

și

$$\aleph_0 + \aleph_0 + \dots + \aleph_0 + \dots = \aleph_0$$

Prima egalitate se arată inductiv.

Se știe că:  $\mathbb{N} = \mathbb{N}_{2n} \cup \mathbb{N}_{2n+1}$  și  $\mathbb{N}_{2n} \cap \mathbb{N}_{2n+1} = \emptyset$  unde  $\mathbb{N}_{2n}$  este mulțimea numerelor naturale pare și  $\mathbb{N}_{2n+1}$  este mulțimea numerelor naturale impare. Se aici rezultă că  $\aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0$ . (1) Se presupune adevărat că  $\underbrace{\aleph_0 + \aleph_0 + \dots + \aleph_0}_{n-1 \text{ ori}} = \aleph_0$  și

se demonstrează că  $\underbrace{\aleph_0 + \aleph_0 + \dots + \aleph_0}_{n \text{ ori}} = \aleph_0$ .

$$\text{Într-adevăr } \underbrace{\aleph_0 + \aleph_0 + \dots + \aleph_0}_{n \text{ ori}} = \left( \underbrace{\aleph_0 + \aleph_0 + \dots + \aleph_0}_{n-1 \text{ ori}} \right) + \aleph_0 = \aleph_0 + \aleph_0 = \aleph_0. \text{ Atunci}$$

conform cu principiul inducției  $\underbrace{\aleph_0 + \aleph_0 + \dots + \aleph_0}_{n \text{ ori}} = \aleph_0$  pentru orice  $n$  finit.

Pentru a demonstra a doua egalitate se procedează astfel:

Fie  $A_k = \{a_0^k, a_1^k, \dots, a_k^k, \dots\}$ ,  $k = 1, 2, \dots$  o familie numărabilă disjunctă de mulțimi numărabile.

Se consideră funcția  $f: \bigcup_{k=0}^{\infty} A_k \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$  definită astfel  $f(a_i^k) = (i, k)$ . Este evident că această funcție este bijectivă. Dacă se arată că mulțimea  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  este numărabilă problema este rezolvată.

Dacă se consideră funcția  $g: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N} \times \mathbb{N}$  unde  $g(n) = (n, 0)$  este evident că această funcție este injectivă. Deci  $\text{card } \mathbb{N} \times \mathbb{N} \geq \aleph_0$ . (1)

Fie  $h: \mathbb{N} \times \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  definită astfel:

$$h(n, m) = n + \frac{(m+n)(m+n+1)}{2}$$

Se arată că această funcție este injectivă.

Fie  $(m,n) \neq (m',n') \Rightarrow m+n \neq m'+n'$ . Fără a micșora generalitatea se consideră  $m'+n' = m+n+1$ ,  $h(m',n') > \frac{(m+n)(m+n+1)}{2} + n = h(m,n)$ .

Deci  $(m,n) \neq (m',n') \Rightarrow h(m,n) \neq h(m',n')$ . Astfel rezultă că funcția  $h$  este injectivă.

Deci  $\text{card } \mathbb{N} \times \mathbb{N} \leq \aleph_0$ . (2)

Din (1) și (2) rezultă că  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  este numărabilă.

**Exercițiul 1.4.7.** Să se arate că orice două intervale de numere reale cu capete finite sunt echipotente.

Rezolvare:

Se arată că  $[0,1] \sim [a,b]$ .

Într-adevăr funcția  $f: [0,1] \rightarrow [a,b]$  definită prin  $f(x) = a + x(b-a)$  este bijectivă. Deci  $[0,1] \sim [a,b]$  (1).

Analog se arată că  $[0,1] \sim [c,d]$  (2).

Cum relația " $\sim$ " este tranzitivă din (1) și (2) se obține că  $[a,b] \sim [c,d]$ .

**Exercițiul 1.4.8.** Orice interval este de puterea continuului.

Rezolvare:

Pentru a rezolva această problemă trebuie arătat că  $(a,b) \sim \mathbb{R}$  ( $\text{card } \mathbb{R} = \aleph_c$ ;  $\aleph_c$  este numărul cardinal infinit numit puterea continuului).

Se consideră funcția  $f: \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \text{tg}x$ . Această funcție este evident bijectivă. Deci  $\left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right) \sim \mathbb{R}$ . Cum  $(a,b) \sim \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right)$  (conform cu exercițiul 7) datorită tranzitivității relației de echipotență  $(a,b) \sim \mathbb{R}$ . Se mai poate spune că  $(a,b) \in \aleph_c$ .

**Exercițiul 1.4.9.** Să se arate că mulțimea numerelor raționale  $\mathbb{Q}$  este numărabilă.

Rezolvare:

Fie  $A_k = \left\{ \frac{m}{k} \mid m = 0, \pm 1, \pm 2, \pm 3, \dots \right\} k \in \mathbb{N}$ .

Este evident că  $\mathbb{Q} = \bigcup_{k=1}^{\infty} A_k$ .

Cum  $A_k \in \aleph_0$ , conform cu Exercițiul 1.4.6.  $\bigcup_{k=1}^{\infty} A_k \in \aleph_0$ .

Deci  $\mathbb{Q}$  este o mulțime numărabilă.

**Exercițiul 1.4.10.** Să se arate că mulțimea numerelor prime  $p$  este o mulțime numărabilă.

Rezolvare:

Pentru a arăta că  $P$  este numărabilă, trebuie arătat că  $P$  nu este finită ( $P \subset \mathbb{N}$  evident).

Se presupune  $P = \{p_1, p_2, \dots, p_n\}$ . Fie  $q = p_1 p_2 \dots p_n + 1$ .  $q$  este evident prim și este mai mare decât toate numerele prime  $p_1, p_2, \dots, p_n$ . Deci  $q \in P$ . Așadar mulțimea numerelor prime nu poate fi finită. Atunci  $P$  este numărabilă.

**Exercițiul 1.4.11.** Să se arate că produsul cartezian al unui număr finit de mulțimi numărabile este o mulțime numărabilă.

Rezolvare:

Ținând cont de operațiile cu numere cardinale, exercițiul se reduce la egalitatea  $\aleph_0^n = \aleph_0$ ,  $n$  finit.

Se demonstrează inductiv.

În rezolvarea exercițiului 1.4.6. s-a arătat că  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  este numărabilă, adică  $\aleph_0 \cdot \aleph_0$  este numărabilă. Se presupune adevărat că  $\aleph_0^{n-1} = \aleph_0$  și se demonstrează că  $\aleph_0^n = \aleph_0$ .

Într-adevăr  $\aleph_0^n = \aleph_0^{n-1} \cdot \aleph_0 = \aleph_0 \cdot \aleph_0 = \aleph_0$ . Atunci conform inducției  $\aleph_0^n = \aleph_0$ , pentru orice  $n$  finit.

**Exercițiul 1.4.12.** Mulțimea șirurilor de numere naturale este o mulțime de puterea continuului.

Rezolvare:

Deoarece mulțimea șirurilor de numere naturale este  $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$ , atunci exercițiul se reduce la egalitatea  $\aleph_0^{\aleph_0} = \aleph_c$ .

Deoarece mulțimea  $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$  conține mulțimea funcțiilor constante, atunci evident că  $\aleph_0^{\aleph_0} \geq \aleph_0$ .

Se presupune că  $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$  este o mulțime numărabilă, adică  $\mathbb{N}^{\mathbb{N}} = \{f_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ .

Se consideră funcția  $g = 1 + f_n$ .

Deoarece  $g \in \mathbb{N}^{\mathbb{N}}$  și  $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$  numărabilă, există  $n \in \mathbb{N}$  astfel încât  $g = f_n$ , atunci  $f_n(n) = 1 + f_n(n) \Rightarrow 1 = 0$  absurd.

Deci  $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$  nu este numărabilă. Așadar,  $\aleph_0^{\aleph_0} > \aleph_0$ . Deci  $\aleph_0^{\aleph_0} = \aleph_c$ .



# CAPITOLUL II

## SPAȚIU TOPOLOGIC. SPAȚIU METRIC. SPAȚIU BANACH

### 1. Spațiu topologic

În matematică există două categorii de structuri:

- structuri algebrice;
- structuri topologice.

Cu ajutorul structurilor algebrice după cum se știe, plecând de la elementele cunoscute ale unei mulțimi, se generează alte elemente ale acesteia.

În cadrul structurilor topologice poate fi definită noțiunea de vecinătate, noțiune cu ajutorul căreia poate fi definită noțiunea de limită, care după cum se știe este o noțiune fundamentală a analizei matematice.

**Definiția 2.1.1.** Fie  $E$  o mulțime oarecare și  $P(E)$  mulțimea părților acestei mulțimi.

Dacă  $\tau \subseteq P(E)$ , satisface proprietățile:

1°  $\Phi \in \tau$ ;  $E \in \tau$

2° Fie  $\mathfrak{I}$  o mulțime de indici și  $A_i \in \tau$ , oricare ar fi  $i \in \mathfrak{I}$  rezultă  $\bigcup_{i \in \mathfrak{I}} A_i \in \tau$

(Orice reuniune de mulțimi din  $\tau$  aparține tot lui  $\tau$ ).

3° Fie  $A_i \in \tau$ ,  $i = \overline{1, n}$  rezultă  $\bigcap_{i=1}^n A_i \in \tau$

(Orice intersecție finită de mulțimi din  $\tau$  este tot o mulțime din  $\tau$ ), atunci  $\tau$  se numește **topologie a mulțimii  $E$** .

Cupletul  $(E, \tau)$  se numește **spațiu topologic**.

**Exemplu:**

a)  $\tau = \{\Phi; E\}$  este o topologie a mulțimii  $E$ .

b)  $\tau = P(E)$  este o topologie a mulțimii  $E$ .

Rezolvare:

Pentru a arăta că aceste mulțimi sunt topologii trebuie verificate cele trei axiome din definiția 2.1.1.

a) 1°  $\Phi \in \tau$ ;  $E \in \tau$  în mod evident.

2° Mulțimea maximală de indici este  $\mathfrak{I} = \{1, 2\}$  pentru că  $\tau$  are două elemente.

$$\Phi \cup E = E \in \tau$$

$$\Phi \cap E = \Phi \in \tau$$

b) 1°  $\Phi \in \tau$  și  $E \in \tau$  în mod evident ținând cont de forma lui  $P(E)$ .

2° Fie  $A_i \in P(E)$ , pentru orice  $i \in \mathfrak{I}$  avem  $\bigcup_{i \in \mathfrak{I}} A_i \in P(E) = \tau$

3° Fie  $A_i \in P(E)$ , pentru orice  $i \in \overline{1, n}$  rezultă  $\bigcap_{i=1}^n A_i \in P(E) = \tau$

**Observația 2.1.1.:**

- Mulțimile oricărei topologii se numesc mulțimi deschise în topologia dată.
- Topologia  $\tau = \{\Phi; E\}$  se numește **topologie banală** a mulțimii  $E$ , iar topologia  $\tau = P(E)$  se numește **topologie discretă** a mulțimii  $E$ .
- Oricare ar fi  $E$  ea poate fi înzestrată cu o structură de spațiu topologic deoarece i se pot asocia cel puțin topologia banală și topologia discretă.

**Definiția 2.1.2.** Fie  $\tau_1$  și  $\tau_2$ , două topologii ale mulțimii  $E$ . Se spune că **topologia  $\tau_2$  este mai fină decât topologia  $\tau_1$** , dacă are loc relația  $\tau_2 \supset \tau_1$  și se notează astfel:  $\tau_2 \geq \tau_1$ .

Relația de finețe definită de definiția 2.1.2 este o relație de ordine pe mulțimea tuturor topologiilor mulțimii  $E$ . În raport cu această relație de ordine, topologia banală este un prim element în mulțimea topologiilor, iar topologia discretă este un ultim element în mulțimea topologiilor.

**Definiția 2.1.3.** Fie  $E$  o mulțime înzestrată cu topologia  $\tau$  și  $x_0 \in E$  un punct oarecare; mulțimea  $V$  este o **vecinătate a punctului  $x_0$** , dacă există o mulțime  $G \in \tau$  astfel încât  $x_0 \in G \subset V$ .

**Exemplu:**

Dacă  $E \equiv \mathbb{R}$  atunci  $\tau_{\mathbb{R}}(x) = \{(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \mid x \in \mathbb{R}, \varepsilon \geq 0\}$  este o topologie pe mulțimea numerelor reale. Această topologie este **topologia naturală a numerelor reale**.

Se verifică 1°-3° din definiția 2.1.1.

Ținând cont de definiția 2.1.3 rezultă că orice interval deschis este o vecinătate pentru orice punct conținut de acest interval.

Fie:

$$V_0 = (-2; 4); x_0 = 0; G = \left(-\frac{1}{2}; \frac{1}{2}\right) \text{ rezultă } 0 \in G \subset V_0.$$

În spațiul topologic  $(\mathbb{R}, \tau_{\mathbb{R}}(x))$  se poate defini noțiunea de mulțime deschisă astfel:

**Definiția 2.1.4.**  $E \subset \mathbb{R}$  este **mulțime deschisă** dacă  $E = \emptyset$  sau oricare ar fi  $x \in E$  există  $r > 0$  astfel încât  $(x - r, x + r) \subset E$ .

O noțiune importantă este noțiunea de topologie indusă. Cu ajutorul acestei noțiuni, pornind de la o topologie dată  $\tau$  se pot crea alte topologii, conform următoarei propoziții:

**Propoziția 2.1.1. (TOPOLOGIA INDUSĂ).** Fie  $(E, \tau)$  - spațiu topologic și  $F \subset E$  o submulțime oarecare a acestuia,  $(\tau$  restrâns la  $F$ ),  $\tau_{|F} = \{F \cap D, D \in \tau\}$  este o topologie pe mulțimea  $F$  și se numește **topologia indusă pe  $F$  de topologia  $\tau$** .

Demonstrație:

Trebuie verificate cele trei axiome din definiția topologiei.

1<sup>0</sup>  $\Phi \in \tau_{|F}$  și  $F \in \tau_{|F}$ . Între-adevăr, deoarece  $\tau$  este o topologie a mulțimii  $E$  și  $\Phi \in \tau$  și  $E \in \tau$ , deci pe rolul lui  $D$  pot fi considerate:

$$\Phi = D$$

sau

$$E = D \text{ rezultă } F \cap D = F \cap \Phi \in \tau_{|F}$$

sau

$$F \cap D = F \cap E \in \tau_{|F}$$

2<sup>0</sup> Fie  $G_i \in \tau_{|F}$  oricare ar fi  $i \in \mathfrak{I}$  rezultă  $\bigcup_{i \in \mathfrak{I}} G_i \in \tau_{|F}$

Între-adevăr, dacă  $G_i \in \tau_{|F}$ , oricare ar fi  $i \in \mathfrak{I}$  rezultă că există  $D_i \in \tau$  astfel încât  $G_i = F \cap D_i$ , pentru orice  $i \in \mathfrak{I}$ ; atunci

$$\bigcup_{i \in \mathfrak{I}} G_i = \bigcup_{i \in \mathfrak{I}} (F \cap D_i) = F \cap \left( \bigcup_{i \in \mathfrak{I}} D_i \right) \in \tau_{|F}.$$

3<sup>0</sup> Fie  $G_i \in \tau_{|F}$ , pentru orice  $i = \overline{1, n}$  rezultă  $\bigcap_{i=1}^n G_i \in \tau_{|F}$ .

Între-adevăr, dacă  $G_i \in \tau_{|F}$ , pentru orice  $i = \overline{1, n}$  există  $D_i \in \tau$  astfel încât  $G_i = F \cap D_i$ , pentru orice  $i = \overline{1, n}$ .

$$\bigcap_{i=1}^n G_i = \bigcap_{i=1}^n (F \cap D_i) = F \cap \left( \bigcap_{i=1}^n D_i \right) \in \tau_{|F}$$

## 2. Caracterizarea topologică a punctelor unei mulțimi

Noțiunea de vecinătate permite clasificarea punctelor unei mulțimi în puncte, în raport cu care se poate defini noțiunea de limită pe mulțimea respectivă.

**Definiția 2.2.1.** Fie  $(E, \tau)$  un spațiu topologic și  $A \subset E$  o mulțime oarecare.

1. Punctul  $x_0 \in E$  se numește **punct interior** al mulțimii  $A$ , dacă există  $V_{x_0}$  (vecinătatea punctului  $x_0$ ) astfel încât  $V_{x_0} \subset A$ .
2. Punctul  $x_0 \in E$  se numește **punct exterior** al mulțimii  $A$ , dacă există  $V_{x_0}$  (vecinătatea punctului  $x_0$ ) astfel încât  $V_{x_0} \subset C_A$  (complementara lui  $A$ ).
3. Punctul  $x_0 \in E$  se numește **punct frontieră** al mulțimii  $A$ , dacă pentru orice  $V_{x_0}$  (vecinătate a punctului  $x_0$ ) are loc relația:

$$V_{x_0} \cap A \neq \Phi \neq V_{x_0} \cap C_A.$$

4. Punctul  $x_0 \in E$  se numește **punct aderent** pentru mulțimea  $A$ , dacă pentru orice  $V_{x_0}$  (vecinătate a punctului  $x_0$ ) are loc relația:

$$V_{x_0} \cap A \neq \Phi.$$

5. Punctul  $x_0 \in E$  se numește **punct de acumulare** pentru mulțimea  $A$ , dacă pentru orice  $V_{x_0}$  (vecinătate a punctului  $x_0$ ) are loc relația:

$$V_{x_0} \cap A \setminus \{x_0\} \neq \Phi.$$

6. Punctul  $x_0 \in E$  se numește **punct izolat** al mulțimii  $A$ , dacă există  $V_{x_0}$  (vecinătate a punctului  $x_0$ ) astfel încât  $V_{x_0} \cap A = \{x_0\}$ .

### Observația 2.2.1.

1. Mulțimea tuturor punctelor interioare mulțimii  $A$  formează **interiorul mulțimii  $A$**  și se notează astfel:  $IntA$  sau  $\overset{0}{A}$ .
2. Mulțimea tuturor punctelor exterioare mulțimii  $A$  formează **exteriorul lui  $A$**  și se notează astfel:  $ExtA$ .
3. Mulțimea tuturor punctelor frontieră ale mulțimii  $A$  formează **frontiera lui  $A$**  și se notează  $FrA$  sau  $\partial A$ .
4. Mulțimea tuturor punctelor aderente mulțimii  $A$  formează **închiderea sau aderența mulțimii  $A$**  și se notează astfel:  $\bar{A}$ .
5. Mulțimea tuturor punctelor de acumulare ale mulțimii  $A$  formează **derivata mulțimii  $A$**  și se notează astfel:  $A'$ .
6. Mulțimea tuturor punctelor izolate ale mulțimii  $A$  formează **partea discretă a mulțimii  $A$**  și se notează astfel:  $IzA$ .

Dacă se consideră  $E \equiv \mathbb{R}$  și  $\tau$  topologia naturală, adică topologia intervalelor deschise simetrice, atunci are loc următoarea propoziție:

### Propoziția 2.2.1.

- a) În topologia naturală a lui  $\mathbb{R}$  interiorul oricărui interval de numere reale este intervalul deschis.
- b) Interiorul oricărei reuniuni de intervale din  $\mathbb{R}$  este reuniunea intervalelor deschise.

Demonstrație:

Fie  $A = [a, b]$  rezultă  $\overset{0}{A} = (a, b)$ . Este evident că spațiul topologic în care se află intervalul  $[a, b]$  este  $\mathbb{R}$  înzestrat cu topologia naturală a intervalelor deschise simetrice. Punctele lui  $\mathbb{R}$  raportate la intervalul  $[a, b]$  sunt de mai multe tipuri după cum urmează:

$$1^\circ x \in \mathbb{R} \mid x < a$$

$$2^\circ x \in \mathbb{R} \mid x \in [a, b]$$

$$3^\circ x \in \mathbb{R} \mid x > b$$

1° Punctele  $x \in \mathbb{R} \mid x < a$ , nu pot să fie puncte interioare ale intervalului  $[a, b]$ . Într-adevăr, oricare ar fi  $x_0 \in \mathbb{R}$  cu  $x_0 < a$  rezultă

$$(x_0 - d, x_0 + d) \not\subset A, \quad d = \frac{|a - x_0|}{2}$$

Orice interval deschis de acest tip nu poate să fie inclus în mulțimea  $A$ . Ceea ce arată că aceste puncte nu sunt puncte interioare lui  $[a, b]$ .

Se consideră  $x_0 = a$ ; în topologia naturală a lui  $\mathbb{R}$ , orice vecinătate a lui  $x_0$  este de forma  $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$ ,  $\varepsilon > 0$ .

Dar se observă că pentru orice  $\varepsilon > 0$   $(a - \varepsilon, a + \varepsilon) \not\subset [a, b]$ , ceea ce arată că nu este un punct interior.

În mod asemănător se arată că punctul  $x_0 = b$  nu este un punct interior al intervalului  $[a, b]$ .

Se arată că oricare ar fi  $x > b$  acesta nu este punct interior al intervalului  $[a, b]$ .

2° Fie  $x_0 \in \mathbb{R} \mid a < x_0 < b$  se notează cu  $d = \inf\{|x_0 - a|, |x_0 - b|\}$ , atunci este evident că intervalul  $\left(x_0 - \frac{d}{2}, x_0 + \frac{d}{2}\right) \subset [a, b] = A$ . Deci rezultă că  $x_0$  este punct

interior al intervalului  $[a, b]$  rezultă  $\overset{0}{A} = \overline{[a, b]} = (a, b)$ . Interiorul oricărui interval de numere reale este intervalul deschis de numerele reale.

Mulțimea vecinătăților în topologia naturală este mult mai bogată decât mulțimea tuturor intervalelor deschise simetrice, centrate în  $x$ .

Dar  $I_x$  (mulțimea tuturor intervalelor deschise simetrice) este un sistem fundamental de vecinătăți pe  $x$ .

### 3. Spațiu metric

Dacă în cadrul structurii de spațiu topologic densitatea elementelor putea fi dată numai cu ajutorul vecinătăților fără a se putea stabili "distanța" dintre

acestea în cadrul structurii de spațiu metric va putea fi stabilită și această “distanță”.

**Definiția 2.3.1. (NOȚIUNEA DE DISTANȚĂ SAU METRICĂ)** Fie  $E$  o mulțime oarecare și aplicația  $d : E \times E \rightarrow \mathbb{R}_+$ .

Dacă:

1°  $d(x,y) > 0$  oricare ar fi  $x,y \in E$  și  $d(x,y) = 0$  dacă și numai dacă  $x = y$ .

2°  $d(x,y) = d(y,x)$ , oricare ar fi  $x,y \in E$

3°  $d(x,y) \leq d(x,z) + d(z,y)$ ,  $(\forall) x,y,z \in E$  (**inegalitatea triunghiului**), atunci aplicația  $d$  este **distanță sau metrică** pe mulțimea  $E$ .

Cupletul  $(E,d)$  poartă denumirea de **spațiu metric**.

**Propoziția 2.3.1.** Orice mulțime  $E$  poate fi metrizabilă (înzestrată cu structură de spațiu metric).

Demonstratie:

Pentru a arăta această afirmație este suficient să se construiască pe  $E \times E$  o aplicație  $d$ , care să verifice axiomele definiției 2.3.1. Într-adevăr dacă se consideră:

$$d : E \times E \rightarrow \mathbb{R}_+, d(x,y) = \begin{cases} 1, & x \neq y \\ 0, & x = y \end{cases}$$

$d$  este o distanță pe  $E$  deoarece verifică toate cele trei axiome.

1° Axioma 1 este evidentă din modulul de construcție;

2° Pentru orice  $x,y \in E \mid x \neq y$  rezultă  $d(x,y) = 1 = d(y,x)$ ;

3° Pentru cazul 3 pot exista mai multe posibilități:

$x \neq y \neq z \neq x$  sau  $x \neq y = z$  sau  $y \neq x = z$  sau  $x = y = z$  etc.

Pentru  $x \neq y \neq z \neq x$  avem

$$d(x,y) = 1, d(x,z) = 1, d(z,y) = 1$$

rezultă

$$d(x,y) = 1 \leq 1 + 1 = d(x,z) + d(z,y).$$

În mod analog se demonstrează axioma 3 pentru celelalte cazuri, astfel rezultă că orice mulțime poate fi metrizabilă.

**Observația 2.3.1.** Pe o mulțime  $E$  pot fi considerate mai multe metrici care au proprietatea că pe acea mulțime una măsoară mai fin decât cealaltă.

**Exemple:**

Aplicațiile definite mai jos sunt metrici sau distanțe pe mulțimile specificate:

a)  $d : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}_+$   $d(x,y) = |x - y|$  este metrică pe  $\mathbb{R}$ .

b)  $d : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}_+$   $d(x,y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2}$ , unde  $x = (x_1, x_2)$ ,  $y = (y_1, y_2)$  este metrică pe  $\mathbb{R}^2$

c)  $d: \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}_+$   $d(x, y) = \sqrt{(x_1 - y_1)^2 + (x_2 - y_2)^2 + (x_3 - y_3)^2}$ , unde  $x = (x_1, x_2, x_3)$ ,  $y = (y_1, y_2, y_3)$  este metrică pe  $\mathbb{R}^3$

d)  $d: \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}_+$   $d(x, y) = \sqrt{\sum_{i=1}^m (x_i - y_i)^2}$ , unde  $x = (x_1, x_2, \dots, x_m)$ ,  $y = (y_1, y_2, \dots, y_m)$  este metrică pe  $\mathbb{R}^m$

Aceste distanțe se numesc distanțe euclidiene.

**Definiția 2.3.2.** Fie  $(E, d)$  spațiu numeric. Mulțimile

$$S(x_0, r) = \{x \in E \mid d(x_0, x) < r; r \geq 0, x_0 \in E \text{ fixat}\}$$

și

$$\bar{S}(x_0, r) = \{x \in E \mid d(x_0, x) \leq r; r \geq 0, x_0 \in E \text{ fixat}\}$$

se numesc **sferile deschise** respectiv **închise ale spațiului metric**  $(E, d)$ .

**Observația 2.3.2.**

a)  $E \equiv \mathbb{R}$ ,  $d$  metrică euclidiană, atunci:

$$S(x_0, r) = (x_0 - r, x_0 + r) \text{ și } \bar{S}(x_0, r) = [x_0 - r, x_0 + r].$$

b)  $E \equiv \mathbb{R}^2$  și  $d$  metrică euclidiană, atunci:

$$S(x_0, r) = \{(x_1, x_2) = x \in \mathbb{R}^2 \mid (x_1 - x_{01})^2 + (x_2 - x_{02})^2 < r^2\} \text{ și se numește } \mathbf{discul}$$

**plan deschis**, iar

$$\bar{S}(x_0, r) = \{(x_1, x_2) = x \in \mathbb{R}^2 \mid (x_1 - x_{01})^2 + (x_2 - x_{02})^2 \leq r^2\} \text{ și se numește } \mathbf{discul}$$

**plan închis**.

c)  $S(x_0, r) = \{(x_1, x_2, x_3) = x \in \mathbb{R}^3 \mid (x_1 - x_{01})^2 + (x_2 - x_{02})^2 + (x_3 - x_{03})^2 < r^2\}$  și se numește **sfera deschisă din**  $\mathbb{R}^3$ .

$\bar{S}(x_0, r) = \{(x_1, x_2, x_3) = x \in \mathbb{R}^3 \mid (x_1 - x_{01})^2 + (x_2 - x_{02})^2 + (x_3 - x_{03})^2 \leq r^2\}$  și se numește **sfera închisă din**  $\mathbb{R}^3$ .

**Propoziția 2.3.2.** Orice spațiu metric  $(E, d)$  este un spațiu topologic. Reciproca nu este în general adevărată.

Demonstratie:

Se arată că  $\tau_M = \{S(x, r) \mid x \in E, r \geq 0\}$  formează o topologie. Această topologie mai poartă denumirea și de topologie metrică.

Pentru a arăta că  $\tau_M$  este o topologie se arată  $S(x_0, r)$  sunt mulțimi deschise, pentru orice  $x_0 \in E$  fixat și orice  $r \geq 0$ .

Indicație: Se arată că  $S(x_0, r) \equiv \overset{0}{S}(x_0, r)$  (interior).

În mod analog ca mai sus se arată că dacă  $G_1, G_2, \dots, G_n \in \tau_M$  (sunt mulțimi deschise) atunci  $G_1 \cap G_2 \cap \dots \cap G_n \in \tau_M$ .

Dacă  $G_i \in \tau_M$  pentru orice  $i \in \mathfrak{I}$  avem  $\bigcup_{i \in \mathfrak{I}} G_i \in \tau_M$ , de unde rezultă că într-adevăr  $\tau_M$  este o topologie.

## 4. Normă. Spațiu vectorial normat

**Definiția 2.4.1.** Fie  $E$  un spațiu vectorial și  $\varphi: E \rightarrow \mathbb{R}_+$  o aplicație. Dacă:

1.  $\varphi(x) > 0$ , pentru orice  $x \in E$ ;  $x \neq 0_E$  și  $\varphi(x) = 0$  dacă  $x = 0_E$  ( $0_E$  elementul neutru în raport cu adunarea în spațiul vectorial  $E$ )
2.  $\varphi(x + y) \leq \varphi(x) + \varphi(y)$ , pentru orice  $x, y \in E$
3.  $\varphi(ax) = |a|\varphi(x)$ , pentru orice  $x \in E$ ,  $a \in K$

Atunci aplicația  $\varphi(x)$  este o normă pe  $E$ .

Cupletul  $(E, \varphi)$  se numește **spațiu vectorial normat**, iar norma  $\varphi$  mai are și următoarea notație  $\varphi(x) \equiv \|x\|$ .

**Propoziția 2.4.1.** Orice normă definește o distanță.

**Demonstratie:** Fie  $(E, \|\cdot\|)$  un spațiu vectorial normat, iar norma  $\varphi$  mai are și următoarea notație  $\varphi(x) \equiv \|x\|$ .

Aplicația  $d(x, y) = \|x - y\|$ ,  $d: E \times E \rightarrow \mathbb{R}$  este o distanță (metrică) pe mulțimea  $E$ . Pentru aceasta trebuie verificate axiomele metricii, ținând cont că axiomele normei sunt verificate.

$1^0$   $d(x, y) > 0$ , pentru orice  $x, y \in E$ ,  $x \neq y$  și  $d(x, y) = 0$  rezultă  $x = y$ .

Într-adevăr

$d(x, y) = \|x - y\| > 0$ , pentru orice  $x - y \neq 0$ . Dar  $x - y \neq 0$  dacă și numai dacă  $x \neq y$  și  $d(x, y) = 0$  rezultă  $\|x - y\| = 0$ . Dar  $x - y = 0$  dacă și numai dacă  $x = y$ .

$2^0$  Trebuie arătat că  $d(x, y) = d(y, x)$ . Într-adevăr

$$d(x, y) = \|x - y\| = \|-1(y - x)\| = |-1|\|y - x\| = \|y - x\| = d(y, x).$$

$3^0$  Trebuie arătat că

$$d(x, y) \leq d(x, z) + d(z, y), \text{ oricare ar fi } x, y, z \in E.$$

Într-adevăr:

$$d(x, y) = \|x - y\| = \|x - z + z - y\| \leq \|x - z\| + \|z - y\| = d(x, z) + d(z, y).$$

Astfel am demonstrat că orice normă definește o distanță.

**Observația 2.4.1.**



Ținând cont de propoziția 2.4.1. orice spațiu vectorial normat este și un spațiu metric, dar reciproca nu este în general adevărată.

Într-un spațiu vectorial normat se poate opera cu elementele și se pot crea vecinătăți în care se poate determina precis densitatea elementelor prin măsurarea distanței dintre ele, dar într-o astfel de structură nu se poate defini noțiunea de direcție, deci de unghi. Această direcție poate fi stabilită cu ajutorul noțiunii de produs scalar.

**Definiția 2.4.2.** Fie  $E$  un spațiu vectorial normat peste câmpul  $K$  și aplicația  $p: E \times E \rightarrow K$ , dacă:

1.  $p(x, y) = \overline{p(y, x)}$ , oricare ar fi  $x, y \in E$ ;
2.  $p(x_1 + x_2, y) = p(x_1, y) + p(x_2, y)$ , oricare ar fi  $x_1, x_2, y \in E$ ;
3.  $p(\alpha x, y) = \alpha p(x, y)$ , oricare ar fi  $x, y \in E$ ;
4.  $p(x, x) > 0$ , oricare ar fi  $x \in E$ ,  $x \neq 0$  și  $p(x, x) = 0$  dacă și numai dacă  $x = 0$ ;

Atunci aplicația  $p$  se numește **produs scalar** pe spațiul vectorial normat  $E$ .

Produsul scalar  $p(x, x)$  se notează și astfel  $x \cdot y$  sau  $(x, y)$  sau  $\langle x, y \rangle$ .

**Observația 2.4.2.**

Fie  $E$  spațiu vectorial, dacă acest spațiu vectorial este înzestrat cu un produs scalar, atunci poartă denumirea de spațiu prehilbertian.

**Propoziția 2.4.2.** Orice Fie  $E$  spațiu vectorial și  $p: E \times E \rightarrow K$  un produs scalar. ( $E$  un spațiu prehilbertian), atunci au loc următoarele relații:

- 1<sup>o</sup>  $\langle x, y_1 + y_2 \rangle = \langle x, y_1 \rangle + \langle x, y_2 \rangle$ ;
- 2<sup>o</sup>  $\langle x, \alpha y \rangle = \overline{\alpha} \langle x, y \rangle$ ;
- 3<sup>o</sup>  $|\langle x, y \rangle| \leq \|x\| \cdot \|y\|$  (inegalitatea Cauchy-Buniakovski-Schwarz).

**Demonstratie:**

1<sup>o</sup> Ținând cont de punctul 1, din definiția 2.4.2. rezultă:

$$\langle x, y_1 + y_2 \rangle = \overline{\langle y_1 + y_2, x \rangle} \stackrel{2^o}{=} \overline{\langle y_1, x \rangle + \langle y_2, x \rangle} = \overline{\langle y_1, x \rangle} + \overline{\langle y_2, x \rangle} = \langle x, y_1 \rangle + \langle x, y_2 \rangle = \langle x, y_1 \rangle + \langle x, y_2 \rangle$$

$$2^o \langle x, \alpha \cdot y \rangle = \overline{\langle \alpha \cdot y, x \rangle} \stackrel{3^o}{=} \overline{\alpha \cdot \langle y, x \rangle} = \overline{\alpha} \cdot \overline{\langle y, x \rangle} \stackrel{1^o}{=} \overline{\alpha} \cdot \langle x, y \rangle$$

3<sup>o</sup> Fie  $\lambda \in \mathbb{R}$  atunci conform definiției produsului scalar se poate scrie că:

$$0 \leq \langle x + \lambda y, x + \lambda y \rangle = \langle x, x + \lambda y \rangle + \lambda \langle y, x + \lambda y \rangle = \langle x, x \rangle + \lambda \langle x, y \rangle + \lambda \langle y, x \rangle + \lambda^2 \langle y, y \rangle = \lambda^2 \langle y, y \rangle + 2\lambda \langle x, y \rangle + \langle x, x \rangle$$

Deci pentru orice  $\lambda \in \mathbb{R}$  avem:

$$\lambda^2 \langle y, y \rangle + 2\lambda \langle x, y \rangle + \langle x, x \rangle \geq 0 \text{ (trinom de gradul doi în } \lambda \text{) unde}$$

$\Delta = 4\langle x, y \rangle^2 - 4\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle$ . Din proprietățile trinomialului de gradul 2 este evident că  $\Delta \leq 0$ . Așadar

$$|\langle x, y \rangle| \leq \sqrt{\langle x, x \rangle \langle y, y \rangle} = \|x\| \cdot \|y\|.$$

**Propoziția 2.4.3.** Orice produs scalar definește o normă.

Într-adevăr dacă se consideră aplicația:

$$\|x\| = \sqrt{\langle x, x \rangle}, \quad \|\cdot\|: E \rightarrow \mathbb{R}_+$$

atunci această aplicație este o normă pe mulțimea  $E$ . Ținând cont că proprietățile produsului scalar sunt verificate, trebuie arătat că această aplicație verifică proprietățile normei.

1<sup>o</sup>  $\|x\| > 0$ , pentru orice  $x \in E$ ;  $x \neq 0$  și  $\|x\| = 0$  rezultă  $x = 0$ .

Într-adevăr

$\langle x, x \rangle > 0$ , pentru orice  $x \neq 0$  rezultă  $\sqrt{\langle x, x \rangle} > 0 \Leftrightarrow \|x\| > 0$  pentru orice  $x \in E$ ,  $x \neq 0$

$$[\langle x, x \rangle = 0 \Rightarrow x = 0] \Leftrightarrow [\|x\| = 0 \Rightarrow x = 0].$$

2<sup>o</sup> Trebuie arătat că  $\|a \cdot x\| = |a| \cdot \|x\|$ , pentru orice  $x \in E$ ,  $a \in \mathbb{R}$ .

$$\text{Într-adevăr } \langle ax, ax \rangle = a^2 \langle x, x \rangle \Rightarrow \sqrt{\langle ax, ax \rangle} = |a| \sqrt{\langle x, x \rangle} \Rightarrow \|a \cdot x\| = |a| \cdot \|x\|.$$

3<sup>o</sup> Trebuie arătat că  $\|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|$ .

Într-adevăr:

$$\langle x + y, x + y \rangle = \langle x, x \rangle + 2\langle x, y \rangle + \langle y, y \rangle \leq \|x\|^2 + 2\|x\| \cdot \|y\| + \|y\|^2.$$

$$\|x + y\|^2 \leq (\|x\| + \|y\|)^2 \Leftrightarrow \|x + y\| \leq \|x\| + \|y\|.$$

**Exemplu:**

Fie  $E = \mathbb{R}^n$  să se arate că aplicația:

a)  $\langle x, y \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n$  este un produs scalar pe  $\mathbb{R}^n$ .

b) Dacă  $\langle \bar{a}, \bar{b} \rangle = a \cdot b \cos \theta$ ,  $\theta = (\bar{a}, \bar{b})$  este un produs scalar. (vezi exercițiul 2.5.14).

**Definiția 2.4.3.** Fie  $(E, \tau)$  un spațiu topologic, acest spațiu topologic se numește **topologic separat** dacă, pentru orice  $x, y \in E$  cu  $x \neq y$  există  $V_x, V_y$  astfel încât  $V_x \cap V_y = \emptyset$ .

Spațiu topologic separat prezintă o importanță deosebită deoarece nu mai într-un astfel de spațiu topologic, atunci când limita există, ea este unică.

Noțiunea de convergență este bine definită într-un spațiu topologic separat.

**Propoziția 2.4.4.** Orice spațiu vectorial normat este un spațiu topologic separat.

Demonstratie: Fie  $(E, \|\cdot\|)$  spațiu vectorial normat.

Fie  $x_0, y_0 \in E \mid x_0 \neq y_0$  arbitrare. Se consideră  $r_1 = \frac{\|x_0 - y_0\|}{3}$ .



Se consideră sferile:

$$S(x_0, r_1) = \{y \in E \mid \|x_0 - y\| < r_1\}$$

$$S(y_0, r_1) = \{y \in E \mid \|y_0 - y\| < r_1\}.$$

Aceste mulțimi sunt vecinătăți ale lui  $x_0$  respectiv  $y_0$  în topologia metrică.

Dar este evident că  $S(x_0, r_1) \cap S(y_0, r_1) = \emptyset$ .



**Propoziția 2.4.5.**  $\mathbb{R}, \mathbb{R}^2, \dots, \mathbb{R}^n$  sunt spații topologice separate în cazul în care sunt înzestrate cu topologia metrică.

## 5. Exerciții rezolvate

**Exercițiul 2.5.1.** Fie  $B_{\mathbb{R}}(x)$  familia intervalelor deschise ce îl conțin pe  $x \in \mathbb{R}$ . Să se arate că această mulțime formează o topologie pe  $\mathbb{R}$ .

Rezolvare:

Trebuie arătat că  $B_{\mathbb{R}}(x)$  verifică proprietățile unei topologii.

a)  $\emptyset \in B_{\mathbb{R}}(x)$  deoarece  $\emptyset = (x, x)$ ;  $\mathbb{R} \in B_{\mathbb{R}}(x)$  deoarece  $\mathbb{R} = (-\infty, \infty)$

b) Fie  $I_k^x \in B_{\mathbb{R}}(x)$ ,  $k \in I$  (mulțime de indici). Aceste intervale sunt de forma  $I_k^x = (a_k, b_k)$  cu proprietatea că  $x \in (a_k, b_k)$ ,  $(\forall) k \in I$ . Fie  $r_k = b_k - x$  și  $\varepsilon_k = x - a_k$ .

Se notează  $r = \max_{k \in I} \{b_k - x\}$  și  $\varepsilon = \max_{k \in I} \{x - a_k\}$  atunci  $\bigcup_{k \in I} I_k^x = (x - \varepsilon, x + r)$  și  $x \in (x - \varepsilon, x + r)$ .

$$\text{Deci } \bigcup_{k \in I} I_k^x = B_{\mathbb{R}}(x)$$

c) Fie  $I_k^x \in B_{\mathbb{R}}(x)$ ,  $k \in \overline{1, n}$ .

Aici  $r = \min_{k \in I} \{b_k - x\}$  și  $\varepsilon = \min_{k \in I} \{x - a_k\}$  atunci  $\bigcap_{k=1}^n I_k^x = (x - \varepsilon, x + r)$  și

$x \in (x - \varepsilon, x + r)$ . Deci  $\bigcap_{k=1}^n I_k^x \in B_{\mathbb{R}}(x)$ .

**Observație:**

i)  $\tau_{\mathbb{R}}(x) = \{(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \mid x \in \mathbb{R}, \varepsilon > 0\} \subset B_{\mathbb{R}}(x)$  în mod evident.

ii) Dacă se consideră

$$D_{\mathbb{R}}(x) = \{D \subset \mathbb{R} \mid (\exists) \varepsilon > 0 \text{ astfel încât } (x - \varepsilon, x + \varepsilon) \subset D, x \in \mathbb{R}\}$$

este evident că  $B_{\mathbb{R}}(x) \subset D_{\mathbb{R}}(x)$ .

**Exercițiul 2.5.2.** Fie  $\tau_{\mathbb{R}^2}(\bar{x}) = \{D_{\mathbb{R}^2}(\bar{x}, \varepsilon) \mid \bar{x} \in \mathbb{R}^2; \varepsilon > 0\}$  mulțimea discurilor deschise de centru  $\bar{x}$  și rază  $\varepsilon$  și  $\tau_{\mathbb{R}^3}(\bar{x}) = \{D_{\mathbb{R}^3}(\bar{x}, \varepsilon) \mid \bar{x} \in \mathbb{R}^3; \varepsilon > 0\}$  mulțimea sferelor deschise de centru  $\bar{x}$  și rază  $\varepsilon$ . Să se arate că  $\tau_{\mathbb{R}^2}(\bar{x})$  și  $\tau_{\mathbb{R}^3}(\bar{x})$  sunt topologii pe  $\mathbb{R}^2$  respectiv  $\mathbb{R}^3$ .

Rezolvare:

Când  $\varepsilon \rightarrow \infty$ ,  $D_{\mathbb{R}^2}(\bar{x}, \varepsilon) \equiv \mathbb{R}^2$ . Deci  $\mathbb{R}^2 \in \tau_{\mathbb{R}^2}(\bar{x})$ .

Când  $\varepsilon \rightarrow 0$ ,  $D_{\mathbb{R}^2}(\bar{x}, \varepsilon) = \emptyset$ . Deci  $\emptyset \in \tau_{\mathbb{R}^2}(\bar{x})$ .

Fie  $I$  o familie de indici  $D_{\mathbb{R}^2}(\bar{x}, \varepsilon_k) \in \tau_{\mathbb{R}^2}(\bar{x})$ ,  $k \in I$ . Dacă  $\varepsilon = \max_{k \in I} \{\varepsilon_k\}$  atunci  $\bigcup_{k \in I} D_{\mathbb{R}^2}^k(\bar{x}, \varepsilon_k) = D_{\mathbb{R}^2}(\bar{x}, \varepsilon)$ . Deci  $\bigcup_{k \in I} D_{\mathbb{R}^2}^k(\bar{x}, \varepsilon_k) \in \tau_{\mathbb{R}^2}(\bar{x})$ .

Fie  $D_{\mathbb{R}^2}(\bar{x}, \varepsilon_k) \in \tau_{\mathbb{R}^2}(\bar{x})$ ,  $k \in \overline{1, n}$ . Dacă  $\varepsilon = \min_{k=1}^n \{\varepsilon_k\}$  atunci

$\bigcap_{k=1}^n D_{\mathbb{R}^2}(\bar{x}, \varepsilon_k) = D_{\mathbb{R}^2}(\bar{x}, \varepsilon)$ . Deci  $\bigcap_{k=1}^n D_{\mathbb{R}^2}(\bar{x}, \varepsilon_k) \in \tau_{\mathbb{R}^2}(\bar{x})$ .

Astfel s-a arătat că  $\tau_{\mathbb{R}^2}(\bar{x})$  este topologie în  $\mathbb{R}^2$ .

Analog se arată că  $\tau_{\mathbb{R}^3}(\bar{x})$  este topologie în  $\mathbb{R}^3$ .

**Observație:**

- Topologiile  $\tau_{\mathbb{R}^2}(\bar{x})$  și  $\tau_{\mathbb{R}^3}(\bar{x})$  sunt topologiile naturale ale lui  $\mathbb{R}^2$  respectiv  $\mathbb{R}^3$ .

- Dacă  $x_0 \in \mathbb{R}$  atunci  $\{(x_0 - \varepsilon, x_0 + r) \mid \varepsilon > 0\}$  reprezintă mulțimea vecinătăților lui  $x_0$  în topologia  $\tau_{\mathbb{R}}(x)$ .
- Dacă  $\bar{x}_0 \in \mathbb{R}^2$   $\{D_{\mathbb{R}^2}(\bar{x}_0, \varepsilon) \mid \varepsilon > 0\}$  este mulțimea vecinătăților lui  $\bar{x}_0$  în topologia  $\tau_{\mathbb{R}^2}(\bar{x})$ .
- Dacă  $\bar{x}_0 \in \mathbb{R}^3$   $\{D_{\mathbb{R}^3}(\bar{x}_0, \varepsilon) \mid \varepsilon > 0\}$  este mulțimea vecinătăților lui  $\bar{x}_0$  în topologia  $\tau_{\mathbb{R}^3}(\bar{x})$ .
- În general dacă  $\tau$  este o topologie oarecare a lui  $X$ , atunci  $\{G \in \tau \mid x_0 \in G\}$  este mulțimea vecinătăților lui  $x_0 \in X$ . O astfel de vecinătate se notează  $V_{x_0}$  iar mulțimea vecinătăților lui  $x_0$  se notează cu  $\mathfrak{G}_{x_0}$ .

### Exercițiul 2.5.3.

Fie  $(X, \tau)$  spațiu topologic.

Următoarele afirmații sunt echivalente.

- $A \in \tau$
- $A \in \mathfrak{G}_x$  pentru orice  $x \in A$ .

Rezolvare:

a)  $\Rightarrow$  b) Fie  $A \in \tau$ .  $x \in A \subseteq A$  pentru orice  $x \in A$ . Deci  $A$  este o vecinătate a lui  $x$ . Așadar  $A \in \mathfrak{G}_x$ .

b)  $\Rightarrow$  a) Fie  $A \in \mathfrak{G}_x$  pentru orice  $x \in A$ . Deci există  $G_x \in \tau$  astfel încât  $x \in G_x \subseteq A$ . Cum  $A = \bigcup_{x \in A} \{x\}$ . Din  $G_x \subseteq A$  se obține  $A \subset \bigcup_{x \in A} G_x$  (1). Din  $G_x \subseteq A$  rezultă că  $\bigcup_{x \in A} G_x \subseteq A$  (2). Din (1) și (2) rezultă că  $A = \bigcup_{x \in A} G_x \in \tau$ .

### Exercițiul 2.5.4.

Fie  $(X, \tau)$  spațiu topologic și  $x \in X$ . Atunci  $\mathfrak{G}_x$  are următoarele proprietăți:

- Dacă  $V \in \mathfrak{G}_x$  și  $U \supset V$  atunci  $U \in \mathfrak{G}_x$
- Dacă  $V_i \in \mathfrak{G}_x$ ,  $i = \overline{1, n}$  atunci  $\bigcap_{i=1}^n V_i \in \mathfrak{G}_x$
- Pentru orice  $V \in \mathfrak{G}_x$  atunci  $x \in V$ .

Rezolvare:

a)  $V \in \mathfrak{G}_x$  atunci există  $G \in \tau$  astfel încât  $x \in G \subset V$ . Cum  $U \supset V$  atunci  $x \in G \subset U$ . Deci  $U \in \mathfrak{G}_x$ .

b) Dacă  $V_i \in \mathfrak{G}_x$ ,  $i = \overline{1, n}$ , atunci există  $G_i \in \tau$  astfel încât  $x \in G_i \subset V_i$ ,  $i = \overline{1, n}$ .

Așadar  $x \in \bigcap_{i=1}^n G_i \subset \bigcap_{i=1}^n V_i$ . Dar cum  $\bigcap_{i=1}^n G_i \in \tau$ , atunci  $\bigcap_{i=1}^n V_i \in \mathfrak{G}_x$ .

c) Evident, ținând cont de definiția vecinătății.

### Exercițiul 2.5.5.

Orice interval deschis de numere reale este o mulțime deschisă.

Rezolvare:

Conform cu definiția 2.1.4. trebuie arătat că pentru orice  $x \in (a, b)$  există  $r > 0$  astfel încât  $(x - r, x + r) \subset (a, b)$ .

Fie  $d := \min\{x - a, b - x\}$ . Atunci este evident că  $\left(x - \frac{d}{2}, x + \frac{d}{2}\right) \subset (a, b)$ .

Deci  $(a, b)$  este mulțime deschisă.

**Observație:**

Analog se arată că:

$$D_{\mathbb{R}^2}(\bar{x}, r) = \left\{ \bar{x} \in \mathbb{R}^2 \mid (x_1 - x_{01})^2 + (x_2 - x_{02})^2 < r^2 \right\} \quad \text{unde} \quad \bar{x} = (x_1, x_2),$$

$$\bar{x}_0 = (x_{01}, x_{02})$$

este o mulțime deschisă în  $\tau_{\mathbb{R}^2}$

și

$$D_{\mathbb{R}^3}(\bar{x}_0, \gamma) = \left\{ \bar{x} \in \mathbb{R}^3 \mid (x_1 - x_{01})^2 + (x_2 - x_{02})^2 + (x_3 - x_{03})^2 < \gamma^2 \right\},$$

unde

$$\bar{x} = (x_1, x_2, x_3), \bar{x}_0 = (x_{01}, x_{02}, x_{03}) \text{ este mulțime deschisă în } \tau_{\mathbb{R}^3}(\bar{x}).$$

### Exercițiul 2.5.6.

Fie  $(X, \tau)$  spațiu topologic și  $A, B \subset X$ .

Să se arate că:

$$\text{a) } \overset{\circ}{A} = A$$

$$\text{b) } A \subset C \Rightarrow \overset{\circ}{A} \subset \overset{\circ}{C}$$

$$\text{c) } \overset{\circ}{A \cap B} = \overset{\circ}{A} \cap \overset{\circ}{B}$$

$$\text{d) } \overset{\circ}{A \cup B} \supseteq \overset{\circ}{A} \cup \overset{\circ}{B}$$

Rezolvare:

Conform cu definiția 2.2.1. punctele a) și b) sunt evidente.

c) Se arată dubla incluziune:

$$\overset{\circ}{A \cap B} \subseteq \overset{\circ}{A} \cap \overset{\circ}{B} \text{ și } \overset{\circ}{A} \cap \overset{\circ}{B} \subseteq \overset{\circ}{A \cap B}$$

Într-adevăr, fie  $x \in \overset{\circ}{A \cap B}$  atunci există  $V_x$  astfel încât  $V_x \subset A \cap B$ . Deci

$V_x \subset A$  și  $V_x \subset B$ . Așadar  $x \in \overset{\circ}{A} \cap \overset{\circ}{B}$ . De aici rezultă că  $\overset{\circ}{A \cap B} \subseteq \overset{\circ}{A} \cap \overset{\circ}{B}$ .

Fie  $x \in \overset{0}{A} \cap \overset{0}{B}$ , atunci  $x \in \overset{0}{A}$  și  $x \in \overset{0}{B}$ . Așadar  $V_x \subset A \cap B$ . Atunci  $x \in \overline{A \cap B}$ . Deci  $\overset{0}{A} \cap \overset{0}{B} \subset \overline{A \cap B}$ .

d) Fie  $x \in \overset{0}{A} \cup \overset{0}{B}$  atunci  $x \in \overset{0}{A}$  sau  $x \in \overset{0}{B}$ . Deci există  $V_x$  astfel încât  $V_x \subset A$  sau  $V_x \subset B$ . Atunci conform cu definiția 2.2.1.  $x_0 \in \overline{A \cup B}$ .

**Observație:**

Punctele c) și d) se generează astfel:

$$\overline{\bigcap_{i \in I} A_i} \subset \bigcap_{i \in I} \overset{0}{A_i}, \quad \overline{\bigcup_{i \in I} A_i} \supset \bigcup_{i \in I} \overset{0}{A_i}.$$

**Exercițiul 2.5.7.**

Fie  $(X, \tau)$  spațiu topologic și  $A, B \subset X$ .

Să se arate că:

a)  $A \subset B \Rightarrow \overline{A} \subset \overline{B}$

b)  $\overline{A \cup B} = \overline{A} \cup \overline{B}$

c)  $\overline{A \cap B} \subseteq \overline{A} \cap \overline{B}$

d)  $\overline{\overline{A}} = \overline{A}$

Rezolvare:

a) Este evident ținând cont de definiția 2.2.1.

b) Cum  $A, B \subset A \cup B$ , atunci conform cu a)  $\overline{A}, \overline{B} \subset \overline{A \cup B}$ . Așadar  $\overline{A} \cup \overline{B} \subset \overline{A \cup B}$ .

Fie  $x \in C(\overline{A \cup B}) = C\overline{A} \cap C\overline{B}$ . Așadar  $x \notin \overline{A}$  și  $x \notin \overline{B}$ . Atunci există  $U_x$  și  $V_x$  astfel încât

$$U_x \cap A = \emptyset \text{ și } V_x \cap B = \emptyset \quad (1)$$

Fie  $W_x = U_x \cap V_x$  (2) (vezi exercițiul 2.5.4.)

Din (1) și (2) conform cu distributivitatea intersecției față de reuniune se obține  $W_x \cap (A \cup B) = \emptyset$ .

Așadar  $x \notin \overline{A \cup B}$ . Deci  $x \in C\overline{A \cup B}$ .

Așadar  $x \in C(\overline{A \cup B}) \Rightarrow x \in C\overline{A \cup B}$ .

Așadar  $\overline{A \cup B} \subset \overline{A} \cup \overline{B}$ .

c) Se procedează ca la punctul b).

d) Fie  $x \in \overline{\overline{A}}$ . Conform cu definiția 2.2.1. pentru orice  $V_x$ ,  $V_x \cap \overline{A} \neq \emptyset$ .

Fie  $y = V_x \cap \overline{A}$ . Atunci  $y \in V_x$  și  $y \in \overline{A}$ . Deci  $V_x \cap A \neq \emptyset \Rightarrow x \in \overline{A}$ .

Ținând cont de faptul că  $\overline{\overline{A}} \subset \overline{A}$  și de punctul a) se obține  $\overline{\overline{A}} = \overline{A}$ .

**Observație:**

Proprietățile b) și c) se generalizează astfel:

$$\bigcup_{n=1}^{\infty} \bar{A}_n \subset \overline{\bigcup_{n=1}^{\infty} A_n} \text{ și } \bigcap_{n=1}^{\infty} A_n \subset \overline{\bigcap_{n=1}^{\infty} \bar{A}_n}.$$

Generalizarea lui b) se poate verifica ușor pe mulțimile  $A_n = \left[ \frac{1}{n}, 1 \right]$  iar generalizarea lui c) se poate verifica ușor pe mulțimile  $B_n = \left\{ \frac{m}{n}, (m, n) \in \mathbb{N}^*, (m, n) = 1 \right\}$ .

### Exercițiul 2.5.8.

Fie  $(X, \tau)$  spațiu topologic și  $A, B \subset X$ .

Să se arate că:

a)  $A \subset B \Rightarrow A' \subset B'$

b)  $(A \cup B)' = A' \cup B'$

c)  $(A \cap B)' \subset A' \cap B'$

d)  $(A')' = A$ .

#### Rezolvare:

Aceste proprietăți se pot demonstra folosind definiția punctului de acumulare.

Se poate folosi și următoarea proprietate

$$x \in A' \Leftrightarrow [(\forall) V | V \in \mathcal{V}_x \Rightarrow \text{card}(V \cap A) \geq \aleph_0].$$

Folosind această proprietate se arată că  $(A \cup B)' = A' \cup B'$ .

Într-adevăr, fie  $x \in (A \cup B)'$ , atunci orice vecinătate  $V \in \mathcal{V}_x$  conține o infinitate de puncte din  $A \cup B$ . Aceasta implică faptul că conține o infinitate de puncte din  $A$ , deci  $x \in A'$  sau o infinitate de puncte din  $B$ , deci  $x \in B'$ . Așadar  $x \in A' \cup B'$ . Deci  $(A \cup B)' \subset A' \cup B'$ .

Fie  $x \in A' \cup B'$  atunci  $x \in A'$  sau  $x \in B'$ .

Deci în orice vecinătate  $V \in \mathcal{V}_x$  se află o infinitate de puncte din  $A$  sau infinitate de puncte din  $B$ . Deci în orice vecinătate  $V \in \mathcal{V}_x$  se află o infinitate de puncte din  $A \cup B$ . Deci  $x \in (A \cup B)'$ . Așadar  $A' \cup B' \subset (A \cup B)'$ . În mod analog se arată celelalte proprietăți.

### Exercițiul 2.5.9.

Să se arate că mulțimea numerelor raționale  $\mathbb{Q}$  este densă în mulțimea numerelor reale  $\mathbb{R}$ .

#### Rezolvare:

Se știe că mulțimea  $A$  este densă în mulțimea  $X$  dacă  $\bar{A} = X$ .

Ținând cont de aceasta trebuie arătat că  $\bar{\mathbb{Q}} = \mathbb{R}$ .

Incluziunea  $\mathbb{R} \supseteq \bar{\mathbb{Q}}$  este evidentă. Trebuie arătat că  $\bar{\mathbb{Q}} \supseteq \mathbb{R}$ .



Fie  $x \in \mathbb{R}$ , atunci oricare ar fi  $\varepsilon > 0$ , există  $q \in \mathbb{Q}$ . Deci  $(x - \varepsilon, x + \varepsilon) \cap \mathbb{Q} \neq \emptyset$ . Atunci  $x \in \overline{\mathbb{Q}}$ . Așadar  $\overline{\mathbb{Q}} \supseteq \mathbb{R}$ .

### Exercițiul 2.5.10.

Fie  $[0,1]$ . Se împarte acest interval în trei părți egale și se obține  $E_1 = \left(\frac{1}{3}, \frac{2}{3}\right)$  treimea mijlocie. Intervalele rămase  $\left[0, \frac{1}{3}\right], \left[\frac{2}{3}, 1\right]$  se împart fiecare în trei părți egale și se obține  $E_2 = \left(\frac{1}{3^2}, \frac{2}{3^2}\right) \cup \left(\frac{7}{3^2}, \frac{8}{3^2}\right)$ . Intervalele rămase  $\left[0, \frac{1}{3^2}\right], \left[\frac{2}{3^2}, \frac{3}{3^2}\right], \left[\frac{6}{3^2}, \frac{7}{3^2}\right], \left[\frac{8}{3^2}, \frac{9}{3^2}\right]$  se împart fiecare în câte trei părți egale și se rețin treimile mijlocii ale fiecăruia, deci se obține mulțimea  $E_3 = \left(\frac{1}{3^2}, \frac{2}{3^2}\right) \cup \left(\frac{7}{3^2}, \frac{8}{3^2}\right) \cup \left(\frac{19}{3^2}, \frac{20}{3^2}\right) \cup \left(\frac{25}{3^2}, \frac{26}{3^2}\right)$  și se continuă indefinit procedeul.

Să se arate că mulțimea  $C = [0,1] \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$  are proprietățile:

a)  $C = C'$

b)  $\overline{C} = \emptyset$

#### Rezolvare:

Din modul de construcție al mulțimii  $C$  se observă că în  $C$  rămân toate numerele reale care se scriu în baza de numerație trei numai cu ajutorul cifrelor 0 și 2.

a) Deoarece pentru orice  $x = a, a_1, a_2, \dots, a_n, \dots$  cu proprietatea că  $a_i \in \{0, 2\}$ , în orice interval care îl conține se află și numere reale care în scrierea triadică conțin cifra 1 și nu aparțin lui  $C$ . Deci  $C = C'$ .

b) Este evident că  $[0,1]$  nu include nici un interval deschis ale cărui elemente să fie numai cu ajutorul lui 0 și 2. De aici este evident că  $\overline{C} = \emptyset$  și  $\overline{\overline{C}} = \overline{\emptyset}$ . Deci  $\overline{C} = \emptyset$

#### **Observație:**

- Mulțimea  $C = [0,1] \setminus \bigcup_{n=1}^{\infty} E_n$  se numește mulțimea lui Cantor.
- Mulțimile  $A$  care verifică proprietatea  $\overline{A} = \emptyset$  se numesc mulțimi rare.
- Mulțimile  $A$  care verifică proprietatea  $A = A'$  se numesc mulțimi perfecte.

- Mulțimea  $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$  unde  $A_n$  sunt mulțimi rare se numește mulțime slabă sau de categoria I-a Baire.

**Exercițiul 2.5.11.**

Să se determine interiorul, exteriorul, frontiera, aderența și partea discretă pentru mulțimile  $\mathbb{Q}$  și  $E = \left\{ \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}$ .

Rezolvare:

Ținând cont de definiția 2.2.1 și de faptul că: “Oricare ar fi  $x \in \bar{\mathbb{R}}$  intervalul  $(x - \varepsilon, x + \varepsilon)$ ,  $\varepsilon > 0$  conține o infinitate de numere raționale și o infinitate de numere iraționale” se obține imediat că:  $\overset{\circ}{\mathbb{Q}} = \emptyset$ ,  $\text{ext } \mathbb{Q} = \emptyset$ ,  $\text{fr } \mathbb{Q} = \bar{\mathbb{R}}$ ,  $\mathbb{Q}' = \bar{\mathbb{R}}$ .

$\text{Iz } \mathbb{Q} = \emptyset$  și  $\overset{\circ}{E} = \emptyset$ ,  $\text{fr } E = \left\{ 0, 1, \frac{1}{2}, \dots, \frac{1}{n}, \dots \right\}$ ,  $\text{ext } E = \bar{\mathbb{R}} - \text{fr } E$ ,  $\bar{E} = \text{fr } E$ ,  $E' = \{0\}$ ,  $\text{Iz } E = E$ .

**Exercițiul 2.5.12.**

Fie  $d : \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_+$ , unde  $d(\bar{x}, \bar{y}) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2}$ ,  $\bar{x} = (x_1, \dots, x_n)$ ;  $\bar{y} = (y_1, \dots, y_n)$ .

Să se arate că această aplicație este o metrică pe  $\mathbb{R}^n$ .

Rezolvare:

În rezolvarea acestui exercițiu este nevoie de inegalitatea lui Cauchy-Buniacovski  $\sum_{i=1}^n a_i b_i \leq \sqrt{\sum_{i=1}^n a_i^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n b_i^2}$ ,  $a_i, b_i \in \mathbb{R}$ ,  $i = \overline{1, n}$ .

Ținând cont de Propoziția 2.4.2. 3<sup>o</sup>:

$\|\bar{x}\| = \sqrt{\langle \bar{x}, \bar{x} \rangle}$  iar  $\langle \bar{x}, \bar{x} \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n$  inegalitatea lui Cauchy-Buniacovski este evidentă. Pentru ca  $d(\bar{x}, \bar{y})$  să fie metrică sau distantă trebuie să verifice definiția 2.3.1.

- $d(\bar{x}, \bar{y}) = 0 \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2 = 0 \Leftrightarrow (x_i - y_i)^2 = 0 \Leftrightarrow x_i = y_i$ ,  $i = \overline{1, n} \Leftrightarrow \bar{x} = \bar{y}$ . Deci  $d(\bar{x}, \bar{y}) = 0 \Leftrightarrow \bar{x} = \bar{y}$ .
- $\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} \geq 0$ ,  $i = \overline{1, n}$  evident. Deci  $d(\bar{x}, \bar{y}) \geq 0$ ,  $x, y \in \mathbb{R}^n$ .
- $d(\bar{x}, \bar{y}) = \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2} = \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - x_i)^2} = d(\bar{y}, \bar{x})$ . Deci  $d(\bar{x}, \bar{y}) = d(\bar{y}, \bar{x})$ .

$$\begin{aligned}
\bullet \quad & [d(\bar{x}, \bar{y}) + d(\bar{y}, \bar{x})]^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2 + 2 \sum_{i=1}^n \sqrt{(x_i - y_i)^2} \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n (y_i - z_i)^2} + \sum_{i=1}^n (y_i - z_i)^2 \geq \\
& \geq \sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2 + 2 \cdot \sum_{i=1}^n (x_i - y_i)(y_i - z_i) + \sum_{i=1}^n (y_i - z_i)^2 = \\
& = \sum_{i=1}^n [(x_i - y_i) + (y_i - z_i)]^2 = \sum_{i=1}^n (x_i - z_i)^2 = d^2(x, z).
\end{aligned}$$

Așadar  $d^2(\bar{x}, \bar{y}) \leq [d(\bar{x}, \bar{y}) + d(\bar{y}, \bar{x})]^2$ . De aici rezultă faptul că  $d(\bar{x}, \bar{y}) \leq d(\bar{x}, \bar{y}) + d(\bar{y}, \bar{x})$ .

Așadar  $d(\bar{x}, \bar{y}) = \sum_{i=1}^n (x_i - y_i)^2$  verifică definiția 2.3.1. și deci este normă pe  $\mathbb{R}^n$ .

### Exercițiul 2.5.13.

Fie  $d: \mathbb{R}^n \times \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_+$  unde  $d(\bar{x}, \bar{y}) = \left( \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$ ,  $p \geq 1$ ,  $\bar{x} = (x_1, \dots, x_n)$ ,  $\bar{y} = (y_1, \dots, y_n)$ . Să se arate că aplicația este o metrică pe  $\mathbb{R}^n$ .

#### Rezolvare:

În rezolvarea acestui exercițiu este nevoie de inegalitatea lui Minkovski.

Dacă  $a_i, b_i \in \mathbb{R}$  și  $p \geq 1$  atunci  $\left( \sum_{i=1}^n |a_i + b_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left( \sum_{i=1}^n |a_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left( \sum_{i=1}^n |b_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$ .

Pentru  $p = 1$  inegalitatea se reduce la inegalitatea cunoscută – modulul sumei este mai mic sau egal decât suma modulelor.

În continuare se consideră  $p > 1$  și atunci:

$$\sum_{i=1}^n |a_i + b_i|^p \leq \sum_{i=1}^n |a_i| \cdot |a_i + b_i|^{p-1} + \sum_{i=1}^n |b_i| \cdot |a_i + b_i|^{p-1}.$$

Dacă se consideră  $q = \frac{p}{p-1}$  atunci folosind inegalitatea lui Holder rezultă inegalitatea lui Minkovski.

Inegalitatea lui Holder este:

Dacă  $a_i, b_i \in \mathbb{R}$  și  $p, q > 0$  astfel încât  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ , atunci

$$\sum_{i=1}^n |a_i b_i| \leq \left( \sum_{i=1}^n |a_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \cdot \left( \sum_{i=1}^n |b_i|^q \right)^{\frac{1}{q}}.$$

Această inegalitate se obține imediat din inegalitatea:

Dacă  $p, q > 0$  astfel încât  $\frac{1}{p} + \frac{1}{q} = 1$ , atunci  $|a, b| \leq \frac{|a|^p}{p} + \frac{|b|^q}{q}$  pentru orice  $a, b \in \mathbb{R}$ .

Trebuie arătat că aplicația  $d(\bar{x}, \bar{y})$  verifică definiția 2.3.1.

- $d(\bar{x}, \bar{y}) = 0 \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^p = 0 \Leftrightarrow |x_i - y_i|^p = 0 \Leftrightarrow |x_i - y_i| = 0 \Leftrightarrow x_i = y_i \Leftrightarrow \bar{x} = \bar{y}$

. Deci  $d(\bar{x}, \bar{y}) = 0 \Leftrightarrow \bar{x} = \bar{y}$ .

- $|x_i - y_i| \geq 0 \Rightarrow |x_i - y_i|^p \geq 0 \Rightarrow \left( \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \geq 0 \Leftrightarrow d(\bar{x}, \bar{y}) \geq 0$ .

- $|x_i - y_i| = |y_i - x_i| \Rightarrow |x_i - y_i|^p = |y_i - x_i|^p \Rightarrow \left( \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} = \left( \sum_{i=1}^n |y_i - x_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \Leftrightarrow d(\bar{x}, \bar{y}) = d(\bar{y}, \bar{x}) (\forall \bar{x}, \bar{y} \in \mathbb{R}^n)$

- $|x_i - y_i|^p = |(x_i - z_i) + (z_i - y_i)|^p \leq (|x_i - z_i| + |z_i - y_i|)^p$ .

Deci  $\sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^p \leq \sum_{i=1}^n (|x_i - z_i| + |z_i - y_i|)^p \leq \left( \sum_{i=1}^n |x_i - z_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left( \sum_{i=1}^n |z_i - y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}$

Pentru  $p > 1$  este evident că  $\left( \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^p$ . Așadar

$$\left( \sum_{i=1}^n |x_i - y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} \leq \left( \sum_{i=1}^n |x_i - z_i|^p \right)^{\frac{1}{p}} + \left( \sum_{i=1}^n |z_i - y_i|^p \right)^{\frac{1}{p}}. \text{ Deci } d(\bar{x}, \bar{y}) \leq d(\bar{y}, \bar{z}) + d(\bar{z}, \bar{y}).$$

#### Exercițiul 2.5.14.

$\langle \bar{x}, \bar{y} \rangle = x_1 y_1 + x_2 y_2 + \dots + x_n y_n$ ,  $\bar{x}, \bar{y} \in \mathbb{R}^n$  este un produs scalar pe  $\mathbb{R}^n$ .

#### Rezolvare:

Trebuie arătat că această aplicație verifică definiția 2.4.2.

- $\langle \bar{x}, \bar{y} \rangle = \overline{\langle \bar{y}, \bar{x} \rangle}$  este evidentă deoarece  $\langle \bar{x}, \bar{y} \rangle = \sum_{i=1}^n x_i \cdot y_i \in \mathbb{R}$  și

$$\sum_{i=1}^n x_i \cdot y_i = \sum_{i=1}^n y_i \cdot x_i.$$

- $\langle \bar{x} + \bar{y}, \bar{z} \rangle = \sum_{i=1}^n (x_i + y_i) \cdot z_i = \sum_{i=1}^n x_i \cdot z_i + \sum_{i=1}^n y_i \cdot z_i = \langle \bar{x}, \bar{z} \rangle + \langle \bar{y}, \bar{z} \rangle$ .

- $\langle \alpha \cdot \bar{x}, \bar{y} \rangle = \sum_{i=1}^n \alpha \cdot x_i \cdot y_i = \alpha \sum_{i=1}^n x_i \cdot y_i = \alpha \langle \bar{x}, \bar{y} \rangle$
- $\langle \bar{x}, \bar{x} \rangle = \sum_{i=1}^n x_i^2 > 0 \quad \forall \bar{x} \neq (0, 0, \dots, 0) = \bar{0}$
- $\langle \bar{x}, \bar{x} \rangle = 0 \Leftrightarrow \sum_{i=1}^n x_i^2 = 0 \Leftrightarrow x_i^2 = 0 \Leftrightarrow x_i = 0, i = \overline{1, n} \Leftrightarrow \bar{x} = \bar{0}$

**Observație:**

Ținând cont de propoziția 2.4.3. rezultă că  $\|\bar{x}\| = x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2$  este o normă pe  $\mathbb{R}^n$ .

**Exercițiul 2.5.15.**

Mulțimile  $S(x, r) = \{y \in E \mid d(y, x) < r\}$  unde  $(E, d)$  este spațiu metric sunt mulțimi deschise.

Rezolvare:

Trebuie arătat că  $\overset{0}{S}(x, r) = S(x, r)$ . Fie  $y \in S(x, r)$  și  $r' = r - d(x, y)$ . Fie  $z \in S(y, r')$ . Atunci  $d(z, x) \leq d(z, y) + d(y, x) < r' + r - r' = r$ . Deci  $z \in S(x, r)$ . Se obține că  $S(y, r') \subset S(x, r)$ . Această incluziune arată că orice punct al mulțimii  $S(x, r)$  este punct interior al său. Deci  $S(x, r) \subseteq \overset{0}{S}(x, r)$ .

Incluziunea  $\overset{0}{S}(x, r) \subseteq S(x, r)$  este evidentă. Atunci  $\overset{0}{S}(x, r) = S(x, r)$ .

**Observație:**

- Mulțimea  $S(x, r)$  se numește **sferă** a spațiului metric  $(E, d)$ .
- Familia  $\left\{ S(x, r) \right\}_{\substack{x \in E \\ r > 0}}$  formează o topologie a mulțimii  $E$  și poartă denumirea de **topologie metrică**.

# CAPITOLUL III

## CARACTERIZAREA TOPOLOGICĂ A MULȚIMILOR. ȘIRURI ÎN SPAȚII TOPOLOGICE, ȘIRURI ÎN SPAȚII METRICE, ȘIRURI ÎN SPAȚII VECTORIALE NORMATE.

### 1. Mulțimi mărginite.

Problema mărginirii mulțimilor este o problemă prioritară în ceea ce privește controlul rezultatelor matematice ce se pot obține pe acest tip de mulțimi.

Cadrul general în care poate fi definită noțiunea de mărginire este cel de spațiu vectorial normat și cel de spațiu metric.

**Definiția 3.1.1.** Fie  $(E, d)$  spațiu metric. Mulțimea  $A \subset E$  se spune că este o **mulțime mărginită** în acest spațiu metric dacă există  $x_0 \in E$  arbitrar dar fixat și  $r > 0$ , astfel încât  $d(x_0, x) \leq r$ , pentru orice  $x \in A$ .

#### Observația 3.1.1.

a) Mulțimile mărginite nu sunt echivalente cu mulțimile cu un număr finit de elemente.

b) Dacă  $A$  este o mulțime mărginită, atunci  $\sup_{x, y \in A} \{d(x, y)\}$  se numește **diametrul mulțimii**  $A$  și se notează  $\text{diam. } A$ .

#### Exemple:

a) Dacă  $E = \mathbb{R}$  și  $d$  este metrica euclidiană se spune că mulțimea  $A \subset \mathbb{R}$  este mărginită, dacă există  $r > 0$  astfel încât  $A \subset [-r, r]$ .

b) Dacă  $E = \mathbb{R}^2$  și  $d$  este metrica euclidiană se spune că mulțimea  $A \subset \mathbb{R}^2$  este mărginită dacă și numai dacă există  $r > 0$  astfel încât  $\sqrt{x_1^2 + x_2^2} \leq r$  pentru orice  $x = (x_1, x_2) \in A$  adică există un disc cu centrul în origine care să includă mulțimea  $A$ .

c) Dacă  $E = \mathbb{R}^3$ ,  $A \subset \mathbb{R}^3$  este mărginită dacă și numai dacă există  $r > 0$  astfel încât  $\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + x_3^2} \leq r$ , oricare ar fi  $x = (x_1, x_2, x_3) \in A$ , adică există o sferă cu centrul în origine care să includă pe  $A$ .

d) Dacă  $E = \mathbb{R}^n$  se spune că  $A \subset \mathbb{R}^n$  este mărginită dacă și numai dacă există  $r > 0$  astfel încât  $\sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \leq r$  oricare ar fi  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in A$ .

**Propoziția 3.1.1.** Fie  $A \subset \mathbb{R}^n$  se spune că mulțimea  $A$  este mărginită dacă și numai dacă, mulțimea proiecțiilor elementelor lui  $A$  sunt mulțimi mărginite de numere reale.

Demonstrație:

Se presupune că  $A \subset \mathbb{R}^n$  mărginită. Conform cu exemplul anterior punctul

d) rezultă  $\sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \leq r$ ,  $\forall x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in A$  unde  $r > 0$  este un număr real fixat.

Ținând cont de această inegalitate se poate afirma că:

$$\begin{cases} |x_1| \leq \frac{r}{\sqrt{n}} \\ |x_2| \leq \frac{r}{\sqrt{n}} \\ \vdots \\ |x_n| \leq \frac{r}{\sqrt{n}} \end{cases}$$

Deci cu alte cuvinte mărginirea mulțimii  $A$  implică faptul că există  $r > 0$  astfel încât  $-\frac{r}{\sqrt{n}} \leq x_i \leq \frac{r}{\sqrt{n}}$ , oricare ar fi  $i = \overline{1, n}$  rezultă că mulțimea proiecțiilor de indice  $i$  fixat ale elementelor mulțimii  $A$  este o mulțime mărginită.

*Reciproc.*

Se presupune că fiecare proiecție este mărginită și se demonstrează că  $A \subset \mathbb{R}^n$  este mărginită.

Într-adevăr dacă fiecare proiecție este mărginită, atunci are loc relația:

$$-\frac{r}{\sqrt{n}} \leq x_i \leq \frac{r}{\sqrt{n}}, \text{ pentru } r > 0 \text{ și orice } i = \overline{1, n}$$

rezultă

$$|x_i| \leq \frac{r}{\sqrt{n}}, \text{ oricare ar fi } i = \overline{1, n}$$

sau echivalent

$$x_i^2 \leq \frac{r^2}{n}, \text{ pentru orice } i = \overline{1, n}.$$

Atunci

$$\sum_{i=1}^n x_i^2 \leq r^2 \Rightarrow \sqrt{\sum_{i=1}^n x_i^2} \leq r. \text{ Deci } A \subset \mathbb{R}^n \text{ este mărginită.}$$

Așadar conform propoziției anterioare, pentru a studia mărginirea mulțimilor din  $\mathbb{R}^n$  este suficient să se studieze mărginirea mulțimilor din  $\mathbb{R}$ .

**Definiția 3.1.2.** Fie  $A \subset \mathbb{R}$ . Mulțimea  $A$  este mărginită dacă există un interval  $[a, b] \subset \mathbb{R}$ , unde  $a$  și  $b$  sunt numere reale finite astfel încât  $A \subset [a, b]$ ;

$a \in \mathbb{R}$  este un **minorant** pentru mulțimea  $A$  și  $b \in \mathbb{R}$  este un **majorant** pentru  $A$ .

**Observația 3.1.2.** Din definiția 3.1.2. este evident că o mulțime mărginită are o infinitate de minoranți și o infinitate de majoranți.

**Definiția 3.1.3.** Cel mai mare minorant al mulțimii  $A$  poartă denumirea de **marginie inferioară** a mulțimii  $A$  și se notează cu  $m_A$ , iar cel mai mic majorant poartă denumirea de **marginie superioară** a mulțimii  $A$  și se notează cu  $M_A$ .

**Observația 3.1.3.**

a) Dacă  $M_A$  este marginie superioară a mulțimii  $A \subset \mathbb{R}$  atunci are următoarele proprietăți:

1. pentru orice  $x \in A$ ,  $x \leq M_A$ ;
2. pentru orice  $\varepsilon > 0$ , există  $x \in A$  astfel încât  $x > M_A - \varepsilon$

b) Dacă  $m_A$  este marginie inferioară a mulțimii  $A \subset \mathbb{R}$  atunci are următoarele proprietăți:

1. pentru orice  $x \in A$ ,  $x \geq m_A$ ;
2. pentru orice  $\varepsilon > 0$  există  $x \in A$  astfel încât  $x < m_A + \varepsilon$

**Propoziția 3.1.2. (Unicitatea și existența marginilor unei mulțimi).** Orice mulțime de numere reale mărginită are o marginie superioară, respectiv o marginie inferioară. Aceste margini sunt unice.

Demonstrație:

Fie  $A \subset \mathbb{R}$  mărginită. Existența marginii superioare  $M_A$  se arată prin construcția efectivă a acesteia. Procedeu de construcție este următorul:

Fie  $n$  primul număr întreg care verifică proprietatea  $x < n$ , pentru orice  $x \in A$ . Acest număr există deoarece mulțimea  $A$  este mărginită, deci majorată superior.

$n - 1$  reprezintă partea întreagă a marginii superioare  $M_A$ .

Se împarte intervalul  $(n - 1, n)$  în zece părți egale. Fie  $n_1 \in (n - 1, n)$  cel mai mic număr de diviziune astfel încât  $x < n_1$ , oricare ar fi  $x \in A$ . Numărul  $n_1 - 0,1$  reprezintă pe  $M_A$  cu o zecimală exactă.

Se consideră intervalul  $(n_1 - 0,1, n_1)$ . Acest interval se împarte în zece părți egale.

Fie  $n_2 \in (n_1 - 0,1, n_1)$  cel mai mic număr de diviziune pentru care are loc proprietatea:  $x < n_2$  pentru orice  $x \in A$ . Numărul  $n_2 - 0,1$  reprezintă pe  $M_A$  cu două zecimale exacte. Se poate continua procedeul pentru determinarea lui  $M_A$  cu oricâte zecimale exacte.

În acest mod, teoretic rezultă existența lui  $M_A$  (deși uneori practic este imposibil să se determine  $M_A$ ). Unicitatea lui  $M_A$  se demonstrează prin reducere



la absurd. Adică se presupune că mai există o margine superioară a lui  $A$  notată  $M_{1A}$  astfel încât  $M_{1A} > M_A$ .

Fie  $\varepsilon = \frac{M_{1A} - M_A}{2}$ , atunci conform proprietății marginii superioare se afirmă

că există un  $x' \in A$  astfel încât:

$$x' > M_{1A} - \varepsilon = M_{1A} - \frac{M_{1A} - M_A}{2} = \frac{M_{1A} + M_A}{2} > \frac{2M_A}{2} = M_A \text{ rezultă}$$

$$x' > M_A, x' \in A$$

Dar aceasta contrazice faptul că  $M_A$  este marginea superioară. Contradicția provine din faptul că s-a presupus că mai există încă o margine superioară. Așadar marginea superioară este unică. În mod analog se raționează pentru marginea inferioară.

**Propoziția 3.1.3.** Fie  $(E, d)$  spațiu metric și  $x_0$  un punct de acumulare al mulțimii  $A \subset E$ . Orice vecinătate a punctului  $x_0$  conține o infinitate de puncte din mulțimea  $A$ .

Demonstratie:

Se raționează prin reducere la absurd.

Se presupune că există o vecinătate  $\bar{S}(x_0, r)$  a lui  $x_0$  care să conțină un număr finit de puncte din  $A$ . Fie acestea:  $y_1, y_2, \dots, y_n$ . Fie  $\delta_i = d(x_0, y_i)$  distanța de la  $x_0$  la  $y_i$ . Se notează  $\delta = \min\{\delta_1, \delta_2, \dots, \delta_n\}$ . Atunci  $\bar{S}(x_0, \delta) \cap A \setminus \{x_0\} = \emptyset$ . Se ajunge la contradicție cu definiția punctului de acumulare. Dacă  $E \equiv \mathbb{R}$  atunci  $\bar{S}(x_0, r) = [x_0 - r, x_0 + r]$ .

**Observația 3.1.4.**

a) Ținând cont de propoziția 3.1.3 rezultă că mulțimile cu un număr finit de elemente nu au puncte de acumulare.

b) După cum se știe  $N' = \emptyset$ . Deci există și mulțimi cu o infinitate de elemente care nu au puncte de acumulare. Atunci se pune problema care sunt mulțimile care au puncte de acumulare.

**Propoziția 3.1.4. (teorema lui Weirstrass-Bolzano).** Orice mulțime infinită și mărginită are cel puțin un punct de acumulare.

Demonstratie:

Se consideră că mulțimea  $A$  este o mulțime de numere reale.

Fie  $A \subset \mathbb{R}$  o mulțime mărginită cu o infinitate de elemente. Datorită faptului că mulțimea este mărginită rezultă că există  $[a, b]$  astfel încât  $A \subset [a, b]$ ,  $a, b \in \mathbb{Q}$ .

Fie  $c = \frac{a+b}{2}$  mijlocul acestui interval. Deoarece  $A$  este infinită, cel puțin unul din intervalele  $[a, c]$  sau  $[c, b]$  conține o infinitate de elemente și se notează  $[a_1, b_1]$  intervalul cu o infinitate de puncte din  $A$ .

Din modul cum a fost construit rezultă că  $b_1 - a_1 = \frac{b-a}{2}$ .

Fie  $c_1 = \frac{a_1+b_1}{2}$  mijlocul intervalului  $[a_1, b_1]$ . Atunci cel puțin unul din intervalele  $[a_1, c_1]$  sau  $[c_1, b_1]$  conține o infinitate de elemente ale mulțimii  $A$  și se notează  $[a_2, b_2]$  intervalul care conține infinitatea de puncte.

Din modul cum a fost construit rezultă  $b_2 - a_2 = \frac{b-a}{2^2}$ .

Fie  $c_2 = \frac{a_2+b_2}{2}$  mijlocul intervalului  $[a_2, b_2]$ . Deoarece acest interval conține o infinitate de puncte ale mulțimii  $A$ , atunci cel puțin unul din intervalele  $[a_2, c_2]$  sau  $[c_2, b_2]$  conține o infinitate de elemente ale mulțimii  $A$  și se notează  $[a_3, b_3]$  intervalul ce conține o infinitate de puncte.

Din modul cum a fost construit rezultă  $b_3 - a_3 = \frac{b-a}{2^3}$ .

Continuând astfel se obține intervalul  $[a_n, b_n]$  ce conține o infinitate de puncte din mulțimea  $A$  și  $b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n} \dots$

În acest mod s-au construit șirurile de numere raționale  $(a_n)_{n \geq 1}$ ,  $(b_n)_{n \geq 1}$  care verifică următoarele proprietăți:

$$1) a_1 < a_2 < \dots < a_n < \dots < b_n < \dots < b_2 < b_1$$

$$2) b_n - a_n = \frac{b-a}{2^n}$$

Două șiruri de numere raționale care verifică aceste proprietăți au limită și limita lor este comună.

$$\text{Deci există } x_0 = \lim_{n \rightarrow \infty} a_n \text{ și } x_0 = \lim_{n \rightarrow \infty} b_n.$$

Se arată în continuare că punctul  $x_0$  astfel construit este un punct de acumulare al mulțimii  $A$ .

Fie  $\varepsilon > 0$  un număr pozitiv arbitrar, atunci există un rang  $N \in \mathbb{N}$  astfel încât pentru orice  $n > N$  să rezulte că intervalul  $[a_n, b_n]$  este inclus în intervalul  $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon)$  care este o vecinătate oarecare a lui  $x_0$  în cazul topologiei metrice a lui  $\mathbb{R}$  cu metrica euclidiană.

Dar intervalul  $[a_n, b_n]$  conține o infinitate de termeni ai mulțimii  $A$ , deci rezultă  $(x_0 - \varepsilon, x_0 + \varepsilon) \cap A \setminus \{x_0\} \neq \emptyset$ .

Cum  $\varepsilon$  a fost ales arbitrar rezultă  $x_0 \in A'$ , adică  $x_0$  este punct de acumulare al mulțimii  $A$ .

### Observația 3.1.5.

a) Demonstrația anterioară este dată pentru mulțimi de numere reale ( $A \subset \mathbb{R}$ ), dar ea este adevărată și pentru mulțimi  $A \subset \mathbb{R}^m$  și în acest caz intervalul  $[a, b]$  care s-a considerat în demonstrație se înlocuiește cu o sferă închisă  $\bar{S}(x_0, r)$  ce include mulțimea  $A$ .

b) Dacă  $x_0 \in A$  nu este punct de acumulare al mulțimii  $A$ , atunci el este un punct izolat al acesteia.

c) Dacă  $A \subset \mathbb{R}$  este mărginită, rezultă că  $A'$  este o mulțime mărginită.

Marginea superioară a mulțimii  $A'$  se notează  $L_A$ , iar marginea inferioară se notează cu  $I_A$  și mai poartă denumirea de **limită superioară**, respectiv **limită inferioară** a mulțimii  $A$ . Se mai scrie astfel:

$$L_A = \overline{\lim} A; I_A = \underline{\lim} A.$$

$L_A$  are următoarele proprietăți:

1. la dreapta lui  $L_A + \varepsilon$ , oricare ar fi  $\varepsilon > 0$ , există un număr finit de puncte din mulțimea  $A$ ;

2. la dreapta lui  $L_A - \varepsilon$ , oricare ar fi  $\varepsilon > 0$ , există o infinitate de puncte ale mulțimii  $A$ .

$I_A$  are proprietăți analoge cu  $L_A$ .

Între cele patru numere importante pentru o mulțime mărginită  $A$ , există următoarea relație:

$$m_A \leq I_A \leq L_A \leq M_A.$$

Punctul c) al observației 3.1.5 este evident ținând cont de aceste inegalități.

## 2. Tipuri de mulțimi

### 2.1. Mulțimi compacte

**Definiția 3.2.1.** O familie de mulțimi  $\mathfrak{A} = \{ A_i \mid i \in I \}$  constituie o **acoperire a mulțimii  $B$** , dacă  $B \subset \bigcup_{i \in I} A_i$ .

Dacă mulțimile  $A_i$  sunt toate mulțimi deschise, se spune că  $\mathfrak{A}$  este o acoperire deschisă a lui  $B$ .

Dacă  $I$  este finită atunci acoperirea este finită.

**Observație:**  $A$  este deschisă dacă  $A = \overset{0}{A}$ ;  $A$  este închisă dacă  $A = \bar{A}$  sau  $C_A$  este deschisă.

**Definiția 3.2.2.** O mulțime  $C \subset \mathbb{R}$  este **compactă** dacă este închisă și mărginită.

**Exemple:**

1. Dacă  $A = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$  atunci  $A$  este compactă.
2.  $(\forall) a, b \in \mathbb{R}; a < b$ , intervalul  $[a, b]$  este mulțime compactă.
3. În  $\mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3, \mathbb{R}^n$   $\bar{S}(x_0, r)$ ,  $r < \infty$  este o mulțime compactă.

**Propoziția 3.2.1.** Dacă  $C \subset \mathbb{R}$  este o mulțime compactă, atunci din orice acoperire a sa cu intervale deschise se poate extrage o acoperire finită (**Borel-Lebesgue**).

## 2.2. Mulțimi conexe

Noțiunea de mulțime conexă poate fi exprimată intuitiv spunând că este formată dintr-o simplă bucată.

**Definiția 3.2.3.** Fie  $A$  și  $B$  două mulțimi. Se spune că  $A$  și  $B$  sunt **separate** dacă:

$$\bar{A} \cap B = A \cap \bar{B} = \emptyset.$$

**Definiția 3.2.4.** Mulțimea  $M$  este **conexă** dacă nu poate fi scrisă că o reuniune a două mulțimi nevide și separate.

Un criteriu destul de intuitiv care exprimă conexitatea unei mulțimi din  $\mathbb{R}^2$  sau  $\mathbb{R}^3$  este dat de propoziția următoare.

**Propoziția 3.2.2.** Mulțimea  $A \subset \mathbb{R}^n$ ,  $n = \overline{1, 2}$ , este conexă dacă orice două puncte  $x, y \in A$  pot fi legate între ele cu o linie poligonală  $L$  ale cărei puncte aparțin în totalitate lui  $A$ .

**Exemple:**




Figura 1




Figura 2

Mulțimea din figura 1 este conexă, iar mulțimea din figura 2 (nu se consideră punctele curbei  $C_2$ ) nu este conexă.

**Definiția 3.2.5.**

- a) O mulțime  $D$  deschisă și conexă se numește **domeniu**.
- b) O mulțime  $F$  închisă și conexă se numește **continuu**.

**Exemple:**

- 1)  $(a,b)$ ,  $S(x_0,r)$ ,  $r > 0$  este domeniu
- 2)  $[a,b]$ ;  $\bar{S}(x_0,r)$ ,  $r > 0$  este continuu.

O categorie foarte importantă de mulțimi sunt cele definite în continuare.

**Definiția 3.2.6.**

- a)  $A$  este mulțime **rară** dacă  $\bar{A} = \phi$ .
- b) Dacă  $A = \bigcup_{n=1}^{\infty} A_n$  și  $A_n$  sunt mulțimi rare atunci  $A$  este mulțime **slabă** sau de **categororia I-a Baire**.
- c) Dacă  $A = A'$  atunci  $A$  este mulțime **perfectă**.

Un exemplu de mulțime rară și perfectă este mulțimea lui Cantor (vezi Exercițiul 2.5)

### 3. Șiruri în spații topologice, spații metrice, spații vectoriale normate

**Definiția 3.3.1.** Fie  $E$  o mulțime oarecare și  $f : \mathbb{N} \rightarrow E$  o funcție,  $x_n = f(n)$  poartă denumirea de **termenul general al șirului** generat de funcția  $f$  în mulțimea  $E$ , iar șirul de elemente din mulțimea  $E$  ce are acest termen general se mai notează și astfel:

$(x_n)_{n \geq 0}$  (nu interesează forma termenilor șirului) sau  
 $\{x_n\}_{n \geq 0}$  (șirul este considerat ca o mulțime; interesează elementele lui).

### Observația 3.3.1.

a) Se observă din definiția anterioară că șirul este mulțimea valorilor unei funcții oarecare  $f$ , dar care are domeniul de definiție  $\mathbb{N}$ .

b) Natura elementelor mulțimii  $E$ , dă tipul șirului. Astfel:

$E = \mathbb{R}$  - șir de numere reale;

$E = \mathbb{C}$  - șirul este de numere complexe;

$E = \mathbb{R}^n$  - șir de elemente din  $\mathbb{R}^n$ ;

$E = B^A$  - șirul funcțiilor  $f : A \rightarrow B$ .

c) Pentru a putea fi făcut un studiu complet al șirurilor, mulțimea  $E$  trebuie să fie organizată cu structura de spațiu vectorial normat.

Dar studiul șirurilor mai poate fi efectuat și dacă  $E$  este înzestrată cu structura de spațiu metric sau de spațiu topologic (nu se pot face operații cu șiruri).

Problema care se pune în legătură cu șirurile, după cum se știe este monotonia, mărginirea și convergența acestora.

### Monotonia:

Monotonia șirului  $(x_n)_{n \geq 0}$ ,  $x_n \in E$  are sens numai dacă  $E$  este o mulțime ordonată și această noțiune se definește astfel:

**Definiția 3.3.2.** Fie  $\mathfrak{R}$  o relație de ordine pe mulțimea  $E$ . Se spune că șirul  $(x_n)_{n \geq 0}$  este **monoton** dacă oricare ar fi  $n, m \in \mathbb{N}$  cu  $n > m$  rezultă  $x_n \mathfrak{R} x_m$ .

Dacă  $E = \mathbb{R}$  atunci  $\mathfrak{R} \equiv "<"$  sau  $\mathfrak{R} \equiv "\leq"$ .

După cum se știe, monotonia șirurilor de numere reale este:

a)  $n < m$  rezultă  $x_n < x_m$  - șirul strict crescător;

b)  $n < m$  rezultă  $x_n \leq x_m$  - șirul crescător.

În mod asemănător se definesc șirurile descrescătoare.

Aceste afirmații sunt cazuri particulare ale definiției 3.2.2.

### Mărginirea:

Noțiunea de mărginire a unui șir este posibilă dacă mulțimea  $E$  este un spațiu metric cel puțin. Cum șirul este de fapt mulțimea  $\{x_n\}_{n \geq 0}$ , definiția mărginirii este următoarea:

**Definiția 3.3.3.** Fie  $(E, d)$  spațiu metric, șirul  $\{x_n\}_{n \geq 0}$ ,  $x_n \in E$  este **mărginit**, dacă există  $x_0 \in E$  fixat și  $r > 0$ , astfel încât  $d(x_0, x_n) \leq r$ , pentru orice  $x_n \in \{x_n\}$ ,  $n \geq 0$ .

Cum orice șir poate fi considerat ca o mulțime, folosind notația  $\{x_n\}_{n \geq 0}$  toate afirmațiile legate de mulțimi mărginite sunt valabile și pentru șiruri.

Dacă  $E = \mathbb{R}^m$ , atunci șirul  $(x_n)_{n \geq 0}$ ;  $x_n \in \mathbb{R}^m$  are următoarea formă:

$x_n = (x_n^1, x_n^2, \dots, x_n^{m-1}, x_n^m)$  unde  $(x_n^i)_{n \geq 0}$ ,  $i = \overline{1, m}$  sunt șiruri de numere reale care se mai numesc proiecțiile șirului  $(x_n)_{n \geq 0}$ .

Deoarece un șir este o mulțime, propoziția referitoare la mărginirea mulțimilor din  $\mathbb{R}^m$  se transpune și la mărginirea șirurilor astfel:

**Propoziția 3.3.1.** Fie  $(x_n)_{n \geq 0}$ ,  $x_n \in \mathbb{R}^m$  un șir de elemente din  $\mathbb{R}^m$ ; acest șir este mărginit dacă și numai dacă fiecare proiecție a sa  $(x_n^i)_{n \geq 0}$ ,  $i = \overline{1, m}$  este un șir mărginit.

### Convergența:

Noțiunea de convergență a unui șir  $(x_n)_{n \geq 0}$  este posibilă dacă mulțimea  $E$  este înzestrată cu structura de spațiu topologic, spațiu metric, spațiu vectorial normat. Definierea convergenței în aceste structuri este următoarea:

**Definiția 3.3.4.** Fie  $(E, \tau)$  un spațiu topologic și  $(x_n)_{n \geq 0}$  un șir din acest spațiu. Se spune că șirul  $(x_n)_{n \geq 0}$  este **convergent în topologia  $\tau$**  dacă există  $x_0 \in E$  astfel încât pentru orice  $V_{x_0}$  o vecinătate a punctului  $x_0$ , există un rang  $N$  astfel încât pentru orice  $n > N$  rezultă  $x_n \in V_{x_0}$ .

c.c. (Șirul  $(x_n)_{n \geq 0}$  converge către  $x_0$ , dacă orice vecinătate conține un număr infinit de termeni, iar în afara oricărei vecinătăți se află un număr finit de termeni ai șirului).

**Definiția 3.3.5.** Fie  $(E, d)$  un spațiu metric și  $(x_n)_{n \geq 0}$  un șir din acest spațiu; se spune că  $(x_n)_{n \geq 0}$  este **convergent în metrica  $d$** , dacă există  $x_0 \in E$  astfel încât oricare ar fi  $\varepsilon > 0$ , există  $N(\varepsilon) > 0$  astfel încât pentru orice  $n > N(\varepsilon)$  rezultă  $d(x_0, x_n) < \varepsilon$ .

Dacă  $E = \mathbb{R}$  și  $d$  este matricea euclidiană pe  $\mathbb{R}$  adică modulul, atunci definiția 3.2.5. are forma:  $(x_n)_{n \geq 0}$ ,  $x_n \in \mathbb{R}$  este convergent, dacă există  $x_0 \in \mathbb{R}$  astfel încât oricare ar fi  $\varepsilon > 0$ , există  $N(\varepsilon) > 0$  astfel încât oricare ar fi  $n > N(\varepsilon)$  rezultă  $|x_n - x_0| < \varepsilon$ .

**Definiția 3.3.6.** Fie  $(E, \|\cdot\|)$  spațiu vectorial normat. Șirul  $(x_n)_{n \geq 0}$ ,  $x_n \in E$  este **convergent** dacă există  $x_0 \in E$  astfel încât oricare ar fi  $\varepsilon > 0$ , există  $N(\varepsilon) > 0$  astfel încât pentru orice  $n > N(\varepsilon)$  rezultă  $\|x_n - x_0\| < \varepsilon$ .

**Observația 3.3.2.**

a) Elementul  $x_0 \in E$  care apare în definițiile 3.3.4, 3.3.5, 3.3.6 poartă denumirea de limită a șirului  $x_n$  și acest lucru se scrie astfel :

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x_0 \text{ sau } x_n \rightarrow x_0$$

b) Definițiile 3.3.4., 3.3.5., 3.3.6. sunt echivalente.

**Propoziția 3.3.2. (Unicitatea limitei):**

Fie  $(E, \tau)$  spațiu topologic separat și  $x_n \xrightarrow{\tau} x_0$  atunci  $x_0$  este unică.

Demonstratie:

Se presupune că  $x_0$  nu este unică, adică există  $y_0 \in E$  astfel încât  $x_n \xrightarrow{\tau} y_0$ .

Conform definiției 3.3.4 se poate scrie că:

$$x_n \xrightarrow{\tau} x_0 \Leftrightarrow [(\forall) V_{x_0} (\exists) N_1 \in N \text{ a.î. } (\forall) n > N_1 \Rightarrow x_n \in V_{x_0}]$$

$$x_n \xrightarrow{\tau} y_0 \Leftrightarrow [(\forall) V_{y_0} (\exists) N_2 \in N \text{ a.î. } (\forall) n > N_2 \Rightarrow x_n \in V_{y_0}]$$

Dacă se notează  $N = \max\{N_1 \text{ și } N_2\}$ , atunci din cele două afirmații rezultă că pentru orice  $n > N$  avem  $x_n \in V_{x_0}$  și  $x_n \in V_{y_0}$  de unde rezultă  $V_{x_0} \cap V_{y_0} \neq \emptyset$ , contradicție cu faptul că  $E$  este spațiu topologic separat. Deci rezultă  $x_0 \equiv y_0$ , ceea ce demonstrează unicitatea limitei.

**Observația 3.3.2.**

Dacă spațiul topologic nu este separat, un șir convergent poate avea mai multe limite, ceea ce arată că în spații topologice neseperate convergența nu este bine definită. În spațiul metric și spațiul vectorial normat convergența este bine definită deoarece se știe că orice spațiu vectorial normat este un spațiu metric și orice spațiu metric este spațiu topologic separat.

**Propoziția 3.3.3.** Fie  $(x_n)_{n \geq 0}$ ,  $x_n \in \mathbb{R}^n$ . Șirul  $(x_n)_{n \geq 0}$  este convergent dacă și numai dacă orice proiecție a sa este convergentă.

Demonstratie:

Se presupune că  $(x_n)_{n \geq 0}$ ,  $x_n \in \mathbb{R}^m$  este un șir convergent.

Se demonstrează că  $(x_n^i)_{n \geq 0}$  este convergent, oricare ar fi  $i = \overline{1, m}$ .

$$\text{Fie } x_n \in \mathbb{R}^m \Rightarrow x_n = (x_n^1, x_n^2, x_n^3, \dots, x_n^m).$$



Datorită faptului că șirul este convergent către  $x_0 = (x_0^1, x_0^2, x_0^3, \dots, x_0^m)$ , rezultă conform definiției 3.3.5 că:

$(\forall) \varepsilon > 0$ ,  $(\exists) N(\varepsilon) > 0$  astfel încât  $(\forall) n > N(\varepsilon)$ , rezultă

$\sqrt{(x_n^1 - x_0^1)^2 + (x_n^2 - x_0^2)^2 + \dots + (x_n^m - x_0^m)^2} < \varepsilon$ . Din această inegalitate se obține:

$$\begin{cases} |x_n^1 - x_0^1| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{m}} = \varepsilon' \\ |x_n^2 - x_0^2| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{m}} = \varepsilon' \\ \vdots \\ |x_n^m - x_0^m| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{m}} = \varepsilon' \end{cases}$$

Deci rezultă că proiecțiile  $(x_n^i)_{n \geq 0}$ ,  $i = \overline{1, m}$  sunt convergente către numerele reale  $x_0^i$ ,  $i = \overline{1, m}$ .

**Reciproc:**

Se presupune că  $x_n^i \rightarrow x_0^i$ ,  $i = \overline{1, m}$  și se demonstrează că  $x_n \rightarrow x_0$ .

Raționamentul se face în mod analog. Într-adevăr,  $(\forall) \varepsilon > 0$ ,  $(\exists) N(\varepsilon) > 0$  astfel încât:

$$\begin{cases} |x_n^1 - x_0^1| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{n}} \\ \vdots \\ |x_n^m - x_0^m| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{n}} \end{cases}$$

Prin ridicare la pătrat se obține:

$$\begin{cases} (x_n^1 - x_0^1)^2 < \frac{\varepsilon^2}{n} \\ \vdots \\ (x_n^m - x_0^m)^2 < \frac{\varepsilon^2}{n} \end{cases}$$

Adunând inegalitățile termen cu termen se obține:

$$(x_n^1 - x_0^1)^2 + \dots + (x_n^m - x_0^m)^2 < \frac{n\varepsilon^2}{n}$$

sau

$$\sqrt{(x_n^1 - x_0^1)^2 + \dots + (x_n^m - x_0^m)^2} < \varepsilon$$

**Observația 3.3.4.**

a) Propoziția 3.3.3. reduce convergența șirurilor din  $\mathbb{R}^m$  la convergența a  $m$  șiruri de numere reale  $(x_n^i)_{n \geq 0}$ ;  $i = \overline{1, m}$ , numite proiecțiile șirului din  $\mathbb{R}^m$ .

b) Conform propoziției 3.3.3 dacă  $(x_n)_{n \geq 0}$ ,  $x_n \in \mathbb{R}^m$  este convergent către  $x_0 \in \mathbb{R}^m$ , atunci are loc următoarea egalitate:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \left( \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^1, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^2, \dots, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^m \right)$$

c) Ținând cont de definiția mărginirii și definiția convergenței, rezultă că orice șir convergent este mărginit, dar reciproca nu este în general valabilă.

**Exemple:**

1. Fie  $x_n = \left( \frac{1}{n+1}; \sqrt[n]{n}; n \sin \frac{\pi}{n} \right)$

Să se studieze convergența acestui șir, în caz afirmativ să se calculeze limita sa.

Rezolvare:

Proiecțiile șirului sunt:

$$x_n^1 = \frac{1}{n+1}; \quad x_n^2 = \sqrt[n]{n}; \quad x_n^3 = n \sin \frac{\pi}{n}$$

Conform propoziției 3.3.3., șirul  $x_n$  este convergent dacă fiecare proiecție a sa este convergentă și are loc relația:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \left( \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^1, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^2, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^3 \right)$$

Se studiază convergența proiecțiilor calculând direct limitele:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} = 0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n+1}{n} = 1 \text{ (s-a aplicat consecința lemei lui Stolz)}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^3 = \lim_{n \rightarrow \infty} n \sin \frac{\pi}{n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \pi \frac{\sin \frac{\pi}{n}}{\frac{\pi}{n}} = \pi$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = (0; 1; \pi).$$

2. Fie  $x_n = \left( \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + k^2}}, \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} \right)$ . Să se studieze convergența și în caz

afirmativ să se calculeze limita sa.

Rezolvare:

$$x_n^1 = \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2 + k^2}} = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{1 + \left(\frac{k}{n}\right)^2}};$$

$$x_n^2 = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)} = \sum_{k=1}^n \left( \frac{1}{k} - \frac{1}{k+1} \right) = 1 - \frac{1}{n+1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \left( \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^1, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^2 \right) = \left( \int_0^1 \frac{dx}{\sqrt{1-x^2}}, 1 \right) = \left( \arcsin \Big|_0^1; 1 \right) = \left( \frac{\pi}{2}; 1 \right).$$

## 4. Șiruri Cauchy

Noțiunea de șir Cauchy sau fundamental este o noțiune utilă în studiul convergenței șirurilor atunci când limita este greu sau imposibil de calculat.

Această noțiune se definește astfel:

**Definiția 3.4.1.** Fie  $(E, d)$  spațiul metric și  $(x_n)_{n \geq 0}$ ,  $x_n \in E$ , un șir de elemente ale acestui spațiu. Se spune că șirul  $(x_n)_{n \geq 0}$  este un șir **Cauchy** sau **șir fundamental**, dacă și numai dacă pentru orice  $\varepsilon > 0$ , există  $N(\varepsilon) > 0$  astfel încât oricare ar fi  $n, m > N(\varepsilon)$  rezultă că  $d(x_n, x_m) < \varepsilon$ .

### Observația 3.4.1.

a) Este simplu de observat că dacă  $E = \mathbb{R}$  sau  $E = \mathbb{R}^p$  condiția din definiția 3.4.1 devine

$$|x_n - x_m| < \varepsilon \text{ sau } \sqrt{\sum_{i=1}^p (x_n^i - x_m^i)^2} < \varepsilon.$$

b) Deoarece  $n, m \in \mathbb{N}$ , dacă se consideră  $m > n$ , atunci există un număr natural  $p$  oarecare, dar fixat astfel încât  $m = n + p$ .

c) Ținând cont de “b)” condiția din definiția 3.3.1 în acest caz devine  $d(x_n, x_{n+p}) < \varepsilon$ , pentru orice  $p \in \mathbb{N}$ .

**Propoziția 3.4.1.** Orice șir convergent este un șir fundamental sau un șir Cauchy.

### Demonstrație:

Fie  $(x_n)_{n \geq 0}$  un șir convergent către  $x_n \in E$ , unde  $E$  este un spațiu metric înzestrat cu metrica  $d$ . Conform definiției convergenței în spații metrice au loc următoarele afirmații:

- pentru orice  $\varepsilon > 0$ , există  $N_1(\varepsilon) > 0$  astfel încât  $n > N_1(\varepsilon)$  rezultă  $d(x_0, x_n) < \varepsilon$
- pentru orice  $\varepsilon > 0$ , există  $N_2(\varepsilon) > 0$  astfel încât  $m > N_2(\varepsilon)$  rezultă  $d(x_0, x_m) < \varepsilon$ .

Fie  $N(\varepsilon) = \max\{N_1(\varepsilon), N_2(\varepsilon)\}$  atunci au loc simultan relațiile:

- oricare ar fi  $n > N(\varepsilon)$  rezultă  $d(x_0, x_n) < \varepsilon$
- oricare ar fi  $m > N(\varepsilon)$  rezultă  $d(x_0, x_m) < \varepsilon$ . Atunci rezultă că pentru orice  $n, m > N(\varepsilon)$  avem:

$$d(x_n, x_m) \leq d(x_0, x_n) + d(x_0, x_m) < 2\varepsilon = \varepsilon'. \text{ Deci } d(x_n, x_m) < \varepsilon.$$

Conform cu definiția 3.4.1 șirul  $(x_n)_{n \geq 0}$  este un șir Cauchy.

### Observația 3.4.2.

Reciproca propoziției 3.4.1 nu este în general valabilă, așa cum reiese din exemplul următor:

#### Exemplu:

Fie  $x_n \in \mathbb{Q}$  definit astfel  $x_1 = 1$ ;  $x_2 = 1,4$ ;  $x_3 = 1,41$ ; ... șirul care aproximează prin lipsă pe  $\sqrt{2}$ .

Este evident că oricare ar fi  $\varepsilon > 0$ , există  $N(\varepsilon) > 0$ , astfel încât  $(\forall) n, m > N(\varepsilon)$  rezultă că  $|x_n - x_m| < \varepsilon$ ; deci  $(x_n)_{n \geq 1}$  este un șir **Cauchy**.

Dar în spațiul metric  $(\mathbb{Q}, d)$ , spațiul din care fac parte toți termenii șirului, acesta nu este convergent pentru că el are limita  $\sqrt{2} \notin \mathbb{Q}$ .

Acest exemplu arată că există șiruri **Cauchy** care nu sunt convergente.

### Propoziția 3.4.2. Orice șir **Cauchy** este un șir mărginit.

#### Demonstrație:

Fie  $(x_n)_{n \geq 0}$ ,  $x_n \in E$ ,  $E$  spațiu metric înzestrat cu metrica  $d$ .

Dacă  $(x_n)_{n \geq 0}$  este un șir **Cauchy**, atunci conform definiției 3.4.1 se poate afirma că pentru orice  $\varepsilon > 0$ , există  $N(\varepsilon) = n_0 > 0$ , astfel încât oricare ar fi  $n, m > n_0$  rezultă  $d(x_n, x_m) < \varepsilon$ .

Aceasta înseamnă că pentru termenii  $x_0, x_1, \dots, x_{n_0}$  are loc relația:

$$d(x_{n_0}, x_i) \geq \varepsilon, (\forall) i = \overline{0, n_0}.$$

Fie  $\delta = \max_{i=0}^{n_0} \{d(x_{n_0}, x_i)\}$  atunci

$$d(x_{n_0}, x_m) < \delta + \varepsilon = r > 0 \text{ pentru orice } m \in \mathbb{N}.$$

Ceea ce arată că mulțimea  $\{x_0, x_1, \dots, x_{n_0}, \dots\}$  este mărginită, adică șirul  $(x_n)_{n \geq 0}$  este un șir mărginit.

### Observația 3.4.3.

a) S-a văzut că nu orice șir **Cauchy** este și șir convergent. Spațiile metrice în care are loc această afirmație se numesc spații metrice complete sau spații

BANACH. Deci un spațiu BANACH este un spațiu metric care verifică următoarea proprietate:

**Orice șir convergent de elemente din spațiul BANACH are limită în acest spațiu.**

b)  $E = \mathbb{Q}$ ;  $d$  - metrică euclidiană; nu este spațiu BANACH.

$E = \mathbb{R}^m, m \geq 1$ ;  $d$  - metrică euclidiană; este spațiu BANACH.

$E = [a, b] \subset \mathbb{R}$ ;  $d$  - metrică euclidiană; este spațiu BANACH.

**Propoziția 3.4.3. (criteriul de convergența al lui Cauchy pentru șiruri).** Într-un spațiu metric complet un șir este convergent dacă și numai dacă este un șir **Cauchy**.

Demonstrație:

Faptul că orice șir convergent este un șir **Cauchy** s-a demonstrat.

Se presupune că șirul este **Cauchy** și se va arăta că este convergent.

Pentru a ușura scrierea se presupune  $E = \mathbb{R}$ , iar metrica se consideră metrica euclidiană.

Fie  $x_n \in \mathbb{R}$  șir **Cauchy** sau fundamental, rezultă că pentru orice  $\varepsilon > 0$ , există  $N(\varepsilon) > 0$ , astfel încât  $(\forall)n > N(\varepsilon), |x_{n+p} - x_n| < \varepsilon$ , pentru orice  $p \in \mathbb{N}$ .

Ținând cont de proprietatea modulului, relația anterioară devine:

$$|x_{n+p} - x_n| < \varepsilon \Leftrightarrow x_n - \varepsilon < x_{n+p} < x_n + \varepsilon.$$

Dacă în această inegalitate se fixează  $n = n_0$  rezultă  $x_{n_0} - \varepsilon < x_{n_0+p} < x_{n_0} + \varepsilon$ , oricare ar fi  $p \in \mathbb{N}$  ceea ce arată că mulțimea  $x_{n_0+1}, x_{n_0+2}, \dots$ , este o mulțime mărginită, adică șirul  $\{x_n\}_{n \geq 0}$  este mărginit; dar se știe conform **teoremei Weierstrass-Bolzano** că orice mulțime infinită și mărginită are cel puțin un punct de acumulare.

Dacă în cazul de față punctul de acumulare este unic, teorema este demonstrată.

Se presupune că există mai multe puncte de acumulare pentru șirul  $\{x_n\}_{n \geq 0}$ .

Fie  $L$  cel mai mare dintre acestea și  $I$  cel mai mic dintre acestea, deci vor avea loc relațiile:

$$x_{n_0} - \varepsilon < L < x_{n_0} + \varepsilon \text{ echivalent cu } |L - x_{n_0}| < \varepsilon$$

$$x_{n_0} - \varepsilon < I < x_{n_0} + \varepsilon \text{ echivalent cu } |I - x_{n_0}| < \varepsilon$$

rezultă

$$|L - x_{n_0}| + |x_{n_0} - I| < 2\varepsilon = \varepsilon'$$

rezultă

$$|L - I| < \varepsilon'$$

cum  $\varepsilon'$  este orice număr pozitiv, rezultă  $L = I$ , adică nu pot exista mai multe puncte de acumulare.

## 5. Subșiruri. Principiul contracției

**Definiția 3.5.1.** Fie  $x_n = f(n)$  termenul general al unui șir de elemente din spațiul metric  $E$ , generat de funcția  $f$  și  $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  o funcție oarecare.

$x_{g(n)} = (f \circ g)(n)$ , este termenul general al unui subșir al șirului  $(x_n)_{n \geq 0}$  generat de funcția  $g$ .

### Observația 3.5.1.

a) Cum mulțimea  $\mathbb{N}^{\mathbb{N}}$  este o mulțime de puterea continutului rezultă că un șir are o infinitate de puterea continutului de subșiruri.

b) Este evident că  $\{x_n\}_{n \geq 0} \supseteq \{x_{g(n)}\}_{n \geq 0}$ .

### Exemplu:

Dacă  $g : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$ ,  $g(n) = 2n$ , subșirul extras de această funcție din șirul  $(x_n)_{n \geq 0}$  este format numai din termenii indice par ai șirului inițial, adică  $x_0, x_2, x_4, \dots, x_{2n}, x_{2n+2}, \dots$

Subșirurile pot fi considerate ca șiruri dacă ele nu se raportează la șirurile din care sunt extrase.

Subșirurile prezintă un rol de seamă în studiul convergenței șirului din care ele sunt extrase, așa cum rezultă din următoarea propoziție.

### Propoziția 3.5.1.

a) Fie  $p \in \mathbb{N}$  un număr oarecare, dar fixat. Atunci funcțiile  $g_i : \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{N}$  definite prin  $g_i(k) = pk + i$ ,  $i = \overline{0, p-1}$  generează  $p$  subșiruri ale șirului dat  $(x_n)_{n \geq 0}$ .

Acestea sunt  $\{x_{pk}\}_{k \geq 0}$ ,  $\{x_{pk+1}\}_{k \geq 0}$ ,  $\{x_{pk+2}\}_{k \geq 0}$ ,  $\dots$ ,  $\{x_{pk+p-1}\}_{k \geq 0}$ .

Dacă fiecare din aceste subșiruri sunt convergente și au fiecare aceeași limită  $l$ , atunci șirul  $(x_n)_{n \geq 0}$  este convergent și are limita  $l$ .

b) Orice subșir al unui șir convergent este convergent și are aceeași limită ca a șirului.

**Propoziția 3.5.2. (lema lui Cesaro).** Din orice șir mărginit se poate extrage un subșir convergent.

### Demonstrație:

Fie  $(x_n)_{n \geq 0}$  un șir mărginit de numere reale, deci conform definiției mărginirii rezultă că există  $a, b \in \mathbb{Q}$  astfel încât  $a \leq x_n \leq b$  pentru orice  $n \geq 0$ .

Dacă mulțimea valorilor șirului  $\{x_n\}_{n \geq 0}$  are un număr finit de elemente, atunci cu siguranță șirul  $\{x_n\}_{n \geq 0}$  conține cel puțin un subșir constant. Și cum orice

șir constant este convergent rezultă că din orice șir mărginit se poate extrage un subșir convergent.

Dacă mulțimea  $\{x_n\}_{n \geq 0} \in \mathbb{S}_0$ , atunci aceasta fiind și o mulțime mărginită, conform cu **teorema Weierstrass-Bolzano**, rezultă că are cel puțin un punct de acumulare.

Fie  $x_0$  unul dintre punctele de acumulare, atunci conform definiției punctului de acumulare, în interiorul intervalului  $(x_0 - 1; x_0 + 1)$  există o infinitate de termeni ai șirului  $(x_n)_{n \geq 0}$ .

Fie  $x'_1 \neq x_0$  unul dintre acestea.

În vecinătatea  $\left(x_0 - \frac{1}{2}, x_0 + \frac{1}{2}\right)$  de asemenea există o infinitate de termeni ai șirului.

Fie  $x'_2$  unul dintre aceștia cu proprietatea că  $x'_2 \neq x_0$  și  $x'_2 \neq x'_1$ .

Și așa mai departe, continuând raționamentul, rezultă că în vecinătatea  $\left(x_0 - \frac{1}{n}, x_0 + \frac{1}{n}\right)$  există o infinitate de termeni ai șirului  $(x_n)_{n \geq 0}$ .

Fie  $x'_n$  unul dintre aceștia cu proprietatea că  $x'_n \neq x_k$  pentru orice  $k = \overline{0, n-1}$ ...

În acest fel s-a construit șirul  $x'_1, x'_2, \dots, x'_n, \dots$  care din modul de construcție este evident că are limita  $x_0$ . Dar acest șir așa cum a fost construit este un subșir al șirului  $(x_n)_{n \geq 0}$  și așa lema a fost demonstrată.

**Propoziția 3.5.3.** Orice șir monoton și mărginit de numere reale este convergent.

Demonstrație:

Fie  $(x_n)_{n \geq 0}$ ,  $x_n \in \mathbb{R}$  șir monoton și mărginit. Fără a micșora generalitatea propoziției presupunem că  $(x_n)_{n \geq 0}$  este crescător.

Fiind mărginită mulțimea  $\{x_n\}_{n \geq 0}$  nu poate avea puncte de acumulare infinite.

Fie  $L = \overline{\lim}\{x_n\}$  și  $l = \underline{\lim}\{x_n\}$  se consideră  $\varepsilon = \frac{L-l}{3}$ .

Atunci, conform definiției punctului de acumulare rezultă că în vecinătatea  $(l - \varepsilon, l + \varepsilon)$  și  $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$  există câte o infinitate de termeni ai șirului.

Fie  $x_{n_1} \in (l - \varepsilon, l + \varepsilon)$ ,  $x_{n_2} \in (L - \varepsilon, L + \varepsilon)$  astfel încât  $n_1 \geq n_2$ .

Datorită faptului că vecinătățile conțin o infinitate din termenii șirului, această alegere este posibilă; în plus există  $x_{n_3} \in (l - \varepsilon, l + \varepsilon)$  astfel încât  $n_2 < n_3$ .

Dar  $x_{n_1} < x_{n_2}$  și  $x_{n_2} > x_{n_3}$  contrazic faptul că șirul este crescător.

Contradicția provine din faptul că a fost admisă existența celor două vecinătăți  $(l - \varepsilon, l + \varepsilon)$ ,  $(L - \varepsilon, L + \varepsilon)$ .

Cum aceste vecinătăți nu pot exista simultan, rezultă  $L = l$ , adică șirul trebuie să fie convergent.

**Propoziția 3.5.4. (lema lui Stolz).** Fie  $(x_n)_{n \geq 0}$  și  $(y_n)_{n \geq 0}$  două șiruri de numere reale care satisfac proprietățile:

1°  $(x_n)_{n \geq 0}$  șir oarecare;

2°  $(y_n)_{n \geq 0}$  șir monoton și nemărginit;

3°  $\frac{x_{n+1} - x_n}{y_{n+1} - y_n} \rightarrow \ell$

Atunci și raportul  $\frac{x_n}{y_n} \rightarrow \ell$ .

Această leamnă, pe lângă faptul că contribuie direct la determinarea limitei unor șiruri, are două consecințe importante:

Consecința 1: Dacă  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l$  atunci  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + x_2 + \dots + x_n}{n} = l$

Consecința 2: Dacă  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = l$ , atunci  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = l$ .

În continuare, cu ajutorul șirurilor se va demonstra propoziția intitulată "Principiul contracției" care are o importanță deosebită în demonstrația unor importante teoreme de analiză matematică, cum ar fi:

- Teorema de existență și unicitate pentru funcțiile implicite;
- Teorema de existență și unicitate a soluției problemei Cauchy pentru ecuații și sisteme de ecuații diferențiale, etc.

**Definiția 3.5.2.** Fie  $(X, d)$  un spațiu metric și  $\varphi: X \rightarrow X$  o aplicație oarecare.

Dacă există  $c \in [0, 1)$  astfel încât  $d(\varphi(x), \varphi(y)) \leq c \cdot d(x, y)$ , oricare ar fi  $x, y \in X$  atunci aplicația  $\varphi$  se numește contracția spațiului metric  $X$  și  $c \in [0, 1)$  este coeficientul de contracție.

**Propoziția 3.5.5. (principiul contracției)**

Fie  $(X, d)$  spațiu metric complet și  $\varphi: X \rightarrow X$  o contracție a acestuia. Există și este unic punctul  $\xi \in X$  astfel încât  $\varphi(\xi) = \xi$ .

Demonstrație:

Punctul  $\xi$  care verifică condiția din propoziția 3.5.5 poartă denumirea de punct fix al contracției  $\varphi$ .

Pentru demonstrarea propoziției trebuie demonstrată unicitatea și existența acestui punct.



**Unicitatea:** Se presupune prin absurd că există  $\xi' \neq \xi$  două puncte fixe ale lui  $\varphi$ . Atunci, ținând cont de faptul că  $\varphi$  este o contracție, rezultă:

$$d(\varphi(\xi), \varphi(\xi')) \leq c \cdot d(\xi, \xi')$$

(1)

Din faptul că  $\xi$  și  $\xi'$  sunt puncte fixe rezultă:

$$\varphi(\xi) = \xi$$

$$\varphi(\xi') = \xi'$$

(2)

Din (1) și (2) rezultă  $d(\xi, \xi') \leq c \cdot d(\xi, \xi')$ . De aici rezultă că:  $d(\xi, \xi')(1-c) \leq 0$ .

Din această inegalitate se obține  $d(\xi, \xi') \leq 0$ .

Dar se știe că  $d$  este o metrică și deci  $d(\xi, \xi') \geq 0$ .

Din cele două inegalități, rezultă că  $d(\xi, \xi') = 0 \Leftrightarrow \xi = \xi'$ .

**Existența:** Pentru a demonstra existența punctului fix se construiește în spațiul metric  $X$  șirul aproximațiilor succesive și se demonstrează că acest șir este un șir **Cauchy**.

Fie  $x_0 \in X$  un punct arbitrar dar fixat. Șirul aproximațiilor succesive se construiește astfel:

$$x_1 = \varphi(x_0); x_2 = \varphi(x_1); \dots; x_n = \varphi(x_{n-1}), \dots$$

Se arată că acest șir este un șir CAUCHY. Pentru aceasta se procedează astfel:

Fie:

$$\delta = d(x_0, x_1)$$

$$d(x_1, x_2) = d(\varphi(x_0), \varphi(x_1)) \leq c \cdot d(x_0, x_1) = c \cdot \delta$$

$$d(x_2, x_3) = d(\varphi(x_1), \varphi(x_2)) \leq c \cdot d(x_1, x_2) \leq c^2 \cdot \delta$$

$$d(x_3, x_4) = d(\varphi(x_2), \varphi(x_3)) \leq c \cdot d(x_2, x_3) \leq c^3 \cdot \delta$$

$$\dots \dots \dots$$

$$d(x_{n-1}, x_n) \leq c^{n-1} \cdot \delta$$

Ținând cont de aceste relații rezultă că  $d(x_{n+p}, x_n) < \varepsilon$ , pentru orice  $\varepsilon > 0$ .

Așadar șirul aproximațiilor succesive este un șir CAUCHY, și spațiul metric  $(X, d)$  fiind complet (spațiul Banach) rezultă că acest șir este convergent.

$$\text{Fie } \xi = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n$$

(1)

Atunci  $0 \leq d(\varphi(x_n), \varphi(\xi)) = d(x_{n+1}, \varphi(\xi)) \leq c \cdot d(x_n, \xi)$ . Din această ultimă inegalitate ținând cont de egalitatea (1) se obține

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \varphi(\xi)$$

(2)

Deoarece orice șir convergent are limită unică, din (1) și (2) rezultă că  $\varphi(\xi) = \xi$ . Deci contracția  $\varphi : X \rightarrow X$  are punct fix.

## 6. Exerciții rezolvate

### Exercițiul 3.6.1.

Să se determine marginea inferioară  $m$ , marginea superioară  $M$ , limita inferioară  $l$ , limita superioară  $L$  a mulțimilor:

a)  $E = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$ ,  $x_i < x_j$  ( $\forall$ )  $i < j$

b)  $E = [1, 2] \cup [3, 4] \cup \{5\}$

c)  $E = \mathbb{Q}$ ;  $E = \mathbb{N}$

d)  $E = \left\{ \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}$

e)  $E = \bigcup_{p=1}^{\infty} E_p$  unde  $E_p = \left\{ \frac{1}{p} + \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}$ ,  $p \in \mathbb{N}^*$ .

#### Rezolvare:

După cum se știe  $l$  respectiv  $L$  reprezintă marginea inferioară  $m$  respectiv marginea superioară  $M$  a mulțimii  $E'$ .

a)  $E' = \emptyset$ . Este evident că  $m = x_1$ ,  $M = x_n$  dar  $l$  și  $L$  nu există.

b)  $E' = [1, 2] \cup [3, 4]$ . Este evident că  $m = 1$ ,  $M = 5$ ,  $l = 1$ ,  $L = 4$ .

c)  $\mathbb{Q}' = \overline{\mathbb{R}}$ ; Este evident că nu există (în sensul că nu sunt finite)  $m, M, l, L$ .

Deci  $\mathbb{Q}$  și  $\mathbb{Q}'$  nu sunt mărginite.  $\mathbb{N}' = \emptyset$  (în spațiu topologic  $(\mathbb{R}, \tau_{\mathbb{R}}(x))$ ).

Este evident că  $m = 0$ ,  $M$  nu există. Cum  $\mathbb{N}' = \emptyset$ , nu există  $l, L$  (în sensul că pot fi orice numere finite).

d)  $E' = \{0\}$ . Este evident că  $M = 1$ ,  $m = 0$  și  $l = L = 0$ .

e)  $E' = \left\{ \frac{1}{p} \mid p \in \mathbb{N}^* \right\} \cup \{0\}$ . Se observă că  $m = 0$ ,  $M = 2$ ,  $L = 1$ ,  $l = 0$ .

### Exercițiul 3.6.2.

Orice mulțime compactă din  $\mathbb{R}$  este mulțimea perfectă, dar nu orice mulțime perfectă de numere reale este compactă.

#### Rezolvare:

În spațiu topologic  $(\mathbb{R}, \tau_{\mathbb{R}}(x))$  singurele mulțimi compacte sunt intervalele  $I = [a, b]$ ,  $a < b$ ,  $a, b \in \mathbb{R}$ . Dar ținând cont de definiția 2.2.1/5,  $I' = I$ . Deci  $I = [a, b]$  este mulțimea perfectă.

Fie mulțimea  $A = [a, b] \cup [c, d]$ ,  $b < c$ . Ținând cont de aceeași definiție, se observă că  $A' = A$ . Deci  $A$  este o mulțime perfectă. Conform cu propoziția 3.2.2.

segmentul de dreaptă ce unește punctul  $x = b$  cu  $y = c$  nu este conținut în  $A$ , deci  $A$  nu este compactă.

**Observație:**

Din rezolvarea acestui exercițiu, reiese că nu întotdeauna reuniunea a două mulțimi compacte este o mulțime compactă (în  $\mathbb{R}, \mathbb{R}^2, \mathbb{R}^3$ ).

**Exercițiul 3.6.3.**

Fie  $I = \liminf \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  și  $L = \overline{\lim} \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  șirul  $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  este convergent dacă și numai dacă  $I = L$ .

**Rezolvare:**

Dacă  $I = L$  atunci nu mai există un alt punct de acumulare al mulțimii  $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  și în acest caz  $a$  este limita șirului. Într-adevăr, în orice vecinătate  $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$  există o infinitate de termeni ai șirului  $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  conform cu propoziția 3.1.3.

Dacă ar exista o vecinătate  $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$  astfel încât în afara ei să fie o infinitate de termeni ai șirului (îi presupunem la stânga vecinătății), acești termeni îi putem include într-o vecinătate  $(y_0 - \varepsilon_1, y_0 + \varepsilon_1)$ ,  $y_0 < a$ . Deci  $y_0$  este punct de acumulare al șirului  $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ . Aceasta contrazice faptul că există un singur punct de acumulare  $x = a$ . Deci în orice vecinătate  $(a - \varepsilon, a + \varepsilon)$  există o infinitate de termeni ai șirului  $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ , iar în afară un număr finit. Deci  $x = a$  este limita șirului  $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ .

Dacă  $I \neq L$  atunci există cel puțin două puncte de acumulare. Fie acestea  $x = a$  și  $y = b$ . Este evident că  $x = a$  și  $y = b$  și nici un alt număr real diferit de acestea nu pot fi limită a șirului  $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$  deoarece există cel puțin o vecinătate a acestora în afara căreia există o infinitate de elemente ale șirului  $\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}}$ .

**Exercițiul 3.6.4.**

Să se cerceteze dacă șirurile cu termeni generali:

a)  $x_n = \frac{(-1)^n \cdot n + n}{n - 1}$

b)  $x_n = \frac{(-1)^n + 1}{n}$  sunt convergente.

**Rezolvare:**

a)  $\{x_n\}'_{n \in \mathbb{N}} = \{0, 2\} \Rightarrow I = 0$  și  $L = 2$ . Deci șirul nu este convergent.

b)  $\{x_n\}'_{n \in \mathbb{N}} = \{0\} \Rightarrow I = L = 0$ . Deci șirul este convergent și  $x_n \rightarrow 0$ .

**Observație:**

Pentru a determina pe  $\{x_n\}'_{n \in \mathbb{N}}$  s-a procedat astfel:

$$\{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} = \{x_{2n}\}_{n \in \mathbb{N}} \cup \{x_{2n+1}\}_{n \in \mathbb{N}} \text{ și } \{x_n\}'_{n \in \mathbb{N}} = \{x_{2n}\}'_{n \in \mathbb{N}} \cup \{x_{2n+1}\}'_{n \in \mathbb{N}}.$$

**Exercițiul 3.6.5.**

Dacă  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = l$  atunci  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = l$ .

Rezolvare:

Pentru a avea sens exercițiul, este evident că  $x_n > 0$  ( $\forall n \geq 2$ ).

Fie  $y_n = \sqrt[n]{x_n} = \frac{\ln x_n}{n}$ .

$$\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \sqrt[n]{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln x_n}{n} \stackrel{L-S}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\ln x_{n+1} - \ln x_n}{n+1-n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \ln \frac{x_{n+1}}{x_n} = \ln l$$

Deci  $\ln\left(\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n}\right) = \ln l$ . Ținând cont de injectivitatea logaritmului se obține

că:  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = l = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}$ .

**Observație:**

Exercițiul 3.6.5. este dat în paragraful 5 ca și consecință a lemei lui Stolz.

**Exercițiul 3.6.6.**

Dacă  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = l$  atunci  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + \dots + x_n}{n} = l$ .

Rezolvare:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_1 + \dots + x_n}{n} \stackrel{L-S}{=} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(x_1 + \dots + x_n + x_{n+1}) - (x_1 + \dots + x_n)}{n+1-n} = \lim_{n \rightarrow \infty} x_{n+1} = l$$

**Observație:**

Exercițiul 3.6.6. este dat în paragraful 5 ca și consecință a lemei Stolz.

**Exercițiul 3.6.7.**

Să se arate că șirul  $\bar{x}_n = (x_n^1, x_n^2)$  unde  $x_n^1 = \frac{n}{n+1}$ ,  $x_n^2 = \frac{2n}{n+2}$  are limita  $\bar{l} = (1, 2)$  și să se determine rangul începând de la care toți termenii șirului sunt la o distanță mai mică decât  $\frac{1}{300}$  de  $(1, 2)$ .

Rezolvare:

$\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{x}_n = \bar{l}$  dacă ( $\forall$ )  $\varepsilon > 0$  există  $N(\varepsilon)$  finit astfel încât oricare ar fi  $n > N(\varepsilon)$ ,  $d(\bar{x}_n, \bar{l}) < \varepsilon$ . Așadar,

$$\sqrt{(x_n^1 - 1)^2 + (x_n^2 - 2)^2} < \varepsilon \Rightarrow \sqrt{\left(\frac{n}{n+1} - 1\right)^2 + \left(\frac{2n}{n+2} - 2\right)^2} < \varepsilon \Rightarrow \sqrt{\frac{17n^2 + 36n + 20}{(n+1)^2(n+2)^2}} < \varepsilon$$

Deoarece  $\sqrt{\frac{17n^2 + 36n + 20}{(n+1)^2(n+2)^2}} < \frac{5}{n+2}$  este suficient să se rezolve

inegalitatea  $\frac{5}{n+2} < \varepsilon \Rightarrow n+2 > \frac{5}{\varepsilon} \Rightarrow n > \frac{5-2\varepsilon}{\varepsilon}$ . Deci  $N(\varepsilon) = \left\lceil \frac{5-2\varepsilon}{\varepsilon} \right\rceil$ . Cum

$N(\varepsilon)$  este finit pentru orice  $\varepsilon > 0$ , (1,2) este limita șirului  $\bar{x}_n$ .

Fie  $\varepsilon_0 = \frac{1}{300}$ ;  $N\left(\frac{1}{300}\right) = \left\lceil \frac{5 - \frac{2}{300}}{\frac{1}{300}} \right\rceil = 1498$ . Deci

$$\{(x_k^1, x_k^2)\}_{k \geq 1498} \subset D\left((1,2), \frac{1}{300}\right).$$

### Exercițiul 3.6.8.

Fie șirul  $\bar{x}_n = \left( \sum_{k=1}^n \frac{\cos k!}{k(k+1)}, \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!} \right)$ .

Folosind criteriul de convergență a lui Cauchy pentru șiruri din  $\mathbb{R}^2$ , să se studieze convergența șirului  $\bar{x}_n$ .

Rezolvare:

Trebuie arătat că  $(\forall) \varepsilon > 0, (\exists) N(\varepsilon)$  finit astfel încât  $(\forall) n > N(\varepsilon)$

$$d(\bar{x}_{n+p}, \bar{x}_n) < \varepsilon \quad (\forall) p \in \mathbb{N}. \quad d(\bar{x}_{n+p}, \bar{x}_n) < \varepsilon \Rightarrow \sqrt{(x_{n+p}^1 - x_n^1)^2 + (x_{n+p}^2 - x_n^2)^2} < \varepsilon \quad \text{unde}$$

$$x_n^1 = \sum_{k=1}^n \frac{\cos k!}{k(k+1)} \quad \text{și} \quad x_n^2 = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!}.$$

Așadar  $\sqrt{\left( \sum_{k=1}^p \frac{\cos(n+k)!}{(n+k)(n+k+1)} \right)^2 + \left( \sum_{k=1}^p \frac{1}{(n+k)!} \right)^2} < \varepsilon$ . Dar

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^p \frac{\cos(n+k)!}{(n+k)(n+k+1)} &\leq \sum_{k=1}^p \frac{1}{(n+k)(n+k+1)} = \\ &= \left( \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} \right) + \left( \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3} \right) + \dots + \left( \frac{1}{n+p} - \frac{1}{n+p+1} \right) = \end{aligned}$$

$$= \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+p+1} < \frac{1}{n+1}$$

(1)

$$\begin{aligned} \sum_{k=1}^p \frac{1}{(n+k)!} &= \frac{1}{(n+1)!} + \frac{1}{(n+2)!} + \dots + \frac{1}{(n+p)!} = \\ &= \frac{1}{n!} \left[ \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)(n+2)} + \dots + \frac{1}{(n+1)(n+2)\dots(n+p)} \right] \leq \end{aligned}$$

$$\leq \frac{1}{n!} \left[ \frac{1}{n+1} + \frac{1}{(n+1)^2} + \dots + \frac{1}{(n+1)^p} \right] = \frac{1}{n!} \cdot \frac{1}{n+1} \cdot \frac{1 - \frac{1}{(n+1)^p}}{1 - \frac{1}{n+1}} <$$

$$< \frac{1}{n!} \cdot \frac{1}{n+1} \cdot \frac{n}{1 - \frac{1}{n+1}} = \frac{1}{n!} \cdot \frac{1}{n} \quad (2)$$

Din (1) și (2)

$$\sqrt{\left( \sum_{k=1}^p \frac{\cos(n+k)!}{(n+k)(n+k+1)} \right)^2 + \left( \sum_{k=1}^p \frac{1}{(n+k)!} \right)^2} < \sqrt{\frac{1}{(n+1)^2} + \frac{1}{(n!)^2 n^2}} < \frac{\sqrt{2}}{n}.$$

Este suficient să se rezolve inegalitatea  $\frac{\sqrt{2}}{n} < \varepsilon \Rightarrow n > \frac{\sqrt{2}}{\varepsilon} \Rightarrow N(\varepsilon) = \left\lceil \frac{\sqrt{2}}{\varepsilon} \right\rceil$

care este finit pentru orice  $\varepsilon > 0$ . Deci șirul  $\bar{x}_n = (x_n^1, x_n^2)$  este un șir Cauchy în  $\mathbb{R}^2$  deci este un șir convergent.

**Observație:**

Ținând cont de propoziția 3.2.3. și propoziția 3.3.3. rezultă că șirul  $\bar{x}_n = (x_n^1, x_n^2, \dots, x_n^m)$  este șir Cauchy dacă șirurile  $(x_n^k)_{n \geq 0}$   $k = \overline{1, m}$  sunt șiruri Cauchy.

**Exercițiul 3.6.9.**

Fie  $\bar{x}_n = \left( \left( \prod_{k=1}^n a_k \right)^{\frac{1}{n}}, \frac{\sum_{k=1}^n k^{a-1}}{n^a}, \left( \frac{n^n}{n!} \right)^{\frac{1}{n}} \right)$  unde  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = l$ ,  $a_n > 0$  și  $a > 0$ .

Să se calculeze  $\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{x}_n$ .

Rezolvare:

Conform cu propoziția 3.2.3.  $\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{x}_n = \left( \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^1, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^2, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^3 \right)$  unde

$$x_n^1 = \left( \prod_{k=1}^n a_k \right)^{\frac{1}{n}}, \quad x_n^2 = \frac{\sum_{k=1}^n k^{a-1}}{n^a}, \quad x_n^3 = \left( \frac{n^n}{n!} \right)^{\frac{1}{n}}.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^1 = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n \cdot a_{n+1}}{a_1 \cdot a_2 \cdot \dots \cdot a_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} a_{n+1} = l \quad (\text{vezi Exercițiul$$

3.6.5.).

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n k^{a-1}}{n^a} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(1+n)^{a-1}}{(1+n)^a - n^a} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^a} \quad (\text{vezi Exercițiul$$

3.6.6.).

$$\text{Deci } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^2 = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 - \left(1 - \frac{1}{n+1}\right)^a} = \frac{1}{a}.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^3 = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{n^n}{n!}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n+1)^{n+1}}{(n+1)!} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^n = e$$

$$\text{Așadar } \lim_{n \rightarrow \infty} \bar{x}_n = \left(\ell, \frac{1}{a}, e\right).$$

### Exercițiul 3.6.10.

Fie șirul  $\bar{x}_n = (x_n^1, x_n^2)$  unde  $x_0^1 = 0$  și  $x_{n+1}^1 = \frac{1}{2}((x_n^1)^2 + b)$ ,  $n \geq 0$ ,  $b \in [0, 1]$

iar  $x_1^2 = \sqrt{a}$ ,  $x_n^2 = \sqrt{a + x_{n-1}^2}$ ,  $n \geq 2$ ,  $a > 0$ .

Să se cerceteze dacă șirul este convergent și în caz afirmativ să se calculeze limita sa.

Rezolvare:

Ținând cont de propoziția 3.2.3, șirul  $(\bar{x}_n)_{n \geq 0}$  este convergent dacă și numai dacă șirurile  $(x_n^1)_{n \geq 0}$  și  $(x_n^2)_{n \geq 0}$  sunt convergente și  $\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{x}_n = \left(\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^1, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^2\right)$ .

Se știe că un șir de numere reale, monoton și mărginit este convergent.

$$x_0^1 = 0, \quad x_1^1 = \frac{1}{2}((x_0^1)^2 + b) = \frac{b}{2} < 1, \quad x_2^1 = \frac{1}{2}((x_1^1)^2 + b) < \frac{1}{2}(1+1) = 1. \quad \text{Se}$$

propune că  $x_n^1 < 1$  și se demonstrează că  $x_{n+1}^1 < 1$ . Într-adevăr

$$x_{n+1}^1 = \frac{1}{2}((x_n^1)^2 + b) < \frac{1}{2}(1+1) = 1. \text{ Așadar conform inducției } x_n^1 < 1 \quad (\forall) \quad n \geq 0.$$

$$\text{Deci } x_n^1 \in [0, 1]$$

(1)

$$x_0^1 = 0; \quad x_1^1 = \frac{1}{2}[(x_0^1)^2 + b] = \frac{b}{2} > x_0^1$$

$$x_2^1 = \frac{1}{2}[(x_1^1)^2 + b] > \frac{1}{2}[(x_0^1)^2 + b] = x_1^1$$

$$x_3^1 = \frac{1}{2}[(x_2^1)^2 + b] > \frac{1}{2}[(x_1^1)^2 + b] = x_2^1$$

⋮

Se presupune că  $x_n^1 > x_{n-1}^1$  și se demonstrează că  $x_{n+1}^1 > x_n^1$ . Într-adevăr,  
 $x_{n+1}^1 = \left[ (x_n^1)^2 + b \right] > \frac{1}{2} \left[ (x_{n-1}^1)^2 + b \right] = x_n^1$ . Așadar,  $x_{n+1}^1 > x_n^1$ .

Atunci, conform inducției, șirul  $(x_n^1)_{n \geq 0}$  este crescător.

(2)

Din (1) și (2) rezultă că șirul este convergent.

Deci există  $l$  finit astfel încât  $l = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^1$ . Trecând la limită în relația de recurență se obține  $l^2 - 2l + b = 0$ ,  $l_1 = 1 - \sqrt{1-b}$ ,  $l_2 = 1 + \sqrt{1-b}$ . Cum  $l_2 \notin [0,1]$ , atunci

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^1 = 1 - \sqrt{1-b}$$

(3)

Pentru șirul  $(x_n^2)_{n \geq 1}$  se obține:

$$x_1^2 = \sqrt{\alpha},$$

$$x_2^2 = \sqrt{\alpha + x_1^2} = \sqrt{\alpha + \sqrt{\alpha}} > \sqrt{\alpha} = x_1^2,$$

$$x_3^2 = \sqrt{\alpha + x_2^2} > \sqrt{\alpha + x_1^2} = x_2^2, \dots$$

Se presupune că  $x_n^2 > x_{n-1}^2$  și se demonstrează că  $x_{n+1}^2 > x_n^2$ . Într-adevăr,  
 $x_{n+1}^2 = \sqrt{\alpha + x_n^2} > \sqrt{\alpha + x_{n-1}^2} = x_n^2$ .

Așadar,  $x_{n+1}^2 > x_n^2$  deci conform inducției, șirul  $(x_n^2)$  este crescător.

(4)

$$x_1^2 = \sqrt{\alpha} < 1 + \sqrt{\alpha+1} \text{ evident.}$$

$$x_2^2 = \sqrt{\alpha + x_1^2} < \sqrt{\alpha + 1 + \sqrt{\alpha+1}} < \sqrt{\alpha + 1 + 2\sqrt{\alpha+1} + 1} = 1 + \sqrt{\alpha+1} \dots$$

Se presupune că  $x_n^2 < 1 + \sqrt{\alpha+1}$  și se demonstrează că  $x_{n+1}^2 < 1 + \sqrt{1+\alpha}$ .

Într-adevăr,

$$x_{n+1}^2 = \sqrt{\alpha + x_n^2} < \sqrt{\alpha + 1 + \sqrt{\alpha+1}} < \sqrt{\alpha + 1 + 2\sqrt{\alpha+1} + 1} = 1 + \sqrt{\alpha+1}. \quad \text{Așadar,}$$

$x_{n+1}^2 < 1 + \sqrt{\alpha+1}$ . Atunci, conform inducției, rezultă că

$$x_n^2 < 1 + \sqrt{\alpha+1}, \text{ pentru orice } n \geq 1.$$

Deci  $x_n^2 \in (0, 1 + \sqrt{\alpha+1})$ , pentru orice  $n \geq 1$ .

(5)

Din (4) și (5) rezultă că șirul  $(x_n^2)_{n \geq 1}$  este convergent. Adică există  $l$  finit astfel încât  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^2 = l$ . Trecând la limită în relația de recurență se obține:

$$l = \sqrt{\alpha + l} \Rightarrow l^2 - l - \alpha = 0, \quad l_1 = \frac{1 - \sqrt{1+4\alpha}}{2}, \quad l_2 = \frac{1 + \sqrt{1+4\alpha}}{2}.$$

$l_1 \notin (0, 1 + \sqrt{1+\alpha})$ ,  $l_2 \in (0, 1 + \sqrt{1+\alpha})$ . Deci



$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^2 = \frac{1 + \sqrt{1 + 4\alpha}}{2}$$

(6)

Ținând cont de (3) și (6) șirul  $(\bar{x}_n)_{n \geq 0}$  este convergent și

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{x}_n = \left( \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^1, \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^2 \right) = \left( 1 - \sqrt{1 - b}, \frac{1 + \sqrt{1 + 4\alpha}}{2} \right).$$

### Exercițiul 3.6.11.

Fie  $\bar{x}_n = (x_n^1, x_n^2, x_n^3)$  unde

$$x_n^1 = \frac{\sum_{k=1}^n k^4}{n^5}; \quad x_n^2 = \frac{1 + 2\sqrt[3]{2} + \dots + n\sqrt[3]{n}}{n^3 \sqrt{n+1}};$$

$$x_0^3 = x_1^3 = 0; \quad x_{n+1}^3 = \frac{1}{3} \left[ a + x_n^3 + (x_{n-1}^3)^2 \right] \quad \text{unde } a \in [0, 1]. \quad \text{Să se calculeze}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{x}_n.$$

Rezolvare:

Dacă  $S_k = 1^k + 2^k + 3^k + \dots + n^k$  atunci are loc următoarea relație:

$$(n+1)^{k+1} = 1 + C_{k+1}^1 S_k + C_{k+1}^2 S_{k-1} + \dots + C_{k+1}^k S_1 + n.$$

(1)

Pentru a demonstra relația de recurență se pornește de la egalitatea:

$$(a+1)^{k+1} = a^{k+1} + C_{k+1}^1 a^k + C_{k+1}^2 a^{k-1} + \dots + C_{k+1}^k a^1 + C_{k+1}^{k+1}.$$

În această egalitate se dau lui  $a$  succesiv valorile  $1, 2, 3, \dots, n$  și se adună membru cu membru cele  $n$  egalități. Dacă în egalitatea (1) se consideră  $k = 4$  se obține:

$$(n+1)^5 = 1 + C_5^1 S_4 + C_5^2 S_3 + C_5^3 S_2 + C_5^4 S_1 + n$$

(2)

$$\text{În această egalitate } S_1 = \frac{n(n+1)}{2}, \quad S_2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6}, \quad S_3 = \frac{n^2(n+1)^2}{4}.$$

Ținând cont de  $S_1, S_2, S_3$  din egalitatea (2) se obțin

$$S_4 = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n+1)}{30}.$$

$$\text{Atunci } x_4^1 = \frac{n(n+1)(2n+1)(3n^2+3n+1)}{30n^5} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^1 = \frac{1}{5}.$$

Conform cu lema lui Stolz șirul  $(x_n^2)_{n \geq 1}$  are aceeași limită cu șirul

$$y_n = \frac{(n+1)^2 \sqrt{n+1}}{(n+1)^3 \sqrt{n+1} - n^3 \sqrt{n}}.$$

$$\frac{\sqrt{n}(n+1)^2}{\sqrt{n+1}(3n^2+3n+1)} \leq y_n \leq \frac{\sqrt{n+1}(n+1)^2}{\sqrt{n}(3n^2+3n+1)}$$

(3)

Deci conform cu inegalitatea (3) se obține  $\lim_{n \rightarrow \infty} y_n = \frac{1}{3}$ . Deci  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^2 = \frac{1}{3}$ .

Pentru  $(x_n^3)_{n \geq 1}$  se arată că este monoton și mărginit.

Monotonia

$$x_2^3 = \frac{1}{3}a, \quad x_3^3 = \frac{4}{9}a. \quad \text{Se observă că } x_1^3 < x_2^3 < x_3^3.$$

Se presupune că  $x_k^3 \leq x_{k+1}^3$ .

$$x_k^3 = \frac{1}{3} \left( a + x_{k-1}^3 + (x_{k-2}^3)^2 \right) \leq \frac{1}{3} \left( a + x_k^3 + (x_{k-1}^3)^2 \right) = x_{k+1}^3 \Rightarrow$$

$$x_k^3 \leq x_{k+1}^3 \quad \text{c.c.t.d.}$$

Deci conform inducției rezultă că șirul este crescător.

(4)

Mărginirea

$$x_0^3 \leq 1, \quad x_1^3 \leq 1, \quad x_2^3 = \frac{a}{3} \leq 1, \quad x_3^3 \leq \frac{4}{9}a \leq 1.$$

Se presupune că  $x_{k-1}^3 \leq 1, \quad x_k^3 \leq 1$  și se demonstrează că  $x_{k+1}^3 \leq 1$ . Într-adevăr,  $x_{k+1}^3 = \frac{1}{3} \left( a + x_k^3 + (x_{k-1}^3)^2 \right) \leq \frac{1}{3} (1 + 1 + a) \leq 1$ . Deci conform inducției șirul  $(x_n^3)_{n \geq 0}$  este mărginit și anume  $x_n^3 \in [0, 1] \quad (\forall) \quad n \geq 0$ .

(5)

Din (4) și (5) rezultă că șirul este convergent. Există  $l$  finit astfel încât  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^3 = l$ . Trecând la limită în relația de recurență se obține:

$$l = \frac{1}{3} [a + l + l^2] \Rightarrow l^2 - 2l + a = 0, \quad l_1 = 1 + \sqrt{1-a}, \notin [0, 1] \quad \text{și} \quad l_2 = 1 - \sqrt{1-a} \in [0, 1].$$

$$\text{Deci } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^3 = 1 - \sqrt{1-a}.$$

$$\text{Așadar } \lim_{n \rightarrow \infty} \bar{x}_n = \left( \frac{1}{5}, \frac{1}{3}, 1 - \sqrt{1-a} \right).$$

### Exercițiul 3.6.12.

Se consideră șirul

$$\bar{x}_n = (x_n^1, x_n^2, x_n^3, x_n^4) \quad \text{unde}$$

$$x_n^1 = 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{n} - \ln n, \quad x_n^2 = \frac{1}{n} + \frac{1}{n+1} + \dots + \frac{1}{2n}.$$

$$x_n^3 = \prod_{k=2}^n \left( 1 - \frac{1}{k^2} \right),$$

$$x_1^4 = \sqrt{a}, x_2^4 = \sqrt{a + \sqrt{a}}, \dots, x_n^4 = \sqrt{a + \sqrt{a + \sqrt{a + \dots + \sqrt{a}}}} \}^{n \text{ ori}}, a > 0.$$

Să se calculeze  $\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{x}_n$ .

Rezolvare:

Este evident că:

$$\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1} > e > \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n \Leftrightarrow (n+1) \ln \frac{n+1}{n} > 1 > (n) \cdot \ln \frac{n+1}{n} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{1}{n+1} < \ln(n+1) - \ln n < \frac{1}{n} \Leftrightarrow \frac{1}{n+1} < \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < \frac{1}{n}$$

(1)

$$x_{n+1}^4 - x_n^4 = \frac{1}{n+1} - \ln(n+1) + \ln n = \frac{1}{n+1} - \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right) < 0 \text{ (s-a ținut cont de$$

inegalitatea (1)).

De asemenea, din inegalitatea (1) se obține că  $x_n^4 > 0$  ( $\forall$ )  $n \geq 1$ . Așadar șirul  $(x_n^4)_{n \geq 1}$  este monoton și mărginit. Deci există  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^4 \in (0, 1)$ .

Această limită este  $\gamma = 0,5772\dots$  și se numește constanta lui Euler. (2)

$$x_n^2 = \sum_{k=0}^n \frac{1}{n+k} = \frac{1}{n} \sum_{k=0}^n \frac{1}{1 + \frac{k}{n}}. \text{ Aceasta este o sumă Riemann a funcției}$$

$$f: [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{1}{1+x}.$$

Funcția fiind integrabilă se observă că

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^2 = \int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \ln(1+x) \Big|_0^1 = \ln 2 \quad (3)$$

$$\begin{aligned} x_n^3 &= \prod_{k=2}^n \left(1 - \frac{1}{k^2}\right) = \prod_{k=2}^n \frac{(k-1)(k+1)}{k^2} = \prod_{k=2}^n \frac{k-1}{k} \prod_{k=2}^n \frac{k+1}{k} = \\ &= \frac{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots n-1}{2 \cdot 3 \dots (n-1) + n} \cdot \frac{3 \cdot 4 \dots n \cdot (n+1)}{2 \cdot 3 \dots n} = \frac{1}{n} \cdot \frac{n+1}{2} = \frac{n+1}{2n}. \end{aligned}$$

$$\text{Deci } x_n^3 = \frac{n+1}{2n}. \text{ Atunci } \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^3 = \frac{1}{2} \quad (4)$$

Este evident că șirul este crescător și  $x_n^4 > 0$ .

(5)

$$\text{De asemenea, este evident că } (x_n^4)^2 = a + x_{n-1}^4 \Rightarrow x_n^4 = \frac{a}{x_n^4} + \frac{x_{n-1}^4}{x_n^4} < \sqrt{a} + 1$$

(deoarece șirul este crescător).

$$\text{Deci } (x_n^4)_{n \geq 1} \text{ este mărginit } x_n^4 \in (0, \sqrt{a} + 1)$$

(6)

Din (5) și (6) rezultă că șirul este convergent, adică există  $l$  finit astfel încât  $l = \lim_{n \rightarrow \infty} x_n^4$ .

Trecând la limită în relația de recurență  $(x_n^4)^2 = a + x_{n-1}^4$  se obține  $l^2 - l - a = 0$   $l_1 = \frac{1 - \sqrt{1 + 4a}}{2} < 0$  (nu convine)  $l_2 = \frac{1 + \sqrt{1 + 4a}}{2}$ ,  $l_2 \in (0, 1 + \sqrt{a})$ .

Deci

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n^4 = \frac{1 + \sqrt{1 + 4a}}{2}$$

(7)

Din (2), (3), (4), (7) se obține  $\lim_{n \rightarrow \infty} \bar{x}_n = \left( \gamma, \ln 2, \frac{1}{2}, \frac{1 + \sqrt{1 + 4a}}{2} \right)$ .

### Exercițiul 3.6.13.

a) Să se arate că  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  definită prin  $f(x) = \frac{x}{4} + \frac{1}{3 + x^2}$  este o contracție.

b) Să se găsească punctul fix.

Rezolvare:

a) Se consideră metrică euclidiană și se obține

$$|f(x) - f(y)| = \left| \frac{1}{4}(x - y) + \frac{1}{3 + x^2} - \frac{1}{3 + y^2} \right| = \left| \frac{1}{4}(x - y) + \frac{(y - x)(x + y)}{(3 + x^2)(3 + y^2)} \right| \leq \frac{1}{4}|x - y|$$

Inegalitatea se obține arătând că maximul funcției

$$g(x, y) = \frac{(y - x)(x + y)}{(3 + x^2)(3 + y^2)}$$

este 0.

Deci din  $|f(x) - f(y)| \leq \frac{1}{4}|x - y|$  rezultă că  $f(x)$  este o contracție.

b) Se observă că  $f(-1) = 0$ . Deci  $x = -1$  este unicul punct fix.

# CAPITOLUL IV

## SERII

Cadrul general în care poate fi construită și studiată o serie este cel de spațiu vectorial normat complet (spațiu Banach).

### 1. Serii. Generalități

**Definiția 4.1.1.** Fie  $(X, \|\cdot\|)$  spațiu vectorial normat complet și  $(x_n)_{n \geq 0}$ ,  $x_n \in X$  pentru orice  $n \in \mathbb{N}$  un șir de elemente din acest spațiu.

Considerând șirul:

$$S_0 = x_0, S_1 = x_0 + x_1, S_2 = x_0 + x_1 + x_2, \dots, S_n = \sum_{k=0}^n x_k$$

cupletul  $(x_n, S_n)_{n \geq 0}$  **definește o serie** în spațiul vectorial  $X$ , unde  $x_n$  este **termenul general al seriei**, iar  $S_n$  este **termenul general al șirului** sumelor parțiale.

Seria astfel generată se notează:

$$\sum_{n=0}^{\infty} x_n \text{ sau } \sum_{n \geq 0} x_n$$

#### Observația 4.1.1.

- Se observă că seria este generalizarea sumei într-un spațiu vectorial.
- Natura elementelor spațiului vectorial  $X$  dă și denumirea seriei, adică:
  - $X = \mathbb{R}$  - seria este o serie de numere reale;
  - $X = \mathbb{C}$  - seria este o serie de numere complexe;
  - $X = \mathbb{R}^n$  - seria este o serie de elemente din  $\mathbb{R}^n$ ;
  - $X = B^A$  - seria este o serie de funcții,  $f : A \rightarrow B$ .

#### Exemple:

a)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$  este o serie de numere reale care poartă denumirea și de **serie armonică**;

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ ,  $\alpha \in \mathbb{R}^*$  - **seria lui Riemann**, care este serie de numere reale.

b)  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{n+1} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ ,  $i = \sqrt{-1}$  - serie de numere complexe;

c)  $\left( \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^2+1}; \sum_{n=0}^{\infty} \ln(n+1), \sum_{n=1}^{\infty} q^n \right)$  - serie de elemente din  $\mathbb{R}^3$ .

Problematika pusă în legătură cu o serie dintr-un spațiu vectorial este următoarea:

- convergența sau divergența (are sens suma sau nu);
- în cazul convergenței, găsirea efectivă a sumei seriei;

**Definiția 4.1.2. (CONVERGENȚA)** Fie  $(X, \|\cdot\|)$  spațiu vectorial normat complet și  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  o serie din acest spațiu. Se spune că **seria este convergentă** și are suma  $S$  dacă șirul sumelor parțiale  $S_n = \sum_{k=0}^n x_k$  este convergent și are loc egalitatea  $S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$ .

- Dacă șirul  $(S_n)_{n \geq 0}$  este divergent, atunci seria este divergentă.
- În cazul în care șirul  $(S_n)_{n \geq 0}$  este divergent, fără limită, seria  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  poartă denumirea de **serie oscilantă**.

În marea majoritate a seriilor, definiția 4.1.2 este greu sau imposibil să se aplice datorită faptului că șirul  $S_n = \sum_{k=0}^n x_k$  este complicat, de aceea este necesar să se construiască o teorie care să suplinească această definiție.

**Propoziția 4.1.1.** Natura unei serii nu se schimbă dacă se neglijează un număr finit de termeni ai săi. (Prin natura unei serii se înțelege convergența sau divergența seriei).

Demonstrație:

Fie  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ ,  $S$  suma seriei și  $\mu = \sum_{n=0}^p x_n$  o sumă finită din primii  $p$  termeni ai seriei.

Cu notațiile anterioare sunt evidente egalitățile:

$$S_1 = \sum_{n=p+1}^{\infty} x_n = \sum_{n=0}^{\infty} x_n - \sum_{n=0}^p x_n = S - \mu.$$

Deoarece  $\mu$  este finit, rezultă că în cazul în care  $S$  este finită, adică seria  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  este convergentă, rezultă că și  $S_1$  este finită, adică seria  $\sum_{n=p+1}^{\infty} x_n$  este convergentă.

Dacă  $S$  este infinită, adică seria  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  este divergentă, atunci și  $S_1$  este infinită, adică seria  $\sum_{n=p+1}^{\infty} x_n$  este divergentă.

**Exemplu:**

Să se arate că seria armonică  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$  este o serie divergentă.

Rezolvare:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n} &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8} + \frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \frac{1}{11} + \frac{1}{12} + \frac{1}{13} + \frac{1}{14} + \frac{1}{15} + \frac{1}{16} + \dots = \\ &= \left(1 + \frac{1}{2}\right) + \left(\frac{1}{3} + \frac{1}{4}\right) + \left(\frac{1}{5} + \frac{1}{6} + \frac{1}{7} + \frac{1}{8}\right) + \left(\frac{1}{9} + \frac{1}{10} + \frac{1}{11} + \frac{1}{12} + \frac{1}{13} + \frac{1}{14} + \frac{1}{15} + \frac{1}{16}\right) + \dots \end{aligned}$$

În urma acestei grupări se pot face următoarele majorări:

$$S_{2^2} > \frac{1}{2}, S_{2^3} > \frac{1}{2}, S_{2^4} > \frac{1}{2}, \dots, S_{2^n} = \sum_{k=1}^{2^n} \frac{1}{k} > \frac{n}{2} \text{ rezultă că}$$

$$S_{2^n} = \sum_{k=1}^{2^n} \frac{1}{k} \text{ reprezintă unul din termenii generali ai șirului sumelor parțiale}$$

pentru seria  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$ . Conform criteriului majorării, din inegalitatea anterioară rezultă

$$\text{că } \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^{2^n} \frac{1}{k} = \infty.$$

Conform cu definiția 4.1.2 rezultă că seria  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$  este divergentă.

**Propoziția 4.1.2.** (CRITERIUL GENERAL DE CONVERGENȚĂ AL LUI CAUCHY PENTRU SERII).

Fie  $(X, \|\cdot\|)$  spațiu vectorial normat complet și  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  o serie din acest spațiu.

Seria  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  este convergentă dacă și numai dacă pentru orice  $\varepsilon > 0$ , există un rang  $n(\varepsilon) > 0$  astfel încât oricare ar fi  $n > n(\varepsilon)$  rezultă:

$$\|x_{n+1} + x_{n+2} + \dots + x_{n+p}\| < \varepsilon, \text{ pentru orice } p \in \mathbb{N}.$$

Demonstrație:

" $\Rightarrow$ " Presupunem că seria  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  este convergentă atunci conform cu definiția 4.1.2  $S_n = \sum_{k=0}^n x_k$  este șir convergent. Rezultă  $(S_n)_{n \geq 0}$  șir fundamental sau șir Cauchy. Deci:  $[(\forall) \varepsilon > 0, (\exists) n(\varepsilon) > 0$  astfel încât  $(\forall) n > n(\varepsilon) \Rightarrow \|S_{n+p} - S_n\| < \varepsilon, (\forall) p \in \mathbb{N}, p \text{ fixat}]$ . Așadar:

$$\left\| \sum_{k=0}^{n+p} x_k - \sum_{k=0}^n x_k \right\| < \varepsilon \Rightarrow \|x_{n+1} + x_{n+2} + \dots + x_{n+p}\| < \varepsilon, (\forall) p \in \mathbb{N}, \text{ fixat}$$

" $\Leftarrow$ " Se presupune că relația din propoziția 4.1.2 este adevărată și se demonstrează că seria este convergentă.

Într-adevăr, din afirmația  $[(\forall) \varepsilon > 0, (\exists) n(\varepsilon) > 0$  astfel încât  $(\forall) n > n(\varepsilon) \Rightarrow \|x_{n+1} + x_{n+2} + \dots + x_{n+p}\| < \varepsilon, (\forall) p \in \mathbb{N}, p \text{ fixat}]$ , rezultă  $\|S_{n+p} - S_n\| < \varepsilon \Rightarrow (S_n)_{n \geq 0}$  șir fundamental.

Dar spațiul  $S$  este un spațiu vectorial complet, deci  $(S_n)_{n \geq 0}$  convergent.

Atunci conform cu definiția 4.1.2  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  este convergentă.

**Propoziția 4.1.3. (CONSECINȚĂ)** O condiție necesară pentru convergența unei serii este ca termenul general al seriei, să aibă limita zero.

Demonstratie:

Într-adevăr, dacă în condiția propoziției 4.1.2 se consideră  $p = 1$  atunci se obține

$(\forall) \varepsilon > 0, (\exists) n(\varepsilon) > 0$  astfel încât  $(\forall) n > n(\varepsilon) \Rightarrow \|x_{n+1}\| < \varepsilon$ , atunci  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ .

Forma practică a propoziției 4.1.3 este următoarea:

$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = x : \begin{cases} \text{Pentru } x \neq 0 \text{ seria } \sum_{n=0}^{\infty} x_n \text{ este divergentă} \\ \text{Pentru } x = 0 \text{ nu se poate afirma nimic despre natura seriei} \end{cases}$

**Exemplu:**

Să se studieze natura următoarei serii:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[4]{n^3} + 1}{\sqrt[4]{2n^3} + 2}$ .

Rezolvare:

Se observă că

$$x_n = \frac{\sqrt[4]{n^3} + 1}{\sqrt[4]{2n^3} + 2} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[4]{n^3} + 1}{\sqrt[4]{2n^3} + 2} = \frac{1}{\sqrt[4]{2}} \neq 0.$$



Atunci seria

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[4]{n^3} + 1}{\sqrt[4]{2n^3} + 2}$  este divergentă.

O categorie aparte de serii sunt seriile din  $\mathbb{R}^m$ . Acestea se definesc după cum urmează:

**Definiția 4.1.3.** Fie  $\mathbb{R}^m$  înzestrat cu normă euclidiană, (spațiu vectorial normat complet) și  $x_n = (x_n^1, x_n^2, \dots, x_n^m)$  un șir din  $\mathbb{R}^m$ , atunci

$\sum_{n=0}^{\infty} x_n = \left( \sum_{n=0}^{\infty} x_n^1, \sum_{n=0}^{\infty} x_n^2, \dots, \sum_{n=0}^{\infty} x_n^m \right)$  este o serie din  $\mathbb{R}^m$ , unde  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n^i$ ,  $i = \overline{1, m}$  sunt serii de numere reale care poartă denumirea de proiecțiile seriei din  $\mathbb{R}^m$ .

**Propoziția 4.1.5.** O serie din  $\mathbb{R}^m$  este convergentă dacă și numai dacă fiecare proiecție este convergentă.

Demonstrație:

" $\Rightarrow$ " Se presupune că seria  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ ,  $x_n = (x_n^1, x_n^2, \dots, x_n^m)$  este convergentă și

se demonstrează că seriile  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n^i$ ,  $i = \overline{1, m}$  sunt convergente.

Într-adevăr, din convergența seriei rezultă că șirul sumelor parțiale  $S_n = \sum_{k=0}^n x_k = \left( \sum_{k=0}^n x_k^1, \sum_{k=0}^n x_k^2, \dots, \sum_{k=0}^n x_k^m \right) = (S_n^1, S_n^2, \dots, S_n^m)$  este un șir convergent.

Dar se știe că un șir din  $\mathbb{R}^m$  este convergent dacă și numai dacă proiecțiile sale sunt convergente.

Rezultă  $S_n^i = \sum_{k=0}^n x_k^i$ ,  $i = \overline{1, m}$  sunt șiruri convergente. Deci seriile  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n^i$ ,  $i = \overline{1, m}$  sunt convergente.

Reciproca se demonstrează în mod asemănător.

**Observația 4.1.2.**

a) Propoziția 4.1.5 reduce studiul seriilor din  $\mathbb{R}^m$  la studiul seriilor de numere reale.

b) Ținând cont de propoziția 4.1.5  $S = (S_1, S_2, \dots, S_m)$  unde  $S_i$ ,  $i = \overline{1, m}$  sunt sumele seriilor proiecții ale seriei din  $\mathbb{R}^m$ .

## 2. Serii cu termeni pozitivi

Un caz particular de serii de numere reale îl reprezintă seriile cu **termeni pozitivi**. Aceste serii se definesc astfel:

**Definiția 4.2.1.** Seria  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ ,  $x_n \in \mathbb{R}$  se numește serie cu termeni pozitivi, dacă există un rang  $N \in \mathbb{N}$  astfel încât pentru orice  $n > N$ ,  $x_n > 0$ .

**Observația 4.2.1.**

Ținând cont de propoziția 4.1.1, rezultă că fără a micșora generalitatea se poate considera  $n = 0$ .

**Propoziția 4.2.1.** Fie  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  o serie cu termeni pozitivi. Șirul sumelor parțiale ale acestei serii este un șir crescător.

Demonstrație:

Șirul sumelor parțiale pentru seria dată este :

$$S_n = \sum_{k=0}^n x_k . \text{ Deoarece } S_{n+1} = \sum_{k=0}^{n+1} x_k \text{ se obține:}$$

$S_{n+1} - S_n = \sum_{k=0}^{n+1} x_k - \sum_{k=0}^n x_k = x_{n+1} > 0$  deci  $S_{n+1} - S_n > 0$ . Atunci șirul  $S_n$  este crescător.

**Propoziția 4.2.2.** (CRITERIUL MONOTONIEI) Fie  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  o serie de termeni pozitivi.

Dacă șirul  $(S_n)_{n \geq 1}$  este mărginit, seria  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  este convergentă.

Demonstrație:

Cum seria este cu termeni pozitivi, din propoziția 4.2.1 rezultă că șirul este crescător. Cum acest șir este și mărginit, rezultă că el este și convergent. Conform definiției convergenței seriei, rezultă că seria este convergentă.

**Exemplu:**

Să se arate că seria  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ ,  $\alpha > 1$  este o serie convergentă.

Rezolvare:

Se aranjează seria sub forma următoare:

$$\begin{aligned} \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha} &= 1 + \left( \frac{1}{2^\alpha} + \frac{1}{3^\alpha} \right) + \left( \frac{1}{4^\alpha} + \frac{1}{5^\alpha} + \frac{1}{6^\alpha} + \frac{1}{7^\alpha} \right) + \left( \frac{1}{8^\alpha} + \frac{1}{9^\alpha} + \dots + \frac{1}{15^\alpha} \right) + \dots \\ &+ \left( \frac{1}{(2^m)^\alpha} + \frac{1}{(2^m+1)^\alpha} + \frac{1}{(2^m+2)^\alpha} + \dots + \frac{1}{(2^{m+1}-1)^\alpha} \right) + \dots \end{aligned}$$

Se observă că:

$$\frac{1}{2^\alpha} + \frac{1}{3^\alpha} < \frac{2}{2^\alpha}$$

$$\frac{1}{4^\alpha} + \frac{1}{5^\alpha} + \frac{1}{6^\alpha} + \frac{1}{7^\alpha} < \frac{4}{4^\alpha}$$

$$\frac{1}{8^\alpha} + \frac{1}{9^\alpha} + \dots + \frac{1}{15^\alpha} < \frac{8}{8^\alpha}$$

.....

$$\frac{1}{(2^m)^\alpha} + \frac{1}{(2^m + 1)^\alpha} + \dots + \frac{1}{(2^{m+1} - 1)^\alpha} < \frac{2^m}{(2^m)^\alpha}, \dots$$

Deci  $S_{2^{m+1}-1} < 1 + \frac{1}{2^{\alpha-1}} + \frac{1}{2^{2(\alpha-1)}} + \frac{1}{2^{3(\alpha-1)}} + \dots + \frac{1}{2^{m(\alpha-1)}} = \frac{1 - \left(\frac{1}{2^{\alpha-1}}\right)^p}{\frac{1}{2^{\alpha-1}}} < \frac{1}{1 - \frac{1}{2^{\alpha-1}}}$ ,

$$p = 2^{m+1}$$

- Dacă  $\alpha > 1$  se observă că  $S_{2^{m+1}-1}$  este mărginit deoarece  $\frac{1}{1 - \frac{1}{2^{\alpha-1}}}$

este un număr finit cuprins în intervalul  $(0,1)$ .

Dar  $S_{2^{m+1}-1}$  este monoton. Fiind și mărginit rezultă că este convergent, adică seria  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$ ,  $\alpha > 1$  este o serie convergentă.

**Propoziția 4.2.3.** (PRIMUL CRITERIU AL COMPARAȚIEI) Fie  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  și

$\sum_{n=0}^{\infty} y_n$  două serii cu termeni pozitivi. Dacă există  $N \in \mathbb{N}$  astfel încât pentru orice  $n > N$ ,  $x_n \leq y_n$ .

1<sup>o</sup>  $\sum_{n=0}^{\infty} y_n$  convergentă, implică  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  convergentă

2<sup>o</sup>  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  divergentă, implică  $\sum_{n=0}^{\infty} y_n$  divergentă.

Demonstrație:

1<sup>o</sup> Fie  $(S_{nx})_{n \geq 0}$  și  $(S_{ny})_{n \geq 0}$  termenii generali ai șirurilor sumelor

parțiale pentru seriile  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  și  $\sum_{n=0}^{\infty} y_n$ .

Deoarece  $x_n \leq y_n$ , pentru orice  $n > N$  (fără a micșora generalitatea se consideră  $N = 1$ ) rezultă:

$$S_{nx} = \sum_{k=0}^{\infty} x_k \leq \sum_{k=0}^{\infty} y_k = S_{ny}$$

Cum seria  $\sum_{n=0}^{\infty} y_n$  este convergentă rezultă că șirul  $(S_{ny})_{n \geq 0}$  este convergent.

Ținând cont de criteriul majorării pentru șiruri și de inegalitatea  $S_{nx} \leq S_{ny}$  rezultă că șirul  $(S_{nx})_{n \geq 0}$  convergent. Deci seria  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  este convergentă.

2<sup>o</sup> Se demonstrează analog ca la punctul (1<sup>o</sup>).

**Propoziția 4.2.4.** (AL DOILEA CRITERIU AL COMPARAȚIEI) Fie  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  și  $\sum_{n=0}^{\infty} y_n$  două serii cu termeni pozitivi. Dacă există  $N \in \mathbb{N}$  astfel încât oricare ar fi

$$n > N, \frac{x_{n+1}}{x_n} \leq \frac{y_{n+1}}{y_n}.$$

1<sup>o</sup>  $\sum_{n=0}^{\infty} y_n$  este convergentă, implică  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  convergentă

2<sup>o</sup>  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  este divergentă, implică  $\sum_{n=0}^{\infty} y_n$  divergentă.

Demonstratie:

1<sup>o</sup> Fără a micșora generalitatea se consideră  $N = 0$  și se notează  $(S_{nx})_{n \geq 0}, (S_{ny})_{n \geq 0}$  șirul sumelor parțiale ale celor două serii.

$$\frac{x_{n+1}}{x_n} \leq \frac{y_{n+1}}{y_n}, \text{ pentru orice } n \geq 0 \text{ implică } \frac{x_n}{x_{n+1}} \geq \frac{y_n}{y_{n+1}}.$$

Prin înmulțirea acestei inegalități cu  $\frac{x_{n+1}}{y_n}$  se obține  $\frac{x_n}{y_n} \geq \frac{x_{n+1}}{y_{n+1}}$ , oricare ar fi  $n \geq 0$ .

Deci are loc următorul șir de inegalități:

$$\frac{x_0}{y_0} \geq \frac{x_1}{y_1} \geq \frac{x_2}{y_2}; \frac{x_2}{y_2} \geq \frac{x_3}{y_3}; \dots; \frac{x_n}{y_n} \geq \frac{x_{n+1}}{y_{n+1}}$$

Dacă se notează  $\frac{x_0}{y_0} = \alpha > 0$ , atunci șirul anterior de inegalități devine

$x_1 \leq \alpha y_1; x_2 \leq \alpha y_2; \dots; x_n \leq \alpha y_n$ . Adunând membrii acestor inegalități se obține:

$$\sum_{i=0}^n x_i \leq \alpha \sum_{i=0}^n y_i.$$

Adică

$$S_{nx} \leq \alpha S_{ny}$$

1<sup>o</sup> Ținând cont că  $S_{nx} \leq \alpha S_{ny}$  și  $\sum_{n=0}^{\infty} y_n$  este convergentă rezultă că șirul  $(S_{nx})_{n \geq 0}$  este convergent. Deci  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  este o serie convergentă.

2<sup>o</sup> Din  $S_{nx} \leq \alpha S_{ny}$  și  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  este divergentă rezultă că  $S_{ny} \rightarrow \infty$ , adică seria  $\sum_{n=0}^{\infty} y_n$  este divergentă.

**Exemplu:**

Să se arate că seria Riemann  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$  este divergentă pentru  $\alpha < 1$ .

Rezolvare:

Deoarece  $\alpha < 1 \Rightarrow \frac{1}{n^\alpha} > \frac{1}{n}$ .

Se știe că seria  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$  este divergentă. Atunci conform cu propoziția 4.2.4

rezultă că seria  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$  este divergentă.

Ținând cont și de exemplele anterioare rezultă că natura seriei lui Riemann este următoarea:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha} : \begin{cases} \text{este divergentă, pentru } \alpha \leq 1 \\ \text{este convergentă, pentru } \alpha > 1 \end{cases}$$

**LEMĂ:** Fie  $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$ , (seria progresie geometrică). Natura acestei serii este următoarea:

$$\sum_{n=0}^{\infty} q^n : \begin{cases} \text{este convergentă, pentru } q \in (-1,1) \\ \text{este divergentă, pentru } q \geq 1 \\ \text{este oscilantă pentru } q \leq -1 \end{cases}$$

Demonstrație:

Fie  $S_n = \sum_{k=0}^n q^k$  termenul general al șirului sumelor parțiale pentru această serie.

Atunci  $S_n = q \cdot \frac{1-q^n}{1-q}$  (suma progresiei geometrice cu rația  $q$  care are  $n$  termeni).

Trecând la limită se obține

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \lim_{n \rightarrow \infty} q \cdot \frac{1 - q^n}{1 - q} = \begin{cases} \frac{q}{1 - q}, & \text{pentru } q \in (-1, 1) \\ \infty, & \text{pentru } q \geq 1 \\ \text{nu există,} & \text{pentru } q \leq -1 \end{cases}$$

Așadar, pentru  $q \in (-1, 1)$  rezultă  $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$  convergentă pentru că șirul sumelor parțiale are limită finită, iar pentru  $q \geq 1$  rezultă  $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$  divergentă pentru că șirul numerelor parțiale are limita  $+\infty$ , iar pentru  $q \leq -1$  oscilantă pentru că șirul sumelor parțiale nu are limită.

**Propoziția 4.2.5. (CRITERIUL RĂDĂCINII)** Fie  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  o serie cu termeni pozitivi.

Dacă există rangul  $N \in \mathbb{N}$  astfel încât:

1<sup>0</sup>  $\sqrt[n]{x_n} \leq \lambda < 1$ , pentru orice  $n > N$ , seria  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  este convergentă

2<sup>0</sup>  $\sqrt[n]{x_n} \geq \lambda > 1$ , pentru orice  $n > N$ , seria  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  este divergentă

**Demonstrație:**

Fără a micșora generalitatea se consideră  $N = 0$ .

1<sup>0</sup> Din inegalitatea

$$\sqrt[n]{x_n} \leq \lambda, (\forall) n \geq 0 \Rightarrow x_n \leq \lambda^n, (\forall) n \geq 0$$

Conform lemei anterioare, seria progresie geometrică  $\sum_{n=0}^{\infty} \lambda^n$  este convergentă pentru  $\lambda \in (0, 1)$ .

Conform primului criteriu al comparației rezultă că seria  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  este convergentă.

2<sup>0</sup> Se demonstrează analog ca (1<sup>0</sup>).

## FORMA PRACTICĂ A CRITERIULUI RĂDĂCINII

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = x : \begin{cases} \text{Dacă } x < 1, \text{ seria } \sum_{n=1}^{\infty} x_n \text{ este convergentă} \\ \text{Dacă } x > 1, \text{ seria } \sum_{n=1}^{\infty} x_n \text{ este divergentă} \\ \text{Dacă } x = 1, \text{ nu se poate afirma nimic despre natura seriei} \end{cases}$$

Criteriul rădăcinii mai poartă denumirea și de criteriul lui Cauchy.

**Propoziția 4.2.6.** (CRITERIUL RAPORTULUI SAU CRITERIUL D'ALEMBERT)

Fie  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  o serie cu termeni pozitivi. Dacă există  $N \in \mathbb{N}$  astfel încât:

1<sup>0</sup>  $\frac{x_{n+1}}{x_n} \leq \lambda < 1$ , pentru orice  $n > N$ , seria  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  este convergentă

2<sup>0</sup>  $\frac{x_{n+1}}{x_n} \geq \lambda > 1$ , pentru orice  $n > N$ , seria  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  este divergentă

**Demonstrație:**

Fără a micșora generalitatea se consideră  $N = 0$ .

1<sup>0</sup> Din inegalitatea  $\frac{x_{n+1}}{x_n} \leq \lambda$ , pentru orice  $n \geq 0$  rezultă  $x_{n+1} \leq \lambda x_n$ , oricare

ar fi  $n \geq 0$ ; adică are loc următorul șir de inegalități:

$$x_1 \leq \lambda x_0, x_2 \leq \lambda x_1, \dots, x_{n+1} \leq \lambda x_n \Rightarrow x_n \leq \lambda^n x_0, (\forall) n \geq 0$$

Cum  $\sum_{n=0}^{\infty} \lambda^n$  este convergentă, pentru orice  $\lambda \in (0,1)$ , conform primului

criteriu al comparației, rezultă că  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  este convergentă.

2<sup>0</sup> Se demonstrează analog ca la punctul (1<sup>0</sup>).

## FORMA PRACTICĂ A CRITERIULUI RAPORTULUI

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = x : \begin{cases} \text{Dacă } x < 1, \text{ seria } \sum_{n=0}^{\infty} x_n \text{ este convergentă} \\ \text{Dacă } x > 1, \text{ seria } \sum_{n=0}^{\infty} x_n \text{ este divergentă} \\ \text{Dacă } x = 1, \text{ nu se poate afirma nimic despre natura seriei} \end{cases}$$



### Observația 4.2.3.

Se știe că limita  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n}$  (consecința lemei lui Stolz). Rezultă că, criteriul raportului și criteriul rădăcinii sunt criterii echivalente, adică au aceeași sferă de aplicabilitate.

### Propoziția 4.2.7. (CRITERIUL LOGARITMIC)

Fie  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  o serie cu termeni pozitivi.

Dacă există  $N \in \mathbb{N}$  și:

1<sup>0</sup>  $\frac{\log \frac{1}{x_n}}{\log n} \geq \lambda > 1, (\forall) n \geq N$ , atunci seria  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  este convergentă

2<sup>0</sup>  $\frac{\log \frac{1}{x_n}}{\log n} \leq \lambda < 1, (\forall) n \geq N$ , atunci seria  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  este divergentă

#### Demonstratie:

Fără a micșora generalitatea se consideră  $N = 2$ .

1<sup>0</sup> Pentru demonstrație se consideră baza logaritmului supraunitară (raționamentul făcându-se în mod analog dacă baza este subunitară).

$$\frac{\log \frac{1}{x_n}}{\log n} \geq \lambda \Rightarrow \log \frac{1}{x_n} \geq \log n^\lambda, \text{ oricare ar fi } n > 1.$$

Datorită faptului că logaritmul în bază supraunitară este crescător, rezultă

$$\frac{1}{x_n} \geq n^\lambda \Rightarrow x_n \leq \frac{1}{n^\lambda}, \text{ oricare ar fi } n > 1.$$

Ținând cont de seria Riemann  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\lambda}$  este convergentă pentru  $\lambda > 1$ ,

conform primului criteriu al comparației rezultă că seria  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  este convergentă.

2<sup>0</sup> Se demonstrează analog ca la punctul (1<sup>0</sup>).

### FORMA PRACTICĂ A CRITERIULUI LOGARITMIC

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\log \frac{1}{x_n}}{\log n} = x : \begin{cases} \text{Dacă } x > 1, \text{ seria } \sum_{n=0}^{\infty} x_n \text{ este convergentă} \\ \text{Dacă } x < 1, \text{ seria } \sum_{n=0}^{\infty} x_n \text{ este divergentă} \\ \text{Dacă } x = 1, \text{ nu se poate afirma nimic despre natura seriei} \end{cases}$$

**Propoziția 4.2.8. (CRITERIUL LUI KUMMER)**

Fie  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  o serie cu termeni pozitivi și  $(a_n)_{n \geq 0}$  și cu termeni pozitivi.

Dacă există  $N \in \mathbb{N}$  astfel încât:

$$1^0 \ a_n \cdot \frac{x_n}{x_{n+1}} - a_{n+1} \geq \lambda > 0, \ (\forall) n \geq N, \text{ atunci seria } \sum_{n=0}^{\infty} x_n \text{ este convergentă}$$

$$2^0 \ a_n \cdot \frac{x_n}{x_{n+1}} - a_{n+1} \leq \lambda < 0, \ (\forall) n \geq N, \text{ și seria } \sum_{n=0}^{\infty} \frac{1}{a_n} \text{ este divergentă, atunci}$$

seria  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  este divergentă.

**Demonstratie:**

Fără a micșora generalitatea se presupune  $N = 1$ .

1<sup>0</sup> Din inegalitatea

$$a_n \cdot \frac{x_n}{x_{n+1}} - a_{n+1} \geq \lambda > 0$$

se obține

$$a_n \cdot x_n - a_{n+1} \cdot x_{n+1} \geq \lambda \cdot x_{n+1} > 0$$

Deci șirul  $(a_n \cdot x_n)_{n \geq 0}$  este un șir descrescător. Fiind șir descrescător și cu termeni pozitivi înseamnă că este mărginit, deci convergent. Atunci există  $\ell \in \mathbb{R}$  finit astfel încât

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_n \cdot x_n = \ell$$

(1)

Se consideră seria cu termenul general

$$u_n = a_n \cdot x_n - a_{n+1} \cdot x_{n+1}. \text{ Termenul general al șirului sumelor parțiale pentru}$$

această serie este:

$$S_n = \sum_{k=0}^n (a_k x_k - a_{k+1} x_{k+1}) = a_0 x_0 - a_{n+1} x_{n+1}.$$

Atunci, ținând cont de (1)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = a_0 \cdot x_0 - \ell$$

$$\text{Așadar seria } \sum_{k=0}^n (a_k x_k - a_{k+1} x_{k+1}) \text{ este convergentă.}$$

(2)

Ținând cont de (2), conform primului criteriu al comparației rezultă că seria  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  este convergentă.

2<sup>o</sup> Se demonstrează analog ca la punctul (1<sup>o</sup>).

**Propoziția 4.2.9. (CRITERIUL RAABE-DUHAMEL)**

Fie  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  o serie cu termeni pozitivi.

1<sup>o</sup> Dacă există  $N \in \mathbb{N}$  astfel încât:  $n \cdot \left( \frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right) \geq \lambda > 0, (\forall) n \geq N$ , atunci

seria  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  este convergentă

2<sup>o</sup> Dacă există  $N \in \mathbb{N}$  astfel încât:  $n \cdot \left( \frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right) \leq \lambda < 0, (\forall) n \geq N$ , atunci

seria  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  este divergentă.

Demonstrație:

Dacă în criteriul lui KUMMER se considera  $a_n = n$  se obține criteriul lui RAABE-DUHAMEL. Deci acest criteriu este un caz particular al criteriului lui KUMMER.

**FORMA PRACTICĂ A CRITERIULUI RAABE-DUHAMEL**

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right) = x : \begin{cases} \text{Dacă } x > 1, \text{ seria este convergentă} \\ \text{Dacă } x < 1, \text{ seria este divergentă} \\ \text{Dacă } x = 1, \text{ nu se poate afirma nimic despre natura seriei} \end{cases}$$

După cum se poate observa, formele practice ale criteriilor de convergență rezultă direct din aceste criterii.

*Exemplu:*

Să se studieze convergența seriei

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n!}{a(a-1)(a-2)\dots(a-n)}, a \in \mathbb{R} \setminus \mathbb{N}$$

*Rezolvare:*

Se observă că termenul general al seriei este

$$x_n = \frac{n!}{a(a-1)(a-2)\dots(a-n)}$$

$$\frac{x_n}{x_{n+1}} = \frac{n!}{a(a-1)(a-2)\dots(a-n)} \cdot \frac{a(a-1)\dots a(a-n-1)}{(n+1)!} = \frac{a-n-1}{n+1}$$

Atunci

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \frac{a-n-1}{n+1} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \frac{a-2n-2}{n+1} \right) = -\infty$$

Cum  $-\infty < 1$  rezultă că seria este divergentă.

#### Observația 4.2.4.

Criteriul lui RAABE-DUHAMEL se folosește de obicei în studiul convergenței seriilor pentru care criteriul raportului nu poate da natura seriei.

#### Propoziția 4.2.10. (AL TREILEA CRITERIU AL COMPARATIEI)

Fie  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  și  $\sum_{n=0}^{\infty} y_n$  două serii cu termeni pozitivi astfel încât  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{y_n} = L$

Atunci dacă:

1<sup>o</sup>  $L \in (0, \infty)$ , seriile au aceeași natură.

2<sup>o</sup>  $L = 0$  și seria  $\sum_{n=0}^{\infty} y_n$  este convergentă rezultă că seria  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  este convergentă.

3<sup>o</sup>  $L = \infty$  și seria  $\sum_{n=0}^{\infty} y_n$  este divergentă rezultă că seria  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  este divergentă.

#### Demonstrație:

1<sup>o</sup> Se presupune că seriile nu sunt oscilante. Atunci șirurile  $(x_n)_{n \geq 0}$  și  $(y_n)_{n \geq 0}$  au limită (finită sau infinită) și  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = L \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$ . Cum  $L$  este finită atunci  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n$  finită (infinită)  $\Leftrightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} y_n$  finită (infinită). Deci seriile au aceeași natură.

2<sup>o</sup> Dacă  $L = 0$  atunci  $(\forall) \varepsilon > 0, (\exists) n(\varepsilon) > 0$  astfel încât  $(\forall) n > n(\varepsilon), \frac{x_n}{y_n} < \varepsilon$  adică  $x_n < \varepsilon \cdot y_n, (\forall) n \in \mathbb{N}$ . Deoarece seria  $\sum_{n=0}^{\infty} y_n$  este convergentă, atunci conform primului criteriu al comparației seria  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  este convergentă.

3<sup>o</sup> Dacă  $L = \infty$ , atunci  $(\forall) \varepsilon > 0, (\exists) n(\varepsilon) > 0$  astfel încât  $(\forall) n > n(\varepsilon), \frac{y_n}{x_n} < \varepsilon \Rightarrow y_n < \varepsilon \cdot x_n$  și cum seria  $\sum_{n=0}^{\infty} y_n$  este divergentă, conform primului criteriu al comparației seria  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  este divergentă.

#### Propoziția 4.2.11. (CRITERIUL LUI GAUSS)

Fie  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  o serie cu termeni pozitivi.

Dacă  $\frac{x_n}{x_{n+1}} = \alpha + \frac{\beta}{n} + \frac{\theta_n}{n^2}$ , unde  $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$ ,  $(\theta_n)_{n \geq 0}$  șir mărginit, atunci:

1<sup>0</sup> Dacă  $\alpha > 1$ , seria  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  este convergentă.

2<sup>0</sup> Dacă  $\alpha < 1$ , seria  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  este divergentă.

3<sup>0</sup> Dacă  $\alpha = 1$  și  $\beta > 1$ , seria  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  este convergentă, iar pentru  $\alpha = 1$  și

$\beta \leq 1$ , seria  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  este divergentă.

Demonstrație:

Deoarece  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_n}{x_{n+1}} = \alpha$ , atunci ținând cont de criteriul raportului se obține:

1<sup>0</sup> Dacă  $\alpha > 1$ , atunci  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{1}{\alpha} < 1$  și seria este convergentă.

2<sup>0</sup> Dacă  $\alpha < 1$ , atunci  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{1}{\alpha} > 1$  și seria este divergentă.

3<sup>0</sup> Dacă  $\alpha = 1$  atunci egalitatea din ipoteză se pune sub forma  $n \left( \frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right) = \beta + \frac{\theta_n}{n}$  și  $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right) = \beta$ . Atunci conform cu criteriul lui Raabe-

Duhamel pentru  $\beta > 1$ , seria  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  este convergentă și pentru  $\beta < 1$ , seria este divergentă.

**Propoziția 4.2.12.** (FORMA ECHIVALENTĂ A CRITERIULUI LUI GAUSS)

Fie  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  o serie cu termeni pozitivi.

Dacă  $\frac{x_n}{x_{n+1}} = \frac{n^p + a_1 n^{p-1} + a_2 n^{p-2} + \dots + a_p}{n^p + b_1 n^{p-1} + b_2 n^{p-2} + \dots + b_p}$ , atunci:

1<sup>0</sup> Dacă  $b_1 - a_1 > 1$ , seria  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  este convergentă.

2<sup>0</sup> Dacă  $b_1 - a_1 \leq 1$ , seria  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  este divergentă.

Se dau în continuare două criterii foarte utile în studiul convergenței seriilor cu termeni pozitivi.

### Propoziția 4.2.13.

Dacă seria  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  este o serie cu termeni pozitivi, atunci ea are aceeași natură cu seria  $\sum_{n=0}^{\infty} v_n$ , unde  $v_n = x_{k_{n-1}+1} + \dots + x_{k_n}$  unde  $(k_n)_{n \geq 0}$  este șir crescător nemărginit de numere reale.

### Propoziția 4.2.14.

Fie  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ , unde  $(x_n)_{n \geq 0}$  este șir descrescător de numere pozitive și  $(a_n)_{n \geq 0}$  un șir crescător nemărginit de numere naturale astfel încât șirul  $b_n = \frac{a_{n+1} - a_n}{a_n - a_{n-1}}$  este mărginit.

Atunci seriile  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  și  $\sum_{n=0}^{\infty} (a_{n+1} - a_n) x_{a_n}$  au aceeași natură (Criteriul de condensare Cauchy).

## 3. Serii cu termeni oarecare

**Definiția 4.3.1.** Seria  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  este o **serie cu termeni oarecare** dacă are o infinitate de termeni pozitivi și o infinitate de termeni negativi.

**Observația 4.3.1.:** Seriile cu o infinitate de termeni negativi, dar cu un număr finit de termeni pozitivi pot fi considerate serii cu termeni pozitivi.

Pentru seriile cu termeni oarecare se pune, ca și la celelalte tipuri de serii, problema convergenței sau divergenței. În acest caz, convergența are două aspecte:

- convergență absolută
- convergență simplă (semiconvergență)

Aceste noțiuni se definesc astfel:

**Definiția 4.3.1.** Fie  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  o serie cu termeni oarecare.

a) Se spune că seria este **absolut convergentă**, dacă seria  $\sum_{n=0}^{\infty} |x_n|$  este convergentă.

b) Dacă seria  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  este convergentă și seria  $\sum_{n=0}^{\infty} |x_n|$  nu este convergentă, atunci se spune că seria  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  este **semiconvergentă** sau **simplu convergentă** sau **convergentă**.

Legătura dintre absolut convergență și semiconvergență este dată de următoarea propoziție:

**Propoziția 4.3.1.**

Fie  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  o serie cu termeni oarecare. Dacă seria  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  este absolut convergentă rezultă că este convergentă. Reciproca nu este în general adevărată.

Demonstrație:

Dacă seria  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  este absolut convergentă rezultă că seria  $\sum_{n=0}^{\infty} |x_n|$  este convergentă.

Ținând cont de criteriul de convergență al lui Cauchy se poate afirma că: oricare ar fi  $\varepsilon > 0$ , există  $n(\varepsilon) > 0$ , astfel încât pentru orice  $n > n(\varepsilon)$  rezultă  $|x_{n+1}| + |x_{n+2}| + \dots + |x_{n+p}| < \varepsilon$ , pentru orice  $p \in \mathbb{N}$  fixat. Dar se știe că modulul sumei este mai mic sau egal decât suma modulelor, adică:

$$|x_{n+1}| + |x_{n+2}| + \dots + |x_{n+p}| \geq |x_{n+1} + x_{n+2} + \dots + x_{n+p}|$$

rezultă  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  este convergentă.

Pentru a demonstra că reciproca nu este în general adevărată se consideră seria

$$1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{(-1)^{n+1}}{n} + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^{n+1}}{n}$$

numită serie armonică

alternantă. Această serie este convergentă și are suma  $S = \ln 2$ .

Într-adevăr, se consideră termenul general al șirului sumelor parțiale

$$S_{2n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n}$$

Fie  $u_n = 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n}$ . Atunci este evident că  $u_{2n} - 2(u_n) = u_{2n} - u_n$ .

Aici dacă se înlocuiește efectiv se obține

$$\begin{aligned} u_{2n} - 2(u_n) &= 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{n-1} + \frac{1}{n} + \dots + \\ &\quad + \frac{1}{2n-1} + \frac{1}{2n} - 2\left(\frac{1}{2} + \frac{1}{4} + \frac{1}{6} + \dots + \frac{1}{2n}\right) = \\ &= 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n} \end{aligned}$$

(1)

$$u_{2n} - u_n = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n}$$

(2)

Din (1) și (2) se obține

$$S_{2n} = 1 - \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{4} + \dots + \frac{1}{2n-1} - \frac{1}{2n} = \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{2n} \quad (\text{identitatea lui Catalan})$$

Catalan)

$$\text{Deci } S_{2n} = \frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^n \frac{1}{1 + \frac{k}{n}} \text{ care este suma Riemann a funcției } f(x) = \frac{1}{1+x} \text{ pe}$$

$[0,1]$ . Cum funcția este integrabilă atunci  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_{2n} = \int_0^1 \frac{dx}{1+x} = \ln 2$ . Deci într-adevăr

seria este convergentă și are suma  $\ln 2$ .

Dar se observă că dacă se pornește de la seria (1) și se trece la module se obține seria  $1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} + \dots + \frac{1}{n} + \dots$  care este seria armonică și care se știe că este divergentă. Aceasta demonstrează că reciproca nu este în general adevărată.

#### **Observația 4.3.2.**

a) Ținând cont de definiția 4.3.2 rezultă că seriile cu termeni pozitivi sunt serii absolut convergente deoarece  $|x_n| = x_n$ .

b) Deoarece  $|x_n| > 0$ , pentru studiul absolut convergenței pot fi folosite și criteriile de la serii cu termeni pozitivi.

**Propoziția 4.3.2.** Seria termenilor pozitivi și seria termenilor negativi dintr-o serie semiconvergentă sunt serii divergente.

#### Demonstrație:

Fie  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  o serie semiconvergentă. Atunci conform cu definiția 4.3.2 seria  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  este convergentă și  $\sum_{n=0}^{\infty} |x_n|$  este divergentă. Fie  $S_n = \sum_{k=0}^n x_k$  și  $\sigma_n = \sum_{k=0}^n |x_k|$  termenii generali ai șirurilor sumelor parțiale pentru cele două serii. Atunci  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = S$  finită și  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sigma_n = +\infty$ .

Fie  $\alpha_n$  termenul general al șirului sumelor parțiale din seria termenilor pozitivi și  $\beta_n$  termenul general al șirului sumelor parțiale din seria termenilor negativi. Atunci au loc relațiile:

$$\begin{cases} \alpha_n + \beta_n = S_n \\ \alpha_n - \beta_n = \sigma_n \end{cases}$$

Ținând cont de aceste relații se obține:  $2\alpha_n = S_n + \sigma_n$ . Adică  $\alpha_n = \frac{S_n + \sigma_n}{2}$ .

Deci  $\lim_{n \rightarrow \infty} \alpha_n = \infty$ .



Adică seria termenilor pozitivi este divergentă, deoarece șirul sumelor parțiale pentru această serie are limita  $+\infty$ .

Tot din relațiile anterioare se obține  $2\beta_n = S_n - \sigma_n$ . Adică  $\beta_n = \frac{S_n - \sigma_n}{2}$ .

Deci  $\lim_{n \rightarrow \infty} \beta_n = -\infty$ .

Adică seria termenilor negativi este divergentă, deoarece șirul sumelor parțiale pentru această serie are limita  $-\infty$ .

Pentru studiul convergenței seriilor cu termeni oarecare, pe lângă criteriul general de convergență al lui Cauchy se mai pot folosi:

- 1<sup>0</sup> CRITERIUL LUI ABEL;
- 2<sup>0</sup> CRITERIUL LUI DIRICHLET;
- 3<sup>0</sup> CRITERIUL LUI LEIBNIZ.

### Propoziția 4.3.3. (CRITERIUL LUI ABEL)

Dacă  $(b_n)_{n \geq 0}$  este un șir monoton și mărginit, iar seria  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  este o serie cu termeni oarecare, convergentă, atunci și seria  $\sum_{n=0}^{\infty} b_n \cdot x_n$  este o serie convergentă.

#### Demonstrație:

Fără a micșora generalitatea se poate presupune că șirul  $(b_n)_{n \geq 0}$  este descrescător și are limita zero.

Fie  $S_n = \sum_{k=0}^n b_k x_k$  și  $a_n = \sum_{k=0}^n x_k$  termenii generali ai șirurilor sumelor parțiale pentru seriile  $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x_n$  și  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$ .

Pentru a arăta că seria  $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x_n$  este o serie convergentă, se arată că șirul  $(S_n)_{n \geq 0}$  este un șir fundamental.

Atunci cum  $\mathbb{R}$  este spațiu vectorial normat complet rezultă că  $(S_n)_{n \geq 0}$ , este convergent.

Într-adevăr

$$\begin{aligned} S_{n+p} - S_n &= b_{n+1} \cdot x_{n+1} + b_{n+2} \cdot x_{n+2} + \dots + b_{n+p} \cdot x_{n+p} = \\ &= b_{n+1}(a_{n+1} - a_n) + b_{n+2}(a_{n+2} - a_{n+1}) + \dots + b_{n+p}(a_{n+p} - a_{n+p-1}) = \\ &= (b_{n+p} \cdot a_{n+p} - b_{n+1} \cdot a_n) + \sum_{k=1}^{p-1} (b_{n+k} - b_{n+k+1}) a_{n+k} \end{aligned}$$

Se trece la modul în această egalitate și se obține:

$$|S_{n+p} - S_n| \leq b_{n+p} \cdot |a_{n+p}| + b_{n+1} \cdot |a_n| + \sum_{k=1}^{p-1} (b_{n+k} - b_{n+k+1}) |a_{n+k}|.$$

Deoarece seria  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  este convergentă rezultă că  $(a_n)_{n \geq 0}$  este mărginit.

Așadar:

$$\begin{aligned} |S_{n+p} - S_n| &\leq b_{n+p} \cdot |a_{n+p}| + b_{n+1} \cdot |a_n| + \sum_{k=1}^{p-1} (b_{n+k} - b_{n+k+1}) |a_{n+k}| \leq \\ &\leq M \left( b_{n+p} + b_{n+1} + \sum_{k=1}^{p-1} (b_{n+k} - b_{n+k+1}) \right) = 2M \cdot b_{n+1} \rightarrow 0 \end{aligned}$$

Așadar  $|S_{n+p} - S_n| \leq 2M \cdot b_{n+1} \rightarrow 0$ . De aici rezultă că șirul  $(S_n)_{n \geq 0}$  este șir Cauchy. Atunci șirul  $(S_n)_{n \geq 0}$  este convergent, deci seria  $\sum_{n=0}^{\infty} b_n x_n$  este convergentă.

#### Propoziția 4.3.4. (CRITERIUL LUI DIRICHLET)

Fie  $(a_n)_{n \geq 0}$  un șir monoton cu limita zero și  $S_n = x_0 + x_1 + \dots + x_n$  șir mărginit; atunci seria  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot x_n$  este o serie convergentă.

##### Demonstrație:

Se notează cu  $(\sigma_n)_{n \geq 0}$  șirul sumelor parțiale al seriei  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot x_n$ . Se arată în continuare că șirul  $(\sigma_n)_{n \geq 0}$  este șir Cauchy, ceea ce este echivalent cu faptul că seria  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot x_n$  este convergentă.

$$|\sigma_{n+p} - \sigma_n| = \left| \sum_{k=0}^p a_{n+k} \cdot x_{n+k} \right| \leq M \cdot |a_{n+1}| \rightarrow 0 \text{ deoarece } a_n \downarrow 0 \text{ și } |S_n| \leq M,$$

$(\forall) n \in \mathbb{N}$ .

Deci șirul  $(\sigma_n)_{n \geq 1}$  este șir Cauchy.

O categorie particulară de serii cu termeni oarecare sunt seriile alternante care se definesc astfel:

#### Definiția 4.3.3. Seria

$$x_1 - x_2 + x_3 - x_4 + \dots + (-1)^{n+1} x_n + \dots = \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} x_n, \quad x_n > 0$$

pentru orice  $n \in \mathbb{N}$  se numește **serie alternantă**.

Pentru o astfel de serie pot fi folosite în studiul convergenței atât criteriul lui Abel, cât și criteriul lui Dirichlet, dar în mod special pentru convergența acestui tip de serie se folosește următorul criteriu.

#### Propoziția 4.3.5. (CRITERIUL LUI LEIBNIZ)

Fie seria  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} x_n$  o serie alternantă. Dacă șirul  $(x_n)_{n \geq 1}$  este un șir descrescător cu limita zero, atunci seria alternantă este convergentă.

Demonstrație:

Criteriul lui LEIBNIZ este un caz particular al criteriului lui DIRICHLET.

Într-adevăr, în criteriul lui DIRICHLET, dacă se consideră în locul lui  $S_n = \sum_{k=1}^n x_k$

șirul  $\sum_{k=1}^n (-1)^{k+1}$ , iar în rolul șirului  $(\theta_n)_{n \geq 1}$  se consideră șirul  $(x_n)_{n \geq 1}$  se obține seria

$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} x_n$  din CRITERIUL LUI LEIBNIZ.

În continuare se pun în evidență câteva rezultate foarte utile în studiul seriilor.

**Propoziția 4.3.6.** Dacă într-o serie absolut convergentă se schimbă ordinea termenilor se obține tot o serie absolut convergentă cu aceeași sumă.

**Propoziția 4.3.7.** (TEOREMA LUI RIEMANN) Într-o serie semiconvergentă se poate schimba ordinea termenilor astfel încât seria obținută să fie o serie convergentă către un număr dat dinainte, finit sau infinit sau să fie o serie oscilantă.

Cu seriile numerice se pot face operații algebrice, deoarece ele sunt elemente ale unui spațiu vectorial normat.

Aceste operații se definesc astfel:

**Definiția 4.3.4.** Fie  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  și  $\sum_{n=0}^{\infty} y_n$  două serii numerice, atunci:

$$1^0 \sum_{n=0}^{\infty} x_n + \sum_{n=0}^{\infty} y_n = \sum_{n=0}^{\infty} (x_n + y_n) - \text{adunarea a două serii.}$$

$$2^0 \sum_{n=0}^{\infty} x_n - \sum_{n=0}^{\infty} y_n = \sum_{n=0}^{\infty} (x_n - y_n) - \text{scăderea a două serii.}$$

$$3^0 \alpha \sum_{n=0}^{\infty} x_n = \sum_{n=0}^{\infty} \alpha x_n - \text{înmulțirea unei serii cu un număr.}$$

$$4^0 \sum_{n=0}^{\infty} x_n \cdot \sum_{n=0}^{\infty} y_n = \sum_{n=0}^{\infty} z_n - \text{produsul a două serii.}$$

unde  $z_n = x_1 y_n + x_2 y_{n-1} + \dots + x_{n-1} y_2 + x_n y_1$ .

**Propoziția 4.3.8.** Dacă  $s$ ,  $S$ ,  $\sigma$ ,  $S'$  - sunt sumele următoarelor serii:

$$\sum_{n=0}^{\infty} x_n ; \sum_{n=0}^{\infty} y_n ; \sum_{n=0}^{\infty} (x_n + y_n) ; \sum_{n=0}^{\infty} (x_n - y_n)$$

atunci au loc relațiile:

$$1^0 \sigma = s + S$$

$$2^0 S' = s - S$$

**Propoziția 4.3.9.** Fie  $\sum_{n=0}^{\infty} x_n$  și  $\sum_{n=0}^{\infty} y_n$  două serii convergente ale căror sume sunt  $s$  și  $S$ , atunci seria produs  $\sum_{n=0}^{\infty} z_n$  este convergentă și are suma  $\theta$  și are loc relația  $\theta = s \cdot S$ .

## 4. Exerciții rezolvate

**Exercițiul 4.4.1.** Să se arate că următoarele serii sunt convergente și să se găsească suma lor

a) 
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)(n+3)}$$

b) 
$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln(n+1) - \ln n}{\ln n \cdot \ln(n+1)}$$

c) 
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{2n+1} - \sqrt{2n-1}}{\sqrt{4n^2-1}}$$

d) 
$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln\left(1 + \frac{1}{n}\right)$$

e) 
$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + (-1)^{n+1}}{5^n}$$

f) 
$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \cos \frac{x}{2^n}, \quad x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

g) 
$$\sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^2 + n - 3}{n!}$$

### Rezolvare:

Seria  $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$  este convergentă dacă  $S_n = \sum_{k=1}^n x_k$  este convergent și

$S = \lim_{n \rightarrow \infty} S_n$  este suma seriei, adică  $S = \sum_{n=1}^{\infty} x_n$ .

a) 
$$S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)(k+2)(k+3)}$$

$$\frac{1}{k(k+1)(k+2)(k+3)} = \frac{A_0}{k} + \frac{A_1}{k+1} + \frac{A_2}{k+2} + \frac{A_3}{k+3}$$

$$A_0 = \frac{1}{3!}; \quad A_1 = -\frac{1}{1!2!}; \quad A_2 = \frac{1}{2!1!}; \quad A_3 = \frac{-1}{3!}$$

$$S_n = \frac{1}{3!} \sum_{k=1}^n \left( \frac{1}{k} - \frac{1}{k+3} \right) - \frac{1}{2!} \sum_{k=1}^n \left( \frac{1}{k+1} - \frac{1}{k+2} \right) =$$

$$\frac{1}{6} \left( 1 + \frac{1}{2} + \frac{1}{3} - \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+2} - \frac{1}{n+3} \right) - \frac{1}{2} \left( \frac{1}{2} - \frac{1}{n+2} \right)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{11}{36} - \frac{1}{4} = \frac{2}{36} = \frac{1}{18} = \frac{1}{3 \cdot 3!}$$

Deci  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)(n+3)}$  este convergentă și

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)(n+3)} = \frac{1}{3 \cdot 3!}.$$

Acest exercițiu se poate generaliza astfel:

Seria  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)\dots(n+p)}$  este convergentă și are loc egalitatea

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+1)(n+2)\dots(n+p)} = \frac{1}{p \cdot p!}$$

b)  $S_n = \sum_{k=2}^n \frac{\ln(k+1) - \ln k}{\ln k \cdot \ln(k+1)} = \sum_{k=2}^n \left( \frac{1}{\ln k} - \frac{1}{\ln(k+1)} \right) = \frac{1}{\ln 2} - \frac{1}{\ln(n+1)}$ . Atunci

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{\ln 2}.$$

Deci seria  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln(n+1) - \ln n}{\ln n \cdot \ln(n+1)}$  este convergentă și  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{\ln(n+1) - \ln n}{\ln n \cdot \ln(n+1)} = \frac{1}{\ln 2}$ .

c)  $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{\sqrt{2k+1} - \sqrt{2k-1}}{\sqrt{4k^2 - 1}} = \sum_{k=1}^n \left( \frac{1}{\sqrt{2k-1}} - \frac{1}{\sqrt{2k+1}} \right) = 1 - \frac{1}{\sqrt{2n+1}}$ . Atunci

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 1.$$

Deci seria  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{2n+1} - \sqrt{2n-1}}{\sqrt{4n^2 - 1}}$  este convergentă și are suma 1.

d)  $S_n = \sum_{k=1}^n \ln \left( 1 + \frac{1}{k} \right) = \ln \prod_{k=1}^n \frac{k+1}{k} = \ln \frac{2 \cdot 3 \cdot 4 \dots n(n+1)}{1 \cdot 2 \cdot 3 \dots n} = \ln(n+1)$

Cum  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \infty$  seria  $\sum_{n=1}^{\infty} \ln \left( 1 + \frac{1}{n} \right)$  este divergentă.

e)  $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{2^k + (-1)^{k+1}}{5^k} = \sum_{k=1}^n \left( \frac{2}{5} \right)^k + \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k+1}}{5^k} = \frac{2}{3} \left[ 1 - \left( \frac{2}{3} \right)^n \right] + \frac{1}{6} \left[ 1 - \left( \frac{-1}{5} \right)^n \right]$

$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{2}{3} + \frac{1}{6} = \frac{5}{6}$ . Deci seria  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + (-1)^{n+1}}{5^n}$  este convergentă și

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + (-1)^{n+1}}{5^n} = \frac{5}{6}$$

$$f) S_n = \sum_{k=1}^n \ln \cos \frac{x}{2^k} = \ln \prod_{k=1}^n \cos \frac{x}{2^k}$$

(1)

$$\text{Fie } P = \cos \frac{x}{2} \cdot \cos \frac{x}{2^2} \cdot \cos \frac{x}{2^3} \cdots \cos \frac{x}{2^n} \Rightarrow P \sin \frac{x}{2^n} = \frac{1}{2^n} \cdot \sin x.$$

$$\text{Deci } P = \sin x \cdot \frac{1}{\sin \frac{x}{2^n}} \cdot \frac{2^n}{2^n}.$$

$$\text{Așadar } S_n = \ln \frac{\sin x}{x} \cdot \frac{2^n}{\sin \frac{x}{2^n}}. \quad \text{Atunci } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \ln \frac{\sin x}{x}. \quad \text{Deci } \text{seria}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} \ln \cos \frac{x}{2^n} \text{ este convergentă și } \sum_{n=1}^{\infty} \ln \cos \frac{x}{2^n} = \ln \frac{\sin x}{x}.$$

$$g) S_n = \sum_{k=2}^n \frac{k^2 + k - 3}{k!}$$

$$\frac{k^2 + k - 3}{k!} = \frac{k(k-1)}{k!} + \frac{2(k-1)}{k!} - \frac{1}{k!} = \left( \frac{1}{(k-2)!} - \frac{1}{k!} \right) + 2 \left( \frac{1}{(k-1)!} - \frac{1}{k!} \right)$$

$$S_n = \sum_{k=2}^n \left[ \frac{1}{(k-2)!} - \frac{1}{k!} \right] + 2 \sum_{k=2}^n \left( \frac{1}{(k-1)!} - \frac{1}{k!} \right) = 2 - \frac{1}{(n-1)!} - \frac{1}{n!} + 2 - \frac{2}{n!} = 4 - \frac{1}{(n-1)!} - \frac{3}{n!}.$$

Deci  $S_n = 4 - \frac{1}{(n-1)!} - \frac{3}{n!}$ . Atunci  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 4$ .

$$\text{Deci } \text{seria } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^2 + n - 3}{n!} \text{ este convergentă și } \sum_{n=2}^{\infty} \frac{n^2 + n - 3}{n!} = 4.$$

**Exercițiul 4.4.2.** Să se studieze convergența următoarelor serii:

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + 3^n}{2^{n+1} + 3^{n+1}}$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} 2^n \cdot \operatorname{tg} \frac{a}{2^n}, \quad a \in \left( 0, \frac{\pi}{2} \right)$$

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} \cos \frac{\alpha}{2} \cdot \cos \frac{\alpha}{2^2} \cdots \cos \frac{\alpha}{2^n}, \quad \alpha \in (0, \pi)$$

$$d) \sum_{n=1}^{\infty} (1 + x + x^2 + \dots + x^n) \cdot \operatorname{tg}(\cos x^n), \quad x \in (0, 1)$$

Rezolvare:

Conform cu propoziția 4.1.3 dacă  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n \neq 0$  atunci seria  $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$  este divergentă.

$$a) \quad x_n = \frac{2^n + 3^n}{2^{n+1} + 3^{n+1}} = \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^n + 1}{2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^n + 3}; \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{2}{3}\right)^n + 1}{2 \cdot \left(\frac{2}{3}\right)^n + 3} = \frac{1}{3}. \quad \text{Cum}$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{1}{3} \neq 0$ , seria  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n + 3^n}{2^{n+1} + 3^{n+1}}$  este divergentă.

$$b) \quad x_n = 2^n \cdot \operatorname{tg} \frac{a}{2^n} = a \cdot \frac{\operatorname{tg} \frac{a}{2^n}}{\frac{a}{2^n}}, \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} a \cdot \frac{\operatorname{tg} \frac{a}{2^n}}{\frac{a}{2^n}} = a \neq 0 \quad \text{deoarece}$$

$a \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ . Cum  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = a \neq 0$ , seria  $\sum_{n=1}^{\infty} 2^n \cdot \operatorname{tg} \frac{a}{2^n}$  este divergentă.

c)

$$x_n = \cos \frac{\alpha}{2} \cdot \cos \frac{\alpha}{2^2} \cdots \cos \frac{\alpha}{2^{n-1}} \cdot \cos \frac{\alpha}{2^n} \Rightarrow$$

$$x_n \cdot \sin \frac{\alpha}{2^n} = \frac{1}{2} \cos \frac{\alpha}{2} \cdot \cos \frac{\alpha}{2^2} \cdots \sin \frac{\alpha}{2^{n-1}} =$$

$$\frac{1}{2^2} \cdot \cos \frac{\alpha}{2} \cdot \cos \frac{\alpha}{2^2} \cdots \sin \frac{\alpha}{2^{n-2}} = \cdots = \frac{1}{2^n} \sin \alpha. \quad \text{Deci}$$

$$x_n = \frac{1}{2^n} \cdot \frac{\sin \alpha}{\sin \frac{\alpha}{2^n}} = \frac{\sin \alpha}{\alpha} \cdot \frac{\frac{\alpha}{2^n}}{\sin \frac{\alpha}{2^n}}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin \alpha}{\alpha} \cdot \frac{\frac{\alpha}{2^n}}{\sin \frac{\alpha}{2^n}} = \frac{\sin \alpha}{\alpha}. \quad \text{Cum} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{\sin \alpha}{\alpha} \neq 0 \quad \text{seria}$$

$\sum_{n=1}^{\infty} \cos \frac{\alpha}{2} \cdots \cos \frac{\alpha}{2^n}$  este divergentă.

$$d) \quad x_n = (1 + x + x^2 + \dots + x^n) \cdot \operatorname{tg}(\cos x^n) = \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x} \cdot \operatorname{tg}(\cos x^n)$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 - x^{n+1}}{1 - x} \cdot \operatorname{tg}(\cos x^n) = \frac{\operatorname{tg} 1}{1 - x}.$$

Cum  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = \frac{\operatorname{tg} 1}{1 - x} \neq 0$ , seria  $\sum_{n=1}^{\infty} (1 + x + \dots + x^n) \cdot \operatorname{tg}(\cos x^n)$  este divergentă.



**Exercițiul 4.4.3.** Folosind criteriul comparației să se arate că următoarele serii sunt convergente:

$$a) \left( \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a^n + n + p}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(1+x+\dots+x^n)} \right) \quad a > -1, x > 0$$

$$b) \left( \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^\alpha}, \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}} \right)$$

$$c) \left( \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln(n!)}, \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \cdot \ln n} \right)$$

Rezolvare:

Conform cu propoziția 4.1.5 seria  $\left( \sum_{n=1}^{\infty} x_n^1, \sum_{n=1}^{\infty} x_n^2, \dots, \sum_{n=1}^{\infty} x_n^m \right)$  este convergentă

dacă și numai dacă fiecare proiecție  $\sum_{n=1}^{\infty} x_n^i$ ,  $i = \overline{1, m}$  este convergentă.

a) Pentru  $a > 1$

$\frac{1}{a^n + n + p} < \frac{1}{a^n}$ . Seria  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a^n}$  este convergentă (vezi natura progresiei geometrice).

Conform primului criteriu al comparației seria  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a^n + n + p}$  este convergentă.

Pentru  $|a| < 1$

$$\frac{\frac{1}{a^n + n + p}}{\frac{1}{n}} = \frac{n}{n + p + a^n} = \frac{1}{1 + \frac{p}{n} + \frac{a^n}{n}}.$$

Atunci

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{a^n + n + p}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{1 + \frac{p}{n} + \frac{a^n}{n}} = 1$$

Conform cu propoziția 4.2.10 seriile  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a^n + n + p}$ ,  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$  au aceeași natură și anume divergente (vezi seria armonică).

Pentru  $x > 1$

$\frac{1}{n(1+x+\dots+x^n)} < \frac{1}{x^n}$ . Cum seria  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{x^n}$  este convergentă atunci, conform

primului criteriu al comparației, seria  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(1+x+\dots+x^n)}$  este convergentă.

Pentru  $x \in (0, 1)$

$$\frac{\frac{1}{n(1+x+\dots+x^n)}}{\frac{1}{n}} = \frac{1}{1+x+\dots+x^n} = \frac{1-x}{1-x^{n+1}}.$$

$$\text{Atunci } \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\frac{1}{n(1+x_1+\dots+x^n)}}{\frac{1}{n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1-x}{1-x^{n+1}} = 1-x.$$

Conform cu propoziția 4.2.10 seriile  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(1+x_1+\dots+x_n)}$ ,  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n}$  au aceeași natură. Deci sunt divergente. Deci se poate concluziona că seria  $\left( \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{a^n + n + p}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(x_1 + x_2 + \dots + x^n)} \right)$  este convergentă pentru  $a > 1$  și  $x > 1$  și divergentă  $a \in (-1, 1)$  sau  $x \in (0, 1)$ .

b) Este evident că  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(\ln n)^\alpha}{n} = 0$  pentru orice  $\alpha \in \mathbb{R}$ . Ținând cont de definiția limitei unui șir se obține  $(\ln n)^\alpha < n$  pentru orice  $n > N \in \mathbb{N}$  ( $N$  este un rang).

Atunci  $\frac{1}{(\ln n)^\alpha} > \frac{1}{n}$ . Conform cu propoziția 4.2.3 seria  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^\alpha}$  este divergentă.

$$(\ln n)^{\ln n} = e^{\ln n \cdot \ln n} = (e^{\ln n})^{\ln n} = n^{\ln n}. \text{ Așadar } (\ln n)^{\ln n} = n^{\ln n}$$

(1)

$$\text{Pentru } n > e^2 \text{ rezultă că } n^{\ln n} > n^2 \Rightarrow \frac{1}{n \ln n} < \frac{1}{n^2}$$

(2)

$$\text{Din (1) și (2) rezultă că } \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}} < \frac{1}{n^2}.$$

Conform cu propoziția 4.2.3 deoarece seria  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n^2}$  este convergentă rezultă că seria  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}}$  este convergentă. Deci se poate concluziona că seria

$\left( \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^\alpha}, \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{(\ln n)^{\ln n}} \right)$  este divergentă deoarece prima proiecție este divergentă pentru orice  $\alpha \in \mathbb{R}$ , deși a doua proiecție este convergentă.

$$\text{c) Deoarece } n! < n^n \Rightarrow \ln(n!) < n \cdot \ln n \Rightarrow \frac{1}{\ln(n!)} > \frac{1}{n \cdot \ln n}$$

(1)

Ținând cont de propoziția 4.2.14 seriile  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \cdot \ln n}$ ,  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{2^n}{2^n \cdot \ln 2^n} = \sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \cdot \ln 2}$  au aceeași natură. Deci seria  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \cdot \ln n}$  este divergentă, deoarece seria  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \cdot \ln 2}$  este divergentă.

Din inegalitatea (1) și divergența seriei  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{n \cdot \ln n}$  conform cu propoziția 4.2.3 se obține că seria  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{\ln(n!)}$  este divergentă.

**Exercițiul 4.4.4.** Folosind criteriul raportului și radicalului să se studieze convergența seriilor:

- a)  $\left( \sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n \cdot n!}{n^n}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^{2n}} \right)$
- b)  $\left( \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots \sqrt{2}}}^n, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{(n+1)! + (n+3)!} \right)$
- c)  $\left( \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{n}{2n+1} \right)^n, \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1^m + 2^m + \dots + n^m}{n^m} - \frac{n}{m+1} \right)^n \right) \quad \begin{matrix} m > 0 \\ \text{fixat} \end{matrix}$
- d)  $\left( \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{a \cdot n + b}{a \cdot n + c} \right)^{n^2}, \sum_{n=1}^{\infty} \left[ \sqrt{(n+1)(n+x)} - n \right]^n \right) \quad \begin{matrix} a > 0 \\ x > 0 \end{matrix}$

Rezolvare:

Conform cu propoziția 4.1.5 ca și la exercițiul precedent, se studiază convergența fiecărei proiecții pentru aceste serii din  $\mathbb{R}^2$ .

$$\text{a) } x_n = \frac{4^n \cdot n!}{n^n} \text{ Atunci } \frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{4^{n+1} \cdot (n+1)!}{(n+1)^{n+1}} \cdot \frac{n^n}{4^n \cdot n!} = 4 \cdot \left( \frac{n}{n+1} \right)^n.$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{4}{e} > 1$ . Conform cu propoziția 4.2.6 seria  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n \cdot n!}{n^n}$  este divergentă.

$$x_n = \frac{n!}{n^{2n}}. \text{ Atunci } \frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{(n+1)!}{(n+1)^{2(n+1)}} \cdot \frac{n^{2n}}{n!} = \frac{1}{n+1} \cdot \left[ \left( \frac{n}{n+1} \right)^n \right]^2.$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n+1} \cdot \left[ \left( \frac{n}{n+1} \right)^n \right]^2 = 0$ . Conform cu propoziția 4.2.6 seria

$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^{2n}}$  este convergentă.

Se poate concluziona că seria  $\left(\sum_{n=1}^{\infty} \frac{4^n \cdot n!}{n^n}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{n^{2n}}\right)$  este divergentă

deoarece prima sa proiecție este o serie divergentă, deși a doua proiecție este convergentă.

$$b) x_n = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{2}}}^n \Rightarrow x_n^2 = 2 + x_{n-1} \quad (1)$$

Din relația de recurență (1) rezultă că șirul este monoton și mărginit deci convergent și  $l^2 - l - 2 = 0 \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 2 \neq 0$ . Deci seria  $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{2}}}^{non}$  este divergentă.

$$x_n = \frac{2^n}{(n+1)! + (n+3)!}. \text{ Atunci } \frac{x_{n+1}}{x_n} = \frac{2^{n+1}}{(n+2)! + (n+4)!} \cdot \frac{(n+1)! + (n+3)!}{2^n} = 2 \cdot \frac{1 + (n+2)(n+3)}{n+2 + (n+2)(n+3)(n+4)} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = 2 \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1 + (n+2)(n+3)}{n+2 + (n+2)(n+3)(n+4)} = 0 < 1$$

Conform cu propoziția 4.2.6 seria  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{(n+1)! + (n+3)!}$  este convergentă. Se poate concluziona că seria  $\left(\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{2}}}^{non}, \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n}{(n+1)! + (n+3)!}\right)$  este divergentă deoarece prima proiecție a sa este o serie divergentă, deși a doua proiecție este serie convergentă.

$$c) x_n = \left(\frac{n}{2n+1}\right)^n \text{ Atunci } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2n+1} = \frac{1}{2}. \text{ Conform cu propoziția}$$

4.2.5 seria  $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{2n+1}\right)^n$  este convergentă.

$$x_n = \left[\frac{1^m + 2^m + \dots + n^m}{n^m} - \frac{n}{m+1}\right]^n.$$

$$\begin{aligned} \text{Atunci } \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} &= \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1^m + 2^m + \dots + n^m}{n^m} - \frac{n}{m+1}\right) = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-n^{m+1} + (m+1)n^m + \dots + 2^m(m+1) + m+1}{(m+1)n^m} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{-(n+1)^{m+1} + (n+1)^m \cdot (m+1) + n^{m+1}}{(m+1)[(n+1)^m - n^m]} = \\ &= \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{[(m+1)C_m^1 - C_{m+1}^2]n^{m-1} + \dots + m}{(m+1)[C_m^1 n^{m-1} + \dots + 1]} = \frac{-m^3 + 2m^2 + 3m}{m^2 + m} = \frac{-m^2 + 2m + 3}{m+1} \end{aligned}$$

Dacă  $\frac{-m^2 + 2m + 3}{m+1} > 1 \left(\Leftrightarrow \frac{-m^2 + m + 2}{m+1} > 0 \Rightarrow m \in \{0; 1\}\right)$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} > 1$  deci seria divergentă.

Dacă  $m \geq 3$ ,  $m \in \mathbb{N}$  fixat atunci  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[m]{x_n} < 1$  deci seria  $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$  convergentă.

$$\text{Pentru } m = 2, \sqrt[n]{x_n} = \frac{1^2 + 2^2 + \dots + n^2}{n^2} - \frac{n}{3} = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^2}; \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = \frac{1}{2} < 1.$$

Seria  $\sum_{n=1}^{\infty} \left[ \frac{1^2 + 2^2 + \dots + n^2}{n^2} - \frac{n}{3} \right]^n$  este convergentă. Deci se poate concluziona că

seria  $\left( \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{n}{2n+1} \right)^n, \sum_{n=1}^{\infty} \left[ \frac{1^m + 2^m + \dots + n^m}{n^m} - \frac{n}{m+1} \right]^n \right)$  este divergentă pentru

$m \in \{0,1\}$  (deoarece proiecția a doua este divergentă) și convergentă pentru  $m \geq 2$ ,  $m \in \mathbb{N}$  fixat.

$$d) x_n = \left( \frac{a \cdot n + b}{a \cdot n + c} \right)^{n^2} \text{ Atunci } \sqrt[n]{x_n} = \left( \frac{a \cdot n + b}{a \cdot n + c} \right)^n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{a \cdot n + b}{a \cdot n + c} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( 1 + \frac{b-c}{a \cdot n + c} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \left( 1 + \frac{b-c}{a \cdot n + c} \right)^{\frac{a \cdot n + c}{b-c}} \right]^{\frac{n(b-c)}{a \cdot n + c}} = e^{\frac{b-c}{a}}$$

Dacă  $\frac{b-c}{a} > 0$  atunci seria  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{a \cdot n + b}{a \cdot n + c} \right)^{n^2}$  este divergentă și pentru  $\frac{b-c}{a} < 0$  seria este convergentă.

Dacă  $b = c$  se obține  $\sum_{n=1}^{\infty} 1$  care este divergentă.

$$x_n = \left[ \sqrt{(n+1)(n+x)} - n \right]^n \text{ Atunci } \sqrt[n]{x_n} = \sqrt{(n+1)(n+x)} - n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x_n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sqrt{(n+1)(n+x)} - n \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(x+1) \cdot n + x}{\sqrt{(n+1)(n+x)} + n} = \frac{x+1}{2}$$

Pentru  $x \in (0,1)$  seria  $\sum_{n=1}^{\infty} \left[ \sqrt{(n+1)(n+x)} - n \right]^n$  este convergentă, iar pentru

$x > 1$  este divergentă. Pentru  $x = 1$  se obține  $\sum_{n=1}^{\infty} 1$  care este divergentă. Se

poate concluziona că seria  $\left( \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{a \cdot n + b}{a \cdot n + c} \right)^{n^2}, \sum_{n=1}^{\infty} \left[ \sqrt{(n+1)(n+x)} - n \right]^n \right)$  este

convergentă dacă  $b < c$  și  $x \in (0,1)$ . Dacă  $b \geq c$  sau  $x \geq 1$  seria este divergentă.

**Exercițiul 4.4.5.** Să se studieze convergența seriilor:

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n \cdot n!}{(2+1)(2 \cdot 2 + \frac{1}{2}) \dots (2n + \frac{1}{n})} \text{ Generalizare}$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} \left[ \frac{2(2+r)(2+2r) \dots (2+(n-1)r)}{3(3+1)(3+2r) \dots (3+(n-1)r)} \right]^\alpha, \alpha \in \mathbb{R}, r > 0 \text{ Generalizare}$$

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{\sqrt{2}(\sqrt{2}+1)(\sqrt{2}+2) \dots (\sqrt{2}+n-1)} \cdot \frac{1}{n^\alpha}; \alpha \in \mathbb{R}$$

$$d) 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{2}(\sqrt{2}+1) \dots (\sqrt{2}+n-1) \cdot \sqrt{3}(\sqrt{3}+1) \dots (\sqrt{3}+n-1)}{n! \sqrt{5}(\sqrt{5}+1)(\sqrt{5}+2) \dots (\sqrt{5}+n-1)} \text{ Generalizare}$$

Rezolvare:

$$a) x_n = \frac{2^n \cdot n!}{(2+1)(2 \cdot 2 + \frac{1}{2}) \dots (2n + \frac{1}{n})}$$

$$\frac{x_n}{x_{n+1}} = \frac{2^n \cdot n!}{(2+1)(2 \cdot 2 + \frac{1}{2}) \dots (2n + \frac{1}{n})} \cdot \frac{(2+1)(2 \cdot 2 + \frac{1}{2}) \dots (2n + \frac{1}{n})(2n+2 + \frac{1}{n+1})}{2^{n+1} \cdot (n+1)!} = \frac{2n+2 + \frac{1}{n+1}}{2n+2}$$

Deoarece  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = 1$  nu se poate aplica propoziția 4.2.6. Se aplică propoziția 4.2.9 și se obține:

$$n \left( \frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right) = n \left( \frac{2n+2 + \frac{1}{n+1}}{2n+2} - 1 \right) = n \cdot \frac{1}{2n+2} = \frac{n}{2(n+1)^2}$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{2(n+1)^2} = 0$ . Atunci conform cu propoziția 4.2.9 seria

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{2^n \cdot n!}{(2+1)(2 \cdot 2 + \frac{1}{2}) \dots (2n + \frac{1}{n})} \text{ este divergentă.}$$

Generalizarea acestei serii este următoarea:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n! \cdot b^n}{(b+a_1)(2b+a_2) \dots (bn+a_n)}, \quad b > 0 \quad \text{și} \quad \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = a. \text{ Pentru această serie,}$$

procedând analog se obține  $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right) = \frac{a}{b}$ . Atunci pentru  $\frac{a}{b} > 1$  este

convergentă și pentru  $\frac{a}{b} < 1$  seria este divergentă.

$$b) x_n = \left[ \frac{2(2+r)(2+2r) \dots [2+(n-1)r]}{3(3+1)(3+2r) \dots [3+(n-1)r]} \right]^\alpha.$$

Atunci  $\frac{x_n}{x_{n+1}} = \left(\frac{n \cdot r + 3}{n \cdot r + 2}\right)^\alpha$ . Cum  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = 1$  nu poate fi aplicată propoziția

4.2.6. Se aplică propoziția 4.2.9 și se obține  $n \left(\frac{x_n}{x_{n+1}} - 1\right) = \frac{\left(\frac{r + 3 \cdot \frac{1}{n}}{r + 2 \cdot \frac{1}{n}}\right)^\alpha - 1}{\frac{1}{n}}$ . Pentru

a se putea calcula  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\left(\frac{r + 3 \cdot \frac{1}{n}}{r + 2 \cdot \frac{1}{n}}\right)^\alpha - 1}{\frac{1}{n}}$  se aplică regula l'Hospital pentru

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\left(\frac{r + 3x}{r + 2x}\right)^\alpha - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \alpha \cdot \left(\frac{r + 3x}{r + 2x}\right)^{\alpha-1} \cdot \frac{r}{(r + 2x)^2}.$$

Deci  $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{x_n}{x_{n+1}} - 1\right) = \frac{\alpha}{r}$ . Atunci conform propoziției 4.2.9 pentru  $r < \alpha$  seria este convergentă, iar pentru  $r > \alpha$  este divergentă.

Generalizarea acestei serii este seria  $\sum_{n=1}^{\alpha} \left[ \frac{a(a+r)\dots(a+nr-r)}{b(b+r)\dots(b+nr-r)} \right]^\alpha$ ,  $a > 0, b > 0, r > 0, \alpha \in \mathbb{R}$ .

Procedând analog se găsește  $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left(\frac{x_n}{x_{n+1}} - 1\right) = \frac{\alpha(b-a)}{r}$ . Deci pentru  $r < \alpha(b-a)$  seria este convergentă, iar pentru  $r > \alpha(b-a)$  seria este divergentă.

$$\begin{aligned} \text{c) } x_n &= \frac{n!}{\sqrt{2}(\sqrt{2}+1)\dots(\sqrt{2}+n-1)} \cdot \frac{1}{n^\alpha} \\ \frac{x_n}{x_{n+1}} &= \frac{\sqrt{2}+n}{1+n} \cdot \left(\frac{1+n}{n}\right)^\alpha = \left(1 + \frac{\sqrt{2}}{n}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{\alpha-1} \\ n \left(\frac{x_n}{x_{n+1}} - 1\right) &= \frac{\left(1 + \frac{\sqrt{2}}{n}\right) \cdot \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{\alpha-1} - 1}{\frac{1}{n}} \end{aligned}$$

Pentru a calcula  $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right)$  se aplică regula lui l'Hospital pentru

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1 + \sqrt{2}x)(1+x)^{\alpha-1} - 1}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[ \sqrt{2}(1+x)^{\alpha-1} + (\alpha-1)(1+\sqrt{2}x)(1+x)^{\alpha-2} \right] = \sqrt{2} + \alpha - 1.$$

Deci  $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right) = \sqrt{2} + \alpha - 1$ . Așadar pentru  $\alpha > 2 - \sqrt{2}$  seria este convergentă, iar pentru  $\alpha < 2 - \sqrt{2}$  seria este divergentă. Generalizarea acestei serii este seria  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{a(a+1)\dots(a+n-1)} \cdot \frac{1}{n^a}$ ,  $a > 0$ ,  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

Procedând analog se găsește:  $\lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right) = a + \alpha - 1$ . Așadar pentru  $\alpha < 2 - a$  seria este divergentă, iar pentru  $\alpha > 2 - a$  seria este convergentă.

### Observație:

Convergența acestei serii se poate determina și cu ajutorul propoziției 4.2.11

$$\frac{x_n}{x_{n+1}} = 1 + \frac{a + \alpha - 1}{n} + \frac{\delta_n}{n^2} \quad (1)$$

unde  $\delta_n = a(\alpha-1) + \frac{(\alpha-1)(\alpha-2)}{2} \left(1 + \frac{\theta}{n}\right)^{\alpha-3} + \frac{\alpha(\alpha-1)(\alpha-2)}{2n} \left(1 + \frac{\theta}{n}\right)^{n-3}$ ,  $\theta \in (0,1)$ .

Se observă că șirul este convergent

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \delta_n = a(\alpha-1) + \frac{(\alpha-1)(\alpha-2)}{2} = \frac{(\alpha-1)(2a + \alpha - 2)}{2}.$$

Atunci acest șir este și mărginit.

Din egalitatea (1) conform cu propoziția 4.2.11  $a + \alpha - 1 > 1 \Leftrightarrow \alpha > 2 - a$  seria este convergentă, iar pentru  $\alpha < 2 - a$  seria este divergentă.

Pentru a pune pe  $\frac{x_n}{x_{n+1}}$  sub forma (1) se folosește formula lui Mac-Laurin

de ordin 3 pentru funcția  $f(n) = (1+n)^{\alpha-1}$  și  $\frac{x_n}{x_{n+1}} = \left(1 + \frac{a}{n}\right) \cdot f\left(\frac{1}{n}\right)$ .

$$d) x_n = \frac{\sqrt{2}(\sqrt{2}+1)\dots(\sqrt{2}+n-1) \cdot \sqrt{3}(\sqrt{3}+1)\dots(\sqrt{3}+n-1)}{n! \sqrt{5}(\sqrt{5}+1)\dots(\sqrt{5}+n-1)}.$$

Atunci  $\frac{x_n}{x_{n+1}} = \frac{(n+1)(n+\sqrt{5})}{(n+\sqrt{2})(n+\sqrt{3})}$ . Cum  $\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x_{n+1}}{x_n} = 1$  nu se poate folosi propoziția 4.2.6. și se aplică propoziția 4.2.9 se obține

$$n \left( \frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right) = n \left( \frac{(n+1)(n+\sqrt{5})}{(n+\sqrt{2})(n+\sqrt{3})} - 1 \right) = \frac{n^2(\sqrt{5} - \sqrt{2} - \sqrt{3} + 1) - n \cdot \sqrt{2} \cdot \sqrt{3}}{(n+\sqrt{2})(n+\sqrt{3})}.$$



$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right) = \sqrt{5} - \sqrt{2} - \sqrt{3} + 1 > 0$$

Așadar, seria  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{2}(\sqrt{2}+1)\dots(\sqrt{2}+n-1) \cdot \sqrt{3}(\sqrt{3}+1)\dots(\sqrt{3}+n-1)}{n! \sqrt{5}(\sqrt{5}+1)\dots(\sqrt{5}+n-1)}$  este convergentă.

### Observație

- Pentru a arăta că  $\sqrt{5} - \sqrt{2} - \sqrt{3} + 1 > 0$  se utilizează inegalitățile  $\sqrt{5} > 2,23$ ;  $\sqrt{2} < 1,48$ ;  $\sqrt{3} < 1,74$ .

- Generalizarea acestei serii este seria

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a(a+1)(a+2)\dots(a+n-1) \cdot b(b+1)(b+2)\dots(b+n-1)}{n! c(c+1)(c+2)\dots(c+n-1)}$$

- Fie  $\alpha = \max\{a, b, c\}$  și  $\beta = \min\{a, b, c\}$ . Dacă  $n_0 > \max\{\lceil \alpha \rceil, \lceil \beta \rceil\}$

atunci termenii seriei au același semn. Deci această serie poate fi considerată ca serie cu termeni pozitivi și aplicând propoziția 4.2.9 se obține

$$n \left( \frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right) = \frac{n^2 \cdot (c - a - b + 1) - n \cdot a \cdot b}{(n+a)(n+b)}.$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \frac{x_n}{x_{n+1}} - 1 \right) = c - a - b + 1. \text{ Conform cu propoziția 4.2.9 pentru}$$

$c - a - b < 0$  seria este divergentă.

Seria  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a(a+1)\dots(a+n-1) \cdot b(b+1)\dots(b+n-1)}{n! c(c+1)\dots(c+n-1)}$  se numește serie hipergeometrică.

### Exercițiul 4.4.6

Să se studieze natura următoarelor serii alternante:

a)  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n tg \frac{1}{n}$

b)  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(n+1)^{n+1}}{(n)^{n+2}}$

c)  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{[\ln(n+1)]^\alpha}, \alpha \in \mathbb{R}$

d)  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt[n]{n^\alpha}}, \alpha \in \mathbb{R}$

Rezolvare:

Conform cu propoziția 4.3.5. seria  $\sum_{n=1}^{\infty} |-1|^n x_n$  este convergentă dacă  $x_n \downarrow 0$ .

a)  $x_n = tg \frac{1}{n}$ . Deoarece  $(\forall) n \geq 1, \frac{1}{n} \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$  și  $f(x) = tg x$  este funcție crescătoare pe  $\left(0, \frac{\pi}{2}\right)$ . Se obține  $n_1 < n_2 \Rightarrow \frac{1}{n_1} > \frac{1}{n_2} \Rightarrow tg \frac{1}{n_1} > tg \frac{1}{n_2}$ .

Așadar  $(x_n)$  este șir descrescător și este evident că  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$ . Deci seria  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n tg \frac{1}{n}$  este convergentă.

Deoarece  $tg \frac{1}{n} \geq \frac{1}{n} \Rightarrow$  seria  $\sum_{n=1}^{\infty} tg \frac{1}{n}$  nu este convergentă. Deci seria alternantă  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n tg \frac{1}{n}$  nu este absolut convergentă.

b)  $x_n = \frac{(n+1)^{n+1}}{(n)^{n+2}} = \frac{n+1}{n^2} \cdot \left(\frac{n+1}{n}\right)^n$ . Atunci  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0 \cdot e = 0$ .

Se consideră funcția  $f: [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ .

$$f(x) = \left(\frac{x+1}{x}\right)^{x+1} \cdot \frac{1}{x} \Rightarrow f'(x) = \frac{1}{x} \cdot \left(\frac{x+1}{x}\right)^{x+1} \left(\frac{-2}{x} + \ln \frac{x+1}{x}\right)$$

$$\text{Fie } g(x) = \frac{-2}{x} + \ln \frac{x+1}{x} \Rightarrow g'(x) = \frac{x+2}{x^2(x+1)} > 0 \Rightarrow g(x) \nearrow \Rightarrow M_g \rightarrow 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow g(x) < 0 \Rightarrow f'(x) < 0 \Rightarrow f(x) \downarrow.$$

Atunci  $x_n = f(n)$  este șir descrescător și conform cu propoziția 4.3.5. seria  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(n+1)^{n+1}}{(n)^{n+2}}$  este convergentă.

Deoarece  $\frac{(n+1)^{n+1}}{(n)^{n+2}} = \left(\frac{n+1}{n}\right)^n \cdot \frac{n+1}{n^2} > e \cdot \frac{n+1}{n^2} > \frac{e}{n} \Rightarrow$  seria  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(n+1)^{n+1}}{(n)^{n+2}}$

este divergentă. Deci seria alternantă  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \frac{(n+1)^{n+1}}{(n)^{n+2}}$  nu este absolut convergentă.

c)  $x_n = \frac{1}{[\ln(n+1)]^\alpha}$ . Pentru  $\alpha < 0$  șirul  $(-1)^{n+1} \cdot \frac{1}{[\ln(n+1)]^\alpha}$  nu are limită.

Deci seria  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot \frac{1}{[\ln(n+1)]^\alpha}$  este oscilantă.

Pentru  $\alpha > 0$ ,  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 0$  și  $\frac{x_{n+1}}{x_n} = \left[ \frac{\ln(n+1)}{\ln(n+2)} \right]^\alpha < 1$ . Deci  $x_n \searrow$ . Atunci conform cu propoziția 4.3.5. seria  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot \frac{1}{[\ln(n+1)]^\alpha}$  este convergentă.

Deoarece  $\frac{1}{[\ln(n+1)]^\alpha} > \frac{1}{(n+1)^\alpha}$  ( $\forall \alpha > 0$ ), atunci pentru  $\alpha \leq 1$  seria  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{[\ln(n+1)]^\alpha}$  este divergentă. Deci pentru  $\alpha \in (0, 1]$  seria  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot \frac{1}{[\ln(n+1)]^\alpha}$  nu este absolut convergentă.

Pentru  $\alpha > 1$  seria  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{[\ln(n+1)]^\alpha}$  nu este convergentă deoarece  $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{[\ln(k+1)]^\alpha} > \frac{n}{[\ln(n+1)]^\alpha} \rightarrow \infty$

Deci seria  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{[\ln(n+1)]^\alpha}$  nu este convergentă pentru  $\alpha > 1$ . Atunci seria  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot \frac{1}{[\ln(n+1)]^\alpha}$  nu este absolut convergentă nici pentru  $\alpha > 1$ .

d)  $x_n = \frac{1}{\sqrt[n]{n^\alpha}} = \frac{1}{(\sqrt[n]{n})^\alpha}$ . Atunci  $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n = 1$

(1)

Așadar propoziția 4.3.5. nu mai poate fi folosită. Dacă se consideră  $y_n = (-1)^{n-1} \frac{1}{\sqrt[n]{n^\alpha}}$  este evident că  $y_{2n} \rightarrow -1$ ,  $y_{2n+1} \rightarrow 1$ . Atunci,  $(y_n)_{n \geq 1}$  nu are limită și seria  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot \frac{1}{\sqrt[n]{n^\alpha}}$ ,  $\alpha \in \mathbb{N}$  este oscilantă.

#### Exercițiul 4.4.7

Să se arate că seriile de mai jos au sumele indicate:

a)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n(n+k)} = \frac{1}{k} \left( 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{k} \right)$ ,  $k \in \mathbb{N}^*$ .

b)  $\sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{1}{n} - \ln \frac{n+1}{n} \right) = \gamma$ ,  $\gamma = 0,577215\dots$

c)  $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{arctg} \frac{1}{n^2 + n + 1} = \frac{\pi}{4}$

$$d) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^4}{n!} = 15e$$

Rezolvare:

$$a) S_n = \sum_{i=1}^n \frac{1}{i(i+k)}$$

$$\frac{1}{i(i+k)} = \frac{1}{k} \left( \frac{1}{i} - \frac{1}{i+k} \right) \Rightarrow S_n = \frac{1}{k} \left( 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{k} \right) - \left( \frac{1}{n+1} + \frac{1}{n+2} + \dots + \frac{1}{n+k} \right)$$

$$\text{Atunci } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{1}{k} \left( 1 + \frac{1}{2} + \dots + \frac{1}{k} \right)$$

$$b) S_n = \sum_{k=1}^n \left( \frac{1}{k} - \ln \frac{k+1}{k} \right) = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \sum_{k=1}^n \ln \frac{k+1}{k} = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n+1)$$

S-a arătat în 3.6 că șirul  $S_n = \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln(n+1)$  este convergent și are limita  $\gamma = 0,577215\dots$   $\gamma$  se mai numește constanta lui Euler.

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{arctg} \frac{1}{k^2 + k + 1}$$

$$\operatorname{arctg} \frac{1}{k^2 + k + 1} = \operatorname{arctg}(k+1) - \operatorname{arctg}k \Rightarrow S_n = \operatorname{arctg}(n+1) - \operatorname{arctg}1 = \operatorname{arctg}(n+1) - \frac{\pi}{4}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \frac{\pi}{2} - \frac{\pi}{4} = \frac{\pi}{4}$$

Deci seria este convergentă și  $\sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{arctg} \frac{1}{n^2 + n + 1} = \frac{\pi}{4}$

$$d) S_n = \sum_{k=1}^n \frac{k^4}{k!}$$

$$\frac{k^4}{k!} = \frac{1}{(k-4)!} + \frac{6}{(k-3)!} + \frac{7}{(k-2)!} + \frac{1}{(k-1)!}$$

Fie  $S_n^i = \sum_{k=1}^{n-i} \frac{1}{k!}$ ,  $i = 1, 2, 3, 4$ .

$$S_n = S_n^1 + 7S_n^2 + 6S_n^3 + S_n^4$$

Deoarece  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n^i = e$ ,  $i = 1, 2, 3, 4$ , se obține  $\lim_{n \rightarrow \infty} S_n = 15e$ . Deci

$$\sum_{k=1}^{\infty} \frac{n^4}{n!} = 15e.$$

# CAPITOLUL V

## ȘIRURI ȘI SERII DE FUNCȚII

### 1. Șiruri de funcții

Fie  $X$  și  $Y$  spații vectoriale normate. Se știe că  $Y^X = \{f | f : X \rightarrow Y; f - \text{funcție}\}$  este mulțimea funcțiilor definite pe  $X$  cu valori în  $Y$ .

**Definiția 5.1.1.** Fie  $S : \mathbb{N} \rightarrow Y^X$ ,  $S(n) = f_n(x)$  (pune în corespondență fiecare număr natural cu un element din  $Y^X$ ).  $S(n) = f_n(x)$  este **termenul general al unui șir de funcții** și se notează cu  $(f_n(x))_{n \geq 0}$ .

#### Observația 5.1.1.

c) Dacă  $X \subset \mathbb{R}$  și  $Y \subset \mathbb{R}$  șirul  $(f_n(x))_{n \geq 0}$  se numește șir de funcții reale de variabilă reală.

d) Dacă  $X \subseteq \mathbb{R}^m$  și  $Y \subset \mathbb{R}^k$  șirul  $(f_n(x))_{n \geq 0}$  se numește șir de funcții vectoriale de variabilă vectorială.

e) Fie  $x_0 \in X$ , atunci  $(f_n(x_0))_{n \geq 0}$  este un șir de elemente din spațiul vectorial normat  $Y$ .

Un șir de funcții  $(f_n(x))_{n \geq 0}$  generează șiruri de elemente  $(f_n(x_0))_{n \geq 0}$  din spațiul vectorial normat  $Y$ ; aceste șiruri de elemente pot fi convergente sau divergente. Numărul acestor șiruri este  $\text{card}X$ .

**Definiția 5.1.2.** Punctul  $x_0 \in X$  se numește **punct de convergență** al șirului de funcții  $(f_n(x))_{n \geq 0}$  dacă șirul de elemente  $(f_n(x_0))_{n \geq 0}$  ale spațiului vectorial normat  $Y$  este un șir convergent.

Mulțimea tuturor punctelor de convergență ale șirului de funcții  $(f_n(x))_{n \geq 0}$  se numește **mulțimea de convergență a șirului** și se notează în general cu  $M_C$ .

#### Observația 5.1.2.

a) Între domeniul de definiție  $X$  al tuturor funcțiilor din șir și mulțimea de convergență există relația  $M_C \subseteq X$ .

b) Punctul  $x_0 \in X$  dacă nu este un punct de convergență al șirului de funcții se numește punct de divergență al acestui șir și mulțimea tuturor punctelor

de divergență ale șirului de funcții se notează cu  $M_D$  și este evidentă relația  $M_D = X \setminus M_C$ .

**Exemple:**

1. Fie  $f_n : X \subseteq \mathbb{R} \rightarrow Y \subseteq \mathbb{R}$ ;  $f_n(x) = \frac{n \cdot x + 1}{n + 2}$  un șir de funcții reale de variabilă reală. Să se arate că:

- a)  $x_0 = 1$  este punct de convergență al șirului.
- b)  $M_C = \mathbb{R}$ .

Rezolvare:

a) Dacă în șirul de funcții  $f_n(x) = \frac{n \cdot x + 1}{n + 2}$  se înlocuiește  $x$  cu 1 se obține șirul de numere reale  $f_n(1) = \frac{n + 1}{n + 2}$ .

Deoarece  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(1) = 1$ , (șirul este convergent) rezultă că  $x_0 = 1$  este punct de convergență al șirului de funcții.

b) Pentru a determina mulțimea de convergență a șirului de funcții  $(f_n(x))_{n \geq 0}$  se calculează  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$ , unde  $x$  este considerat ca parametru, iar domeniul de definiție al funcției  $f(x)$ , care este limita acestui șir, reprezintă chiar mulțimea de convergență a șirului de funcții  $(f_n(x))_{n \geq 1}$ .

În cazul de față  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \cdot x + 1}{n + 2} = x$  rezultă  $f(x) = x$  și cum domeniul de definiție al acestei funcții este  $\mathbb{R}$  rezultă  $M_C = \mathbb{R}$  și deci este evident că  $M_D = \emptyset$ .

2. Fie  $f_n : X \subseteq \mathbb{R} \rightarrow Y \subseteq \mathbb{R}$ ,  $f_n(x) = \sqrt{\frac{2n}{\pi}} \cdot e^{\frac{nx^2}{2}}$  un șir de funcții reale de variabilă reală. Să se arate că:

- a)  $x_0 = 0$  este punct de divergență al șirului de funcții.
- b) să se determine  $M_C$ .

Rezolvare:

a)  $f_n(0) = \sqrt{\frac{2n}{\pi}} \Rightarrow \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(0) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt{\frac{2n}{\pi}} = \infty \Rightarrow$  șirul  $(f_n(0))_{n \geq 0}$  este divergent. Deci  $x_0 = 0$  este punct de divergență al șirului de funcții.

b)  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt{2n}}{\sqrt{\pi} \cdot e^{\frac{nx^2}{2}}} = 0$  (viteza de convergență a exponențialei este mai mare decât a funcției putere)  
 $(\forall) x \in \mathbb{R} - \{0\} \Rightarrow M_C = (-\infty, 0) \cup (0, \infty) \Rightarrow M_C = \{0\}$ .

În continuare se vor studia șiruri de funcții vectoriale de variabilă vectorială, adică  $X \subseteq \mathbb{R}^m$  și  $Y \subseteq \mathbb{R}^k$ .

Așa cum s-a văzut din exemplele anterioare, problema care se pune în legătură cu un șir de funcții este studiarea convergenței sau divergenței, și în cazul de convergență, găsirea funcției limită, dacă acest lucru este posibil.

Pentru șirurile de funcții, convergența este de două tipuri:

- convergență simplă sau punctuală
- convergență uniformă sau globală.

Aceste noțiuni se definesc după cum urmează:

**Definiția 5.1.3.** (CONVERGENȚA SIMPLĂ) Fie  $f_n : X \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow Y \subseteq \mathbb{R}^k$  un șir de funcții vectoriale de variabilă vectorială. Acest șir este convergent simplu sau punctual pe mulțimea  $X$ , către funcția  $f(x)$ , dacă oricare ar fi  $\varepsilon > 0$ , există  $n(x, \varepsilon) > 0$  astfel încât pentru orice  $n > n(x, \varepsilon)$ ,  $\|f_n(x) - f(x)\| < \varepsilon$ . Se scrie astfel:  $f_n(x) \xrightarrow{s} f(x)$  (converge simplu pe mulțimea  $X$  către  $f(x)$ ).

**Definiția 5.1.4.** (CONVERGENȚA UNIFORMĂ) Fie  $f_n : X \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow Y \subseteq \mathbb{R}^k$  un șir de funcții vectoriale de variabilă vectorială. Șirul  $(f_n(x))_{n \geq 0}$  converge uniform către funcția  $f(x)$  pe mulțimea  $X$  dacă oricare ar fi  $\varepsilon > 0$ , există  $n(\varepsilon) > 0$  astfel încât pentru orice  $n \geq n(\varepsilon)$  și  $x \in X$ ,  $\|f_n(x) - f(x)\| < \varepsilon$ . Se scrie astfel:  $f_n(x) \xrightarrow{u} f(x)$  (converge uniform pe mulțimea  $X$  către  $f(x)$ ).

**Observația 5.1.3.**

a) Din Definițiile 5.1.3 și 5.1.4 se observă că orice șir uniform, convergent este și un șir simplu convergent, pe când reciproca nu este în general adevărată.

b) O consecință imediată a Definiției 5.1.4 este următoarea:

Fie  $(f_n(x))_{n \geq 1}$ ,  $f_n : A \subseteq \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  un șir de funcții reale de variabilă reală.

Următoarele afirmații sunt echivalente:

i)  $f_n(x) \xrightarrow{u} f(x)$

ii)  $\sup_{x \in A} |f_n(x) - f(x)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

iii)  $\|f_n(x) - f(x)\|_{\infty} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

**Exemple:**

1. Fie  $f_n : (0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ , unde  $f_n(x) = x^n$ , un șir de funcții reale de variabilă reală. Să se arate că acest șir converge simplu către  $f(x) = \begin{cases} 0, & x \in (0, 1) \\ 1, & x = 1 \end{cases}$ , dar nu converge uniform către această funcție.

Rezolvare:

Deoarece

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} x^n = \begin{cases} 0, & x \in (0,1) \\ 1, & x = 1 \end{cases} \text{ rezultă că } f_n(x) \xrightarrow[(0,1)]{s} f(x).$$

Dacă se consideră  $x_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)$ , cum  $x_n \in (0,1)$  și

$$|f_n(x_n) - 0| = \left| \left(1 - \frac{1}{n}\right)^n \right| \rightarrow \frac{1}{e} \text{ rezultă, conform Definiției 5.1.4 că diferența}$$

$$|f_n(x_n) - f(x)| \text{ nu poate fi făcută oricât de mică deoarece pentru } x_n = \left(1 - \frac{1}{n}\right)$$

diferența se află într-o vecinătate a lui  $\frac{1}{e}$ . Deci convergența șirului  $(f_n(x))_{n \geq 0}$  nu este o convergență uniformă.

2. Fie  $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f_n(x) = \frac{1}{n^2 + x^2} + \frac{1}{(n+1)^2 + x^2}$ . Să se arate că acest șir este uniform convergent pe  $\mathbb{R}$  către  $f(x) = 0$ .

Rezolvare:

Într-adevăr limita acestui șir este funcția  $f : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  prin  $f(x) = 0$ , deoarece

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{1}{n^2 + x^2} + \frac{1}{(n+1)^2 + x^2} \right) = 0.$$

Această convergență este uniformă pe  $\mathbb{R}$  deoarece:

$$|f_n(x) - f(x)| = \left| \frac{1}{n^2 + x^2} + \frac{1}{(n+1)^2 + x^2} - 0 \right| \leq \frac{1}{n^2} + \frac{1}{(n+1)^2} \rightarrow 0.$$

Înseamnă că  $|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon$ ,  $(\forall) \varepsilon > 0$  indiferent de valoarea lui  $x \in \mathbb{R}$ . Deci acest șir converge uniform pe  $\mathbb{R}$  către  $f(x) = 0$ .

Cu ajutorul Definițiilor 5.1.3 și 5.1.4 poate fi studiată convergența simplă sau uniformă numai în cazul în care se cunoaște funcția limită. Sunt însă șiruri de funcții pentru care funcția limită nu poate fi determinată și convergența acestora nu poate fi studiată cu ajutorul definițiilor. Ea se va studia cu una din propozițiile următoare:

**Propoziția 5.1.1.** (CRITERIUL DE UNIFORM CONVERGENȚĂ AL LUI CAUCHY PENTRU ȘIRURI DE FUNCȚII)

Fie  $f_n : X \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow Y \subseteq \mathbb{R}^k$  un șir de funcții vectoriale de variabilă vectorială. Condiția necesară și suficientă ca acest șir de funcții să fie uniform convergent pe mulțimea  $X$  este: oricare ar fi  $\varepsilon > 0$ , există  $n(\varepsilon) > 0$  astfel încât pentru orice  $n > n(\varepsilon)$ ,  $\|f_n(x) - f(x)\| < \varepsilon$ , oricare ar fi  $p \geq 1$  și  $x \in X$ .

Demonstratie:



Se presupune că  $(f_n(x))_{n \geq 0}$  este un șir uniform convergent pe mulțimea  $X$  către o anumită funcție limită  $f(x)$ .

Atunci, conform Definiției 5.1.4 au loc relațiile:

$$(\forall) \varepsilon > 0, (\exists) n_1(\varepsilon) > 0 \text{ a.î. } (\forall) n > n_1(\varepsilon) \Rightarrow \|f_n(x) - f(x)\| < \varepsilon, (\forall) x \in X$$

$$(\forall) \varepsilon > 0, (\exists) n_2(\varepsilon) > 0 \text{ a.î. } (\forall) n > n_2(\varepsilon) \Rightarrow \|f_{n+p}(x) - f(x)\| < \varepsilon, (\forall) x \in X.$$

Dacă se notează  $n(\varepsilon) = \max\{n_1(\varepsilon), n_2(\varepsilon)\}$ , atunci are loc relația:

$$\begin{aligned} \|f_{n+p}(x) - f_n(x)\| &= \|f_{n+p}(x) - f(x) + f(x) - f_n(x)\| \leq \\ &\leq \|f_{n+p}(x) - f(x)\| + \|f_n(x) - f(x)\| < \varepsilon + \varepsilon = 2\varepsilon = \varepsilon' \end{aligned}$$

Ceea ce arată că  $\|f_{n+p}(x) - f_n(x)\| < \varepsilon$ , pentru orice  $\varepsilon > 0$  și  $p \geq 1$ .

**Reciproc:** Presupunem că relația din Propoziția 5.1.1 este îndeplinită, adică: pentru orice  $\varepsilon > 0$ , există  $n(\varepsilon) > 0$  astfel încât pentru orice  $n > n(\varepsilon)$ ,  $\|f_{n+p}(x) - f_n(x)\| < \varepsilon$ , oricare ar fi  $p \geq 1$  și  $x \in X$ .

Conform definiției unui șir fundamental rezultă că șirul  $(f_n(x))_{n \geq 0}$  este un șir fundamental pentru orice  $x \in X$ .

Cum spațiul vectorial normat  $\mathbb{R}^k$  este un spațiu BANACH (spațiu complet) rezultă că există o funcție  $f(x)$  ( $f: X \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow Y \subseteq \mathbb{R}^k$ ) astfel încât:  $f_n(x) \rightarrow f(x)$ , oricare ar fi  $x \in X$ .

Atunci în inegalitatea  $\|f_{n+p}(x) - f_n(x)\| < \varepsilon$  dacă se trece la limită după  $p \rightarrow \infty$ , se obține că:

$$(\forall) \varepsilon > 0, (\exists) n(\varepsilon) > 0 \text{ a.î. } (\forall) n > n(\varepsilon) \Rightarrow \|f_n(x) - f(x)\| < \varepsilon, (\forall) x \in X.$$

De unde rezultă că șirul este uniform convergent conform Definiției 5.1.4.

**Propoziția 5.1.2.** Fie  $f_n: X \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow Y \subseteq \mathbb{R}^k$  un șir de funcții vectoriale de variabilă vectorială. Dacă există un șir  $(a_n)_{n \geq 0}$  de numere reale pozitive convergent către 0 și are loc inegalitatea  $\|f_n(x) - f(x)\| \leq a_n$  începând de la un anumit rang  $n_0(\varepsilon)$ , oricare ar fi  $x \in X$ , atunci  $f_n(x)$  converge uniform pe mulțimea  $X$  către  $f(x)$ ,  $(f_n(x)) \xrightarrow{u} f(x)$ .

**Demonstrație:**

Deoarece  $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 0$  conform cu definiția convergenței unui șir de numere reale se poate afirma că  $(\forall) \varepsilon > 0, (\exists) n(\varepsilon) > 0$  astfel încât  $(\forall) n > n(\varepsilon), a_n < \varepsilon$ . Ținând cont de această inegalitate și de inegalitatea din enunțul propoziției rezultă că  $\|f_n(x) - f(x)\| < \varepsilon, (\forall) \varepsilon > 0$  și  $n > n(\varepsilon)$ . Aceasta arată că  $(f_n(x))_{n \geq 1}$  converge uniform pe  $X$  către  $f(x)$ .

**Exemple:**

1. Se consideră șirul  $(f_n(x))_{n \geq 0}$ ,  $f_n(x) = x \cdot \arctg n \cdot x$ . Să se arate că șirul este uniform convergent,  $(\forall) x \in [0, \infty)$ .

Rezolvare: Deoarece funcția limită  $f(x)$  nu poate fi determinată, în acest caz nu poate fi folosită definiția convergenței și atunci se va folosi Propoziția 5.1.1 și rezultă că:

$$\begin{aligned} |f_{n+p}(x) - f_n(x)| &= |x \cdot \arctg(n+p) \cdot x - x \cdot \arctg n \cdot x| = \\ &= x |\arctg(n+p) \cdot x - \arctg n \cdot x| = x \left| \arctg \frac{p \cdot x}{1 + (n+p) \cdot n \cdot x^2} \right| \leq \\ &\leq x \frac{p \cdot x}{1 + (n+p) \cdot n \cdot x^2} < \frac{x \cdot p \cdot x}{(n+p) \cdot n \cdot x^2} = \frac{p}{(n+p) \cdot n} \leq \frac{p}{n \cdot p} = \frac{1}{n} \rightarrow 0. \end{aligned}$$

Și conform faptului că șirul  $\frac{1}{n} \rightarrow 0$  atunci există  $n_0(\varepsilon) \geq 0$  astfel încât pentru orice  $\varepsilon > 0$  și  $n > n_0(\varepsilon)$  rezultă  $\frac{1}{n} < \varepsilon$  și  $|f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \varepsilon$  în condițiile date. Conform criteriului de uniform convergență al lui CAUCHY rezultă că șirul este uniform convergent.

2. Să se arate că șirul  $f_n(x) = \frac{\sin nx}{n^2}$ ,  $x \in X$  este uniform convergent pe mulțimea numerelor reale către  $f(x) = 0$ .

Rezolvare: Deoarece Definiția 5.1.4 este greu de aplicat, în acest caz se va folosi Propoziția 5.1.2

$$|f_{n+p}(x) - f_n(x)| = \left| \frac{\sin nx}{n^2} \right| \leq \frac{1}{n^2} \rightarrow 0.$$

Atunci, conform cu propoziția 5.1.2 rezultă că  $\frac{\sin nx}{n^2} \xrightarrow[u]{\mathbb{R}} 0$ .

Se știe că noțiunile de limită, continuitate, derivabilitate și integrabilitate sunt noțiuni de bază pentru funcțiile reale de variabilă reală.

În continuare se vor da condițiile în care aceste noțiuni se transferă de la termenii unui șir de funcții la funcția limită a șirului.

**Propoziția 5.1.3. (CONTINUITATEA)** Fie  $(f_n(x))_{n \geq 0}$  un șir de funcții continue, uniform convergente către funcția  $f(x)$  pe mulțimea  $X \subseteq \mathbb{R}^m$ . Atunci funcția limită  $f(x)$  este continuă.

Demonstrație: Ținând cont că  $f_n(x) \xrightarrow[x]{u} f(x)$  conform Definiției 5.1.4 se poate scrie că pentru orice  $\varepsilon > 0$ , există  $n_1(\varepsilon) > 0$  astfel încât oricare ar fi  $n > n_1(\varepsilon)$ , avem

$$\|f_n(x) - f(x)\| < \varepsilon, \text{ pentru orice } x \in X \quad (1)$$

Datorită faptului că funcțiile  $f_n(x)$  sunt continue în punctul  $x_0$ , conform definiției continuității, se poate scrie că oricare ar fi  $\varepsilon > 0$  există  $\delta(\varepsilon, x_0)$  astfel încât pentru orice  $x \in X$  cu  $\|x - x_0\| < \delta(\varepsilon)$ , are loc inegalitatea

$$\|f_n(x) - f_n(x_0)\| < \varepsilon \quad (2)$$

Pentru a demonstra că funcția limită  $f(x)$  este continuă în punctul  $x_0$ , trebuie arătat că  $\|f(x) - f(x_0)\|$  poate fi făcută oricât de mică (adică mai mică decât o mărime de tip  $\varepsilon$ ).

$$\begin{aligned} \|f(x) - f(x_0)\| &= \|(f(x) - f_n(x)) + (f_n(x) - f_n(x_0)) + (f_n(x_0) - f(x_0))\| \leq \\ &\leq \|f_n(x) - f(x)\| + \|f_n(x) - f_n(x_0)\| + \|f_n(x_0) - f(x_0)\| \leq \varepsilon + \varepsilon + \varepsilon = 3\varepsilon = \varepsilon' \end{aligned}$$

S-a ținut cont de inegalitățile (1) și (2) de unde rezultă că funcția  $f(x)$  este o funcție continuă în punctul  $x_0$ . Cum  $x_0$  a fost ales arbitrar în  $X$ , rezultă că  $f(x)$  este continuă pe mulțimea  $X$ .

**Propoziția 5.1.4. (DERIVABILITATEA)** Fie  $(f_n(x))_{n \geq 0}$  un șir de funcții derivabile pe mulțimea  $X \subseteq \mathbb{R}$  care este convergent către funcția  $f(x)$ . Dacă șirul  $(f'_n(x))_{n \geq 0}$  este uniform convergent pe mulțimea  $X$  către funcția  $g(x)$ , atunci funcția  $f(x)$  este derivabilă pe mulțimea  $X$  și are loc relația  $f'(x) = g(x)$ , pentru orice  $x \in X$ .

**Propoziția 5.1.5. (INTEGRABILITATEA)** Fie  $(f_n(x))_{n \geq 0}$  un șir de funcții continue pe intervalul închis  $[a, b]$  și uniform convergent pe acest interval către funcția  $f(x)$ . Atunci funcția  $f(x)$  este integrabilă și are loc egalitatea

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^b f_n(x) dx = \int_a^b f(x) dx$$

**Observația 5.1.4.**

a) Dacă  $X$  este interval compact de numere reale atunci în Propoziția 5.1.4 se poate considera că  $f_n(x)$  este convergent într-un singur punct  $x_0 \in X$ .

b) Egalitatea din Propoziția 5.1.5 se poate scrie și astfel

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_a^x f_n(x) dx = \int_a^x \left( \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right) dx, \quad (\forall) [a, x] \subseteq [a, b]$$

c) Propozițiile 5.1.4 și 5.1.5 au o mare utilitate în practică atunci când șirul  $(f_n(x))_{n \geq 0}$  este dificil de studiat, dar șirurile obținute din acestea prin derivare sau integrare sunt șiruri mai simple care pot fi studiate.

**Exemple:**

1. Să se determine limita următorului șir de funcții:

$$f_n(x) = \sum_{k=1}^n \frac{x^{k+1}}{k+1}, \quad f_n: [0,1) \rightarrow \mathbb{R}$$

Rezolvare: Se observă că  $f'_n(x) = \sum_{k=1}^n x^k$  atunci  $f'_n(x) = x \cdot \frac{1-x^n}{1-x}$ . Trecând la

limită se obține:  $\lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x) = \frac{x}{1-x}$  (convergența este uniformă).

Deci, fiind îndeplinite condițiile Propoziției 5.1.4 rezultă că funcția  $f(x)$ , limita șirului  $f_n(x)$  este derivabilă și are loc relația:

$$f'(x) = \frac{x}{1-x}. \text{ Integrând în această egalitate se obține:}$$

$$f(x) = \int_0^x \frac{x}{1-x} dx = \ln|1-x| - x, \quad (\forall) [0, x] \subset [0,1).$$

$$\text{Deci } \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{x^{k+1}}{k+1} = \ln|1-x| - x.$$

2. Fie  $f_n(x) = \sum_{k=1}^n (k+1)x^k$ ,  $x \in [0,1]$ . Să se determine limita acestui șir.

Rezolvare: Se integrează de la 0 la  $x$  șirul, termen cu termen și obținem:

$$\int_0^x f_n(x) dx = \sum_{k=1}^n (k+1) \int_0^x x^k dx = \sum_{k=1}^n (k+1) \frac{x^{k+1}}{k+1} \Big|_0^x = \sum_{k=1}^n x^{k+1}, \quad [0, x] \subseteq [0,1] \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \int_0^x f_n(x) dx = \sum_{k=1}^n x^{k+1} = x^2 \frac{1-x^n}{1-x}$$

Trecând la limită în această egalitate conform cu Propoziția 5.1.5 se obține:

$$\int_0^x f_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^x f_n(x) dx = \lim_{n \rightarrow \infty} x^2 \frac{1-x^n}{1-x} = \frac{x^2}{1-x}$$

Deci  $\int_0^x f_n(x) dx = \frac{x^2}{1-x}$ . Derivând această egalitate conform cu Propoziția

5.1.5 rezultă  $\int_0^x f(x) dx = \frac{x^2}{1-x}$  deci  $f(x) = \left( \frac{x^2}{1-x} \right)' = \frac{x(2-x)}{(1-x)^2}$ .

Așadar limita șirului este:  $f(x) = \frac{x(2-x)}{(1-x)^2}$ .

Există un rezultat mai puternic decât Propoziția 5.1.4 și anume:

**Propoziția 5.1.6.** (Teorema Weierstrass-Stone) Orice funcție continuă pe un interval compact  $I = [a, b] \subset \mathbb{R}$  este limita uniformă pe  $I$  a unui șir de polinoame.

## 2. Serii de funcții

**Definiția 5.2.1.** Fie  $(f_n(x))_{n \geq 0}$  un șir de funcții unde  $f_n : X \rightarrow Y$ ,  $X, Y$  spații vectoriale normate. Se consideră șirul  $S_n(x) = \sum_{k=0}^n f_k(x)$ . Atunci cupletul

$(f_n(x), S_n(x))$  definește o serie de funcții care se notează  $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$  unde:

$f_n(x)$  - termenul general al seriei de funcții;

$S_n(x)$  - termenul general al șirului sumelor parțiale.

Problema care se pune în legătură cu o serie de funcții este problema convergenței seriei de funcții și atunci când este posibil, determinarea sumei seriei de funcții, care este o funcție notată cu  $S(x)$ .

Definirea acestei noțiuni este următoarea:

**Definiția 5.2.2.** Fie  $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$ , ( $f_n : X \rightarrow Y$ , unde  $X, Y$  spații vectoriale normate) o serie de funcții:

a) seria este convergentă simplu pe mulțimea  $X$  către funcția  $f(x)$ , dacă șirul sumelor parțiale  $S_n(x) \xrightarrow{x} S(x)$ .

b) seria de funcții este uniform convergentă pe mulțimea  $X$  către funcția  $S(x)$ , dacă șirul sumelor parțiale  $S_n(x) \xrightarrow{u} S(x)$ .

c) seria de funcții  $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$  este absolut convergentă, dacă seria  $\sum_{n=0}^{\infty} |f_n(x)|$  este convergentă.

### Observația 5.2.1.

a) Se observă că pentru o serie de funcții există trei tipuri de convergență: convergență simplă, uniformă și absolută, iar problema convergenței unei serii este rezolvată prin convergența șirului de funcții  $S_n(x)$ .

b) Deoarece, de cele mai multe ori, șirul  $S_n(x) = \sum_{k=0}^n f_k(x)$  este dificil, problema convergenței seriei  $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$  nu poate fi în aceste cazuri rezolvată cu ajutorul definiției 5.2.2 și de aceea se apelează la următoarele propoziții în care

se consideră serii de funcții vectoriale de variabilă vectorială  $f_n : X \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow Y \subseteq \mathbb{R}^k$ .

**Propoziția 5.2.1.** (CRITERIUL GENERAL DE UNIFORM CONVERGENȚĂ AL LUI CAUCHY PENTRU SERII DE FUNCȚII)

Condiția necesară și suficientă ca seria de funcții  $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$  să fie uniform convergentă pe mulțimea  $X \subseteq \mathbb{R}^m$  este: pentru orice  $\varepsilon > 0$ , există  $n(\varepsilon) > 0$  astfel încât oricare ar fi  $n > n(\varepsilon)$  și  $p \geq 1$ ,

$$\|f_{n+1}(x) + f_{n+2}(x) + \dots + f_{n+p}(x)\| < \varepsilon, \text{ pentru orice } x \in X.$$

Demonstrație: Conform Definiției 5.2.2, punctul b), seria  $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$  este uniform convergentă pe  $X$  dacă șirul  $S_n(x) = \sum_{k=0}^n f_k(x)$  este uniform convergent pe mulțimea  $X$ .

Din criteriul de uniform convergență al lui CAUCHY pentru șirul  $(S_n(x))_{n \geq 0}$  se obține condiția necesară și suficientă de uniform convergență a acestui șir pe mulțimea  $X$ : pentru orice  $\varepsilon > 0$ , există  $n(\varepsilon) > 0$  astfel încât oricare ar fi  $n > n(\varepsilon)$  și  $p \geq 1$ ,

$$\|S_{n+p}(x) - S_n(x)\| < \varepsilon, \text{ pentru orice } x \in X.$$

$$\text{Dar } \|S_{n+p}(x) - S_n(x)\| = \left\| \sum_{k=0}^{n+p} f_k(x) - \sum_{k=0}^n f_k(x) \right\| = \|f_{n+1}(x) + \dots + f_{n+p}(x)\|.$$

Astfel se obține condiția din enunțul Propoziției 5.2.1.

O consecință imediată a Propoziției 5.2.1 este următoarea propoziție:

**Propoziția 5.2.2.** Fie  $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$  o serie de funcții simplu convergentă pe mulțimea  $X \subset \mathbb{R}$  către funcția  $f(x)$ . Condiția necesară și suficientă ca seria de funcții  $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$  să convergă uniform pe mulțimea  $A$  către funcția  $f(x)$  este că mulțimea  $\{N(\varepsilon, x) \mid x \in A, \varepsilon > 0\}$  să fie mărginită ( $N(\varepsilon, x)$  este rangul începând de la care  $\left| \sum_{k=1}^n f_k(x) - f(x) \right| < \varepsilon$ ).

**Propoziția 5.2.3.** (CRITERIUL LUI WEIERSTRASS) Condițiile necesare de uniform convergență pe mulțimea  $X$  a seriei  $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$  sunt:

$$1^0 \|f_n(x)\| \leq a_n, n \in \mathbb{N}$$

2<sup>0</sup> Seria de numere reale pozitive  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  este convergentă.

**Demonstrație:** Știind că seria  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n$  este convergentă, conform criteriului general de convergență al lui CAUCHY pentru serii numerice are loc afirmația: pentru orice  $\varepsilon > 0$ , există  $n(\varepsilon) > 0$  astfel încât oricare ar fi  $n > n(\varepsilon)$  și  $p \geq 1$ ,

$$a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_{n+p} < \varepsilon, \text{ pentru orice } x \in X \text{ și } p \in \mathbb{N}.$$

Din ipoteza 1<sup>0</sup> se obține următorul șir de inegalități:

$$\|f_{n+1}(x)\| \leq a_{n+1}, \|f_{n+2}(x)\| \leq a_{n+2}, \dots, \|f_{n+p}(x)\| \leq a_{n+p}.$$

Adunând termen cu termen aceste inegalități, rezultă:

$$\|f_{n+1}(x)\| + \|f_{n+2}(x)\| + \dots + \|f_{n+p}(x)\| \leq a_{n+1} + a_{n+2} + \dots + a_{n+p} < \varepsilon.$$

Știind că norma este mai mică decât suma normelor rezultă:

$$\|f_{n+1}(x) + f_{n+2}(x) + \dots + f_{n+p}(x)\| < \varepsilon$$

Conform cu Propoziția 5.2.1 rezultă că seria  $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$  este uniform convergentă pe  $X$ .

Ca și la șirurile de funcții și pentru seriile de funcții se pune problema transferării proprietăților de continuitate, derivabilitate și integrabilitate de la termenii seriei la suma seriei de funcții.

Această problemă este rezolvată de următoarele propoziții:

**Propoziția 5.2.4. (CONTINUITATEA)** Fie  $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$  o serie de funcții,  $f_n : X \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow Y \subseteq \mathbb{R}^k$ .

Dacă: 1<sup>0</sup>  $f_n(x)$  continue pe  $X$ , oricare ar fi  $n \in \mathbb{N}$ ;

2<sup>0</sup> Seria  $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$  este uniform convergentă către funcția  $f(x)$  pe mulțimea  $X$ .

Atunci  $f(x)$  este continuă pe  $X$ .

**Propoziția 5.2.5. (DERIVABILITATEA)** Fie  $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$ ,  $f_n : X \subseteq \mathbb{R} \rightarrow Y \subseteq \mathbb{R}$  o serie de funcții reale de variabilă reală ( $X$  interval de numere reale).

Dacă: 1<sup>0</sup> Seria  $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$  este simplu convergentă pe  $X$  către funcția  $f(x)$ ;

2<sup>0</sup>  $f_n(x)$  sunt funcții derivabile pe  $X$ , oricare ar fi  $n \in \mathbb{N}$ ;

3<sup>0</sup> Seria  $\sum_{n=0}^{\infty} f'_n(x)$  este uniform convergentă pe  $X$  către  $g(x)$ .

Atunci  $f(x)$  este derivabilă pe  $X$  și are loc relația  $f'(x) = g(x)$ .

**Propoziția 5.2.6. (INTEGRABILITATEA)** Fie seria  $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$ ,  
 $f_n : [a, b] \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  o serie de funcții.

Dacă: 1<sup>0</sup>  $f_n(x)$  sunt funcții integrabile pe  $[a, b]$ ;

2<sup>0</sup> Seria  $\sum_{n=0}^{\infty} f_n(x)$  converge uniform pe intervalul  $[a, b]$  către funcția  
 $f(x)$ .

Atunci  $f(x)$  este integrabilă pe  $[a, b]$  și are loc egalitatea:

$$\int_a^b f(x) dx = \sum_{n=0}^{\infty} \int_a^b f_n(x) dx$$



### Observația 5.2.2.

a) Demonstrația Propozițiilor 5.2.4, 5.2.5 și 5.2.6 se face aplicând propozițiile similare de la șirurile de funcții, șirului  $S_n(x) = \sum_{k=0}^n f_k(x)$ .

b) Propozițiile 5.2.4 și 5.2.5 se folosesc de obicei în calculul sumei anumitor serii atunci când  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=0}^n f_k(x)$  este dificil sau imposibil de calculat.

c) Dacă în Propoziția 5.2.4  $X$  este interval compact de numere reale, atunci proprietatea  $1^0$  poate fi înlocuită cu: seria  $\sum f_n(x)$  este convergentă într-un punct  $x \in X$ .

## 3. Serii de puteri

**Definiția 5.3.1.** O serie de forma  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ , unde  $a_n \in \mathbb{R}$ ,  $n \in \mathbb{N}$  se numește **serie de puteri**.

### Observația 5.3.1.

a) Se observă că orice serie de puteri este un caz particular de serie de funcții, unde  $f_n(x) = a_n x^n$ . De aceea teoria de la seriile de funcții se aplică și seriilor de puteri.

b) Fiind un caz particular de serie de funcții, există și alte propoziții în plus care se vor trata în cele ce urmează.

c) Suma unei serii de puteri se numește funcție analitică.

d) Mulțimea de convergență a unei serii de puteri nu este vidă.

Există serii de puteri pentru care  $M_c = \{0\}$  și există serii de puteri pentru care  $M_c = \mathbb{R}$  (exemplu:  $1 + \sum_{n=1}^{\infty} n^n \cdot x^n$ ;  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!}$ ).

**Propoziția 5.3.1. (TEOREMA LUI ABEL)** Fie  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  o serie de puteri.

Atunci există  $R \geq 0$ , astfel încât:

1<sup>0</sup> Seria  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  este absolut convergentă pentru  $x \in (-R, R)$ .

2<sup>0</sup> Seria  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  este divergentă pentru  $x \in (-\infty, -R) \cup (R, +\infty)$ .

Numărul  $R$  se numește rază de convergență a seriei de puteri.

Demonstrație:

1<sup>0</sup> Se observă că pentru seria  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$ ,  $x = 0$  este punct de convergență.

Dacă nu există un alt punct de convergență pentru seria de puteri, luând  $R = 0$ , teorema lui Abel este satisfăcută.

Să presupunem că există  $x_0 \neq 0$  punct de convergență pentru seria de puteri. Conform consecinței criteriului general de convergență al lui CAUCHY pentru serii numerice, rezultă că șirul  $f_n(x_0) = a_n x_0^n$  are limita zero. Fiind un șir convergent el este și un șir mărginit. Deci există  $M > 0$  astfel încât  $|a_n \cdot x_0^n| \leq M$ . Dacă se consideră  $|x| < |x_0|$  atunci au loc relațiile:

$$|a_n \cdot x^n| = |a_n \cdot x_0^n| \cdot \left| \frac{x^n}{x_0^n} \right| \leq M \left( \frac{|x|}{|x_0|} \right)^n, \text{ unde } \left| \frac{x}{x_0} \right| < 1.$$

Dar seria geometrică  $\sum_{n=0}^{\infty} q^n$  este convergentă pentru  $|q| < 1$ . Luând  $q = \left| \frac{x}{x_0} \right|$  rezultă că seria  $\sum_{n=0}^{\infty} \left| \frac{x}{x_0} \right|^n$  este convergentă. Deci, conform primului criteriu al comparației rezultă că seria  $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n \cdot x^n|$  este convergentă, pentru orice  $x \in (-|x_0|, |x_0|)$ , cum  $x_0$  este un punct de convergență arbitrar, dacă se notează cu  $R = \sup\{x_0\}$  rezultă  $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n \cdot x^n|$  este convergentă, pentru orice  $x \in (-R, R)$ . Deci, rezultă că seria  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot x^n$  este absolut convergentă, oricare ar fi  $x \in (-R, R)$ .

$2^0$  Dacă  $x_1$  este un punct de divergență al seriei de puteri, atunci rezultă că oricare ar fi  $x$  cu  $|x| > |x_1|$  și conform criteriului comparației avem că seria  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  este divergentă. Continuând raționamentul ca la punctul  $1^0$  rezultă că oricare ar fi  $x \in (-\infty, -|x_1|) \cup (|x_1|, +\infty)$  seria  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  este divergentă.

Dar este evident că și în acest caz  $\sup\{x_1\} = R$ . Deci rezultă că mulțimea de divergență este  $(-\infty, -R) \cup (R, +\infty)$ .

### Observația 5.3.2.

a) Se observă că teorema lui Abel afirmă existența razei de convergență pentru orice serie de puteri, dar nu indică modul de determinare a acesteia.

b) Cu ajutorul razei de convergență a seriei de puteri teorema lui Abel determină mulțimea de absolut convergență și divergență a seriei de puteri fără punctele  $x = -R$  și  $x = R$ .

Pentru a stabili natura seriei de puteri în aceste puncte se consideră seriile numerice  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n \cdot R^n$  și  $\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n a_n \cdot R^n$ . În funcție de natura acestor serii este și natura seriei de puteri în cele două puncte.

**Propoziția 5.3.2.** (CAUCHY-HADAMARD) Raza de convergență  $R$  pentru seria  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  este dată de relația  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = R$ .

Demonstrație:

Se consideră punctul  $x = x_0$  fixat, atunci seria

$$|a_0| + |a_1 \cdot x_0| + |a_2 \cdot x_0^2| + \dots + |a_n \cdot x_0^n| + \dots$$

Poate fi considerată o serie de puteri și atunci, conform cu Propoziția 5.3.1 (TEOREMA LUI ABEL) rezultă că aceasta este convergentă pentru orice

$$x_0 \in (-R, R). \quad (1)$$

Dar seria anterioară, concomitent, poate fi considerată și o serie cu termeni pozitivi și pentru stabilirea naturii acesteia poate fi aplicat criteriul lui D'ALAMBERT și conform formei practice a acestui criteriu se obține:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1} x_0^{n+1}}{a_n x_0^n} \right| = |x_0| \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right|.$$

$$\text{Dacă } \begin{cases} |x_0| \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| < 1 \text{ atunci seria este convergentă} \\ |x_0| \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_{n+1}}{a_n} \right| > 1 \text{ atunci seria este divergentă} \end{cases}$$

Deci pentru orice  $|x_0| < \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$  seria este convergentă, adică pentru orice

$$x_0 \in \left( -\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|, \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| \right) \quad (2)$$

seria este convergentă.

Comparând (1) cu (2) rezultă că:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = R.$$

**Observația 5.3.3.**

a) Pentru a calcula  $\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right|$  se folosește o formă echivalentă și se obține:

$$R = \frac{1}{\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|}}.$$

b) Dacă  $R$  este raza de convergență a seriei  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  atunci:

1<sup>0</sup> Seria derivatelor de ordin  $n$  are aceeași rază de convergență.

2<sup>0</sup> Dacă  $S(x) = \sum a_n x^n$ ,  $S^{(n)}(x)$  este suma seriei derivatelor de ordin  $n$ .

**Exemplu:**

Fie seria  $\sum_{n=0}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right) x^n$ . Să se determine mulțimea de convergență  $M_C$  și mulțimea de divergență  $M_D$ .

Rezolvare:

Deoarece seria este o serie de puteri conform teoremei lui Abel, pentru a determina pe  $M_C$  și  $M_D$ , trebuie determinată raza de convergență  $R$ . Conform formulei lui CAUCHY-HADAMARD rezultă că:

$$R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{n}{n+1} \cdot \frac{n+2}{n+1} \right| = 1$$

Deci pentru orice  $x \in (-1, 1)$  seria  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{n+1} x^n$  este convergentă și oricare ar fi  $x \in (-\infty, -1) \cup (1, \infty)$  seria  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{n+1} x^n$  este divergentă.

Se studiază natura acestei serii în punctele  $x = 1$  și  $x = -1$ .

Pentru aceasta se studiază următoarele serii numerice:  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n}{n+1}$  și

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n+1}.$$

$\frac{n}{n+1} > \frac{1}{n+1}$  și cum seria armonică este divergentă, conform criteriului

comparației rezultă că seria  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{n+1}$  este divergentă. Deci punctul  $x = 1$  este

punct de divergență pentru seria de puteri  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{n+1} x^n$ .

Folosim operația cu serii numerice

$$\sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n+1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \frac{1}{n+1}.$$

Cum cele două serii sunt convergente, rezultă că și seria

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n}{n+1} \text{ este convergentă.}$$

Deci  $x = -1$  este punct de convergență pentru seria

$$\sum_{n=0}^{\infty} \frac{n}{n+1} x^n \cdot M_D = (-\infty, -1) \cup [1, \infty), M_C = [-1, 1).$$

La seriile de funcții, pe lângă convergența simplă, se pune și problema convergenței uniforme.

Seriile de puteri fiind serii particulare de funcții, această problemă a convergenței uniforme se pune și pentru seriile de puteri.

**Propoziția 5.3.3.** Fie seria  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  o serie de puteri, atunci oricare ar fi  $x \in [-R + \varepsilon, R - \varepsilon]$ , unde  $\varepsilon \in (0, R)$ , seria este uniform convergentă.

*Demonstrație:*

Într-adevăr, dacă

$$|x| \leq R - \varepsilon \Rightarrow |a_n \cdot x^n| \leq |a_n (R - \varepsilon)^n|.$$

Cum seria  $\sum_{n=0}^{\infty} |a_n \cdot (R - \varepsilon)^n|$  este convergentă, conform cu criteriul lui

WEIERSTRASS rezultă că seria  $\sum_{n=0}^{\infty} a_n x^n$  este uniform convergentă.

**Observația 5.3.4.**

- Se observă că cel mai mare interval de uniform convergență este  $(-R, R)$ .
- Ținând cont de Propoziția 5.3.3 se poate afirma că  $(-r, r)$ ,  $r \in (0, R)$  este intervalul de uniform convergență pentru seria de puteri.

## 4. Formula Taylor pentru polinoame și funcții

**Propoziția 5.4.1.** Fie  $P(x) = \sum_{k=0}^n a_k \cdot x^k$ ;  $a_k \in \mathbb{R}$ . Dacă se consideră  $x_0 = a \in \mathbb{R}$ , atunci are loc relația:

$$P(x) = P(a) + \frac{x-a}{1!} P'(a) + \frac{(x-a)^2}{2!} P''(a) + \dots + \frac{(x-a)^n}{n!} P^{(n)}(a) = \sum_{k=0}^n \frac{(x-a)^k}{k!} P^{(k)}(a)$$

*Demonstrație:*

În polinomul  $P(x) = \sum_{k=0}^n a_k \cdot x^k$ , dacă se consideră că  $x \rightarrow x+h$  se obține:

$$P(x+h) = \sum_{k=0}^n a_k (x+h)^k.$$

Acest polinom dacă se ordonează după puterile lui  $h$ , atunci el are forma:

$$P(x+h) = \sum_{k=0}^n A_k h^k$$

(1)

unde  $A_k$  sunt coeficienții care de fapt sunt expresii de  $x$  ce urmează a fi determinați.

În relația (1), dacă se face  $h=0$  rezultă  $P(x) = A_0$ .

Se derivează relația (1) și se obține

$$P'(x+h) = A_1 + 2A_2h + 3A_3h^2 + \dots + nA_nh^{n-1}$$

(2)

În această relație, dacă se consideră  $h=0$ , se obține  $P'(x) = A_1$ .

Dacă se derivează relația (2) se obține

$$P''(x+h) = 2A_2 + 6A_3h + \dots + n(n-1)A_nh^{n-2}$$

(3)

În relația (3), dacă se consideră  $h=0$ , se obține  $P''(x) = 2A_2 = 2!A_2$ .

Procedând în mod analog, se obține că  $P^{(k)}(x) = k!A_k$ , oricare ar fi  $k = \overline{0, n}$ . Cu coeficienții  $A_k$  astfel determinați, dacă se revine în relația (1), se obține

$$P(x+h) = \sum_{k=0}^n \frac{h^k}{k!} P^{(k)}(x)$$

Dacă se consideră  $x=a$  și  $x+h=y$  se obține  $h=y-a$ .

Cu aceste notații egalitatea anterioară devine

$$P(y) = \sum_{k=0}^n \frac{(y-a)^k}{k!} P^{(k)}(a). \text{ Făcând schimbarea } y \rightarrow x \text{ se obține}$$

$P(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(x-a)^k}{k!} P^{(k)}(a)$  care este tocmai FORMULA LUI TAYLOR PENTRU POLINOAME.

#### Observația 5.4.1.

a) Formula lui Taylor pentru polinoame are o importanță calculatorie, în sensul că permite dezvoltarea polinomului  $P(x)$  după puterile lui  $x \pm a$ .

b) În formula lui Taylor pentru polinoame, dacă se consideră  $a=0$  se obține formula lui Mac-Laurin, care are următoarea formă:

$$P(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} P^{(k)}(0).$$

#### Exemplu:

Folosind formula lui Taylor pentru polinoame să se descompună în fracții simple fracția:

$$\frac{x^4 + 3x^3 + 2x^2 + x + 1}{(x-1)^5}$$

**Rezolvare:**

Se consideră polinomul  $P(x) = x^4 + 3x^3 + 2x^2 + x + 1$ .

Se scrie formula lui Taylor pentru acest polinom, pentru punctul  $a = 1$ .

$$P(x) = \sum_{k=0}^4 \frac{(x-1)^k}{k!} P^{(k)}(1)$$

Trebuie calculate derivatele până la ordinul patru inclusiv ale polinomului  $P(x)$  în punctul  $x = 1$ .

$$P(1) = 8$$

$$P'(x) = 4x^3 + 9x^2 + 4x + 1 \text{ rezultă } P'(1) = 18$$

$$P''(x) = 12x^2 + 18x + 4 \text{ rezultă } P''(1) = 34$$

$$P'''(x) = 24x + 18 \text{ rezultă } P'''(1) = 42$$

$$P^{(IV)}(x) = 24 \text{ rezultă } P^{(IV)}(1) = 24$$

$$P(x) = 8 + \frac{18}{1!}(x-1) + \frac{34}{2!}(x-1)^2 + \frac{42}{3!}(x-1)^3 + \frac{24}{4!}(x-1)^4.$$

Deci

$$P(x) = 8 + 18(x-1) + 17(x-1)^2 + 7(x-1)^3 + (x-1)^4.$$

Atunci

$$\begin{aligned} \frac{x^4 + 3x^3 + 2x^2 + x + 1}{(x-1)^5} &= \frac{8 + 18(x-1) + 17(x-1)^2 + 7(x-1)^3 + (x-1)^4}{(x-1)^5} = \\ &= \frac{8}{(x-1)^5} + \frac{18}{(x-1)^4} + \frac{17}{(x-1)^3} + \frac{7}{(x-1)^2} + \frac{1}{(x-1)} \end{aligned}$$

**Propoziția 5.4.2.** (FORMULA LUI TAYLOR PENTRU FUNCȚII CE NU SUNT POLINOAME) Fie  $f: I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție derivabilă de  $n+1$  ori în punctul

$x_0 \in I$  și  $P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(x-x_0)^k}{k!} f^{(k)}(x_0)$  polinomul lui Taylor atașat funcției  $f(x)$  pe intervalul  $I = [a, b]$ .

$$\text{Atunci } f(x) = P_n(x) + R_n(x),$$

$$\text{unde: } R_n(x) = \frac{(b-\xi)^{n+1-p} (x-a)^p}{n! \cdot p} \cdot f^{(n+1)}(\xi); \xi \in (a, b).$$

$R_n(x)$  se numește restul de ordinul  $n$  din formula lui Taylor, iar egalitatea se numește formula lui Taylor pentru funcția nepolinomială  $f(x)$ .

**Demonstrație:**

Pentru a determina restul  $R_n(x)$  este evident că el trebuie luat sub forma

$$R_n(x) = (x-a)^p A$$

(1)

unde  $A$  este un număr real ce se determină.

Pentru determinarea lui  $A$  se consideră funcția:

$$F(x) = f(x) + \frac{b-x}{1!} \cdot f'(x) + \frac{(b-x)^2}{2!} \cdot f''(x) + \dots + \frac{(b-x)^n}{n!} \cdot f^{(n)}(x) + (b-x)^p \cdot A$$

Se observă că funcția  $F(x)$  este o funcție Rolle raportată la intervalul  $[a, b]$ , adică ea are proprietățile:

1<sup>0</sup>  $F(x)$  continuă pe  $[a, b]$

2<sup>0</sup>  $F(x)$  derivabilă pe  $[a, b]$

3<sup>0</sup>  $F(a) = F(b)$ .

Deci, conform teoremei lui Rolle există  $\xi \in (a, b)$  astfel încât  $F'(\xi) = 0$ .

Dar

$$F'(x) = f'(x) - f'(x) + \frac{b-x}{1!} \cdot f''(x) - \frac{b-x}{1!} \cdot f''(x) + \frac{(b-x)^2}{2!} \cdot f'''(x) - \dots - \frac{(b-x)^{n-1}}{(n-1)!} \cdot f^{(n)}(x) + \frac{(b-x)^n}{n!} \cdot f^{(n+1)}(x) - p(b-x)^{p-1} \cdot A$$

Așadar:

$$F'(x) = \frac{(b-x)^n}{n!} \cdot f^{(n+1)}(x) - p(b-x)^{p-1} \cdot A$$

Ținând cont de aceasta se obține:

$$\frac{(b-\xi)^n}{n!} \cdot f^{(n+1)}(\xi) - p(b-\xi)^{p-1} \cdot A = 0. \text{ Deci } A = \frac{(b-\xi)^{n+1-p}}{n! \cdot p} \cdot f^{(n+1)}(\xi)$$

Cu  $A$  astfel determinat, conform (1) rezultă

$$R_n(x) = \frac{(b-\xi)^{n+1-p} (x-a)^p}{n! \cdot p} \cdot f^{(n+1)}(\xi).$$

$$\text{Dacă } \xi \in [a, x] \subset [a, b] \text{ atunci } R_n(x) = \frac{(x-\xi)^{n+1-p} (x-a)^p}{n! \cdot p} \cdot f^{(n+1)}(\xi).$$

### Observația 5.4.2.

a) Restul  $R_n(x)$  din Propoziția 5.4.2 se numește restul lui Taylor sub forma generală sau restul Schlömlich-Roche.

- Dacă în restul sub formă generală se consideră  $p = n+1$  se obține restul sub forma Lagrange care are evident forma:



$$R_n(x) = \frac{(x-a)^{n+1}}{(n+1)!} \cdot f^{(n+1)}(\xi), \quad \xi = a + (x-a)\theta, \quad \theta \in (0,1)$$

- Dacă se consideră  $p=1$  în forma generală a restului, se obține restul sub forma lui CAUCHY.

$$R_n(x) = \frac{(x-a)(x-\xi)^n}{n!} \cdot f^{(n+1)}(\xi)$$

sau

$$R_n(x) = \frac{(1-\theta)^n}{n!} \cdot x^{n+1} f^{(n+1)}(\theta \cdot x), \quad \theta \in (0,1) \text{ dacă } 0 \in I \text{ și } \xi \in (0,x).$$

b) Resturile sub cele trei forme din formula lui Taylor au o importanță deosebită în stabilirea erorii prin care formula lui Taylor aproximează funcția  $f(x)$  prin polinomul lui Taylor  $P_n(x)$ .

c) Formula lui Taylor pentru funcții are o importanță practică deosebită, deoarece permite tabelarea funcțiilor derivabile de  $n+1$  ori.

d) Dacă se consideră  $x_0=0$ , formula lui Taylor pentru funcții capătă forma:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} f^{(k)}(0) + R_n(x)$$

numită formula lui Mac-Laurin pentru funcții.

**Propoziția 5.4.3.** Dacă  $R_n(x)$  este restul din formula lui Taylor pentru funcția  $f(x)$  dezvoltată în jurul punctului  $x=a$ , are loc relația:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{R_n(x)}{(x-a)^n} = 0$$

**Observația 5.4.3.**

Relația din propoziția anterioară prezintă o importanță deosebită în calculul limitelor diverselor funcții, folosind dezvoltarea lor după din formula lui Taylor.

**Exemplu:**

Fie  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = \sin x$ . Să se dezvolte funcția  $f(x)$  folosind formula Mac-Laurin cu restul lui Lagrange.

Rezolvare:

Este evident că formula Mac-Laurin cu restul lui Lagrange are forma:

$$f(x) = \sum_{k=0}^n \frac{x^k}{k!} f^{(k)}(0) + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} f^{(n+1)}(\theta \cdot x), \quad \theta \in (0,1)$$

Pentru a găsi această dezvoltare este suficient să se găsească  $f^{(k)}(0)$ .

Dar se știe că  $(\sin x)^{(k)} = \sin\left(x + \frac{k\pi}{2}\right)$ . Atunci  $f^{(k)}(0) = \sin\frac{k\pi}{2}$

rezultă

$$\sin x = \sum_{k=0}^n \frac{\sin \frac{k\pi}{2}}{k!} x^k + \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \sin\left(\theta \cdot x + \frac{(n+1)\pi}{2}\right).$$

Deci aceasta este egalitatea cu ajutorul căreia se tabelează funcția  $\sin x$ .

### Exercițiu:

Să se dezvolte după formula Mac-Laurin funcțiile:

1)  $f(x) = \ln(1+x)$

2)  $f(x) = \ln(1-x)$

## DERIVATE DE ORDIN SUPERIOR

1.  $(f \cdot g)^{(n)}(x) = f^{(n)}(x) \cdot g(x) + C_n^1 f^{(n-1)}(x) \cdot g'(x) + \dots + C_n^{n-1} f(x) \cdot g^{(n-1)}(x) + C_n^n f(x) \cdot g^{(n)}(x)$ ,  $(\forall) x \in I$  (Formula Leibniz)

2.  $(\sin x)^{(n)} = \sin\left(x + n\frac{\pi}{2}\right)$ ,  $(\forall) x \in \mathbb{R}$ ,  $n \in \mathbb{N}$

3.  $(\cos x)^{(n)} = \cos\left(x + n\frac{\pi}{2}\right)$ ,  $(\forall) x \in \mathbb{R}$ ,  $n \in \mathbb{N}$

4.  $\left(\frac{1}{x}\right)^{(n)} = (-1)^n \frac{n!}{x^{n+1}}$ ,  $(\forall) x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}$ ,  $n \in \mathbb{N}$

5.  $(a \cdot e^x)^{(n)} = a \cdot e^x$ ,  $(\forall) x \in \mathbb{R}$ ,  $a \in \mathbb{R}$ ,  $n \in \mathbb{N}$

6.  $(x^m)^{(n)} = A_m^n x^{m-n}$ ,  $(\forall) x \in \mathbb{R}$ ,  $1 \leq n \leq m$

7.  $(a^x)^{(n)} = a^x (\ln a)^n$ ,  $a > 0$ ,  $x \in \mathbb{R}$ ,  $n \in \mathbb{N}$

8.  $(\ln x)^{(n)} = \frac{(-1)^{n-1} (n-1)!}{x^n}$ ,  $x \in \mathbb{R}$ ,  $n \in \mathbb{N}$

9.  $(\operatorname{sh} x)^{(2n)} = \operatorname{sh} x$ ,  $(\operatorname{sh} x)^{(2n-1)} = \operatorname{ch} x$ ,  $x \in \mathbb{R}$ ,  $n \geq 1$

10.  $(\operatorname{ch} x)^{(2n)} = \operatorname{ch} x$ ,  $(\operatorname{ch} x)^{(2n-1)} = \operatorname{sh} x$ ,  $x \in \mathbb{R}$ ,  $n \geq 1$

11.  $y = \arctg x$ ;

$$y^{(n)}(x) = (n-1)! \cos^n y \cdot \sin\left(y + n\frac{\pi}{2}\right), x \in \mathbb{R}, y \in \left(-\frac{\pi}{2}, \frac{\pi}{2}\right), n \geq 1$$

12.  $\left(\frac{1}{x \pm a}\right)^{(n)} = (-1)^n \frac{n!}{(x \pm a)^{n+1}}$ .

## 5. Seria Taylor

**Definiția 5.5.1.** Fie  $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție indefinit derivabilă în punctul  $x = a \in I$ . Atunci seria de puteri  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-a)^n}{n!} \cdot f^{(n)}(a)$  se numește seria Taylor atașată funcției  $f(x)$  pentru  $x = a$ .

- Dacă seria Taylor atașată funcției  $f(x)$  este convergentă și are ca sumă funcția  $f(x)$  atunci ea se numește serie Taylor a funcției  $f(x)$ .

### **Propoziția 5.5.1. (SERIA TAYLOR PENTRU FUNCȚIA $y = f(x)$ )**

Fie  $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție indefinit derivabilă în punctul  $x = a$  și  $R_n(x)$  restul din formula Taylor pentru funcția  $f(x)$ . Condiția necesară și suficientă ca funcția  $f(x)$  să fie dezvoltată în serie Taylor în punctul  $x = a$  este ca:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$$

*Demonstrație:*

Trebuie arătat că în condițiile Propoziției 5.5.1, seria Taylor atașată funcției  $f(x)$ , devine seria Taylor a funcției  $f(x)$ , adică are loc egalitatea:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-a)^n}{n!} \cdot f^{(n)}(a).$$

Se consideră formula Taylor pentru funcția  $f(x)$ .

$$f(x) = P_n(x) + R_n(x)$$

unde  $P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(x-a)^k}{k!} \cdot f^{(k)}(a)$  este polinomul Taylor al funcției.

Dacă se consideră  $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$  se obține:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = f(x) - \lim_{n \rightarrow \infty} P_n(x). \text{ Deci } \lim_{n \rightarrow \infty} P_n(x) = f(x).$$

Dar  $P_n(x) = \sum_{k=0}^n \frac{(x-a)^k}{k!} \cdot f^{(k)}(a)$  este de fapt termenul general al șirului sumelor

parțiale pentru seria de puteri  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-a)^n}{n!} \cdot f^{(n)}(a)$ .

Cum acest termen general are o limită finită  $f(x)$  rezultă că seria este convergentă pe o vecinătate a punctului  $x = a$ , către  $f(x)$ . Are loc egalitatea:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-a)^n}{n!} \cdot f^{(n)}(a).$$

**Observația 5.5.1.**

a) Clasa funcțiilor dezvoltabile în serie Taylor conform Propoziției 5.5.1 este inclusă în clasa funcțiilor ce admit dezvoltarea după formula lui Taylor.

b) Dacă în seria Taylor a funcției  $f(x)$  se consideră  $a = 0$ , se obține

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \cdot f^{(n)}(0)$$

care se numește seria lui Mac-Laurin atașată funcției  $f(x)$ .

**Propoziția 5.5.2.** Fie  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{(x-a)^n}{n!} \cdot f^{(n)}(a)$  seria Mac-Laurin atașată funcției  $f(x)$ . Această serie este convergentă către funcția  $f(x)$  pe intervalul  $[0, H]$  sau  $[-H, 0]$ , dacă  $|f^{(n)}(x)| < M$ , unde  $M > 0$ , oricare ar fi  $x \in [0, H]$  sau  $x \in [-H, 0]$ .

*Demonstrație:*

Se știe că restul  $R_n(x)$  sub forma lui Lagrange pentru funcția  $f(x)$  este:

$$R_n(x) = \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \cdot f^{(n+1)}(\theta x)$$

Pentru demonstrație se consideră  $\theta \in (0, 1)$ .

Din această formă rezultă:

$$|R_n(x)| = \left| \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \right| \cdot |f^{(n+1)}(\theta x)| < M \cdot \left| \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \right|.$$

Se notează:

$$u_n = \left| \frac{x^{n+1}}{(n+1)!} \right|. \text{ Atunci } \frac{u_{n+1}}{u_n} = \left| \frac{x}{n+2} \right|. \text{ Deci } \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = 0 < 1.$$

Deci, conform criteriului lui D'Alembert sau al raportului rezultă seria  $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$  este convergentă. Dar conform consecinței criteriului general de convergență al lui Cauchy pentru serii numerice rezultă  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$ .

Conform criteriului majorării rezultă  $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$ .

Conform Propoziției 5.5.1 rezultă că funcția  $f(x)$  este dezvoltabilă în serie Taylor.

**Exemple:**

1. Să se dezvolte în serie Mac-Laurin funcția  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x) = e^x$ .

Rezolvare:

Pentru a cerceta dacă funcția  $f(x) = e^x$  este dezvoltabilă în serie Mac-Laurin (Taylor), conform Propoziției 5.5.2 trebuie arătat că există  $V_0$  astfel încât oricare ar fi  $x \in V_0$  avem  $|f^{(n)}(x)| < M$ , pentru orice  $n \in \mathbb{N}$ . Într-adevăr,  $f^{(n)}(x) = e^x$ . Se știe că pentru orice  $x \in (-a, a)$  are loc relația  $e^{-a} < e^x < e^a$  datorită monotoniei funcției  $f(x) = e^x$ .

Deci rezultă că pentru orice  $x \in (-a, a)$ ,  $|f^{(n)}(x)| < e^a = M$ . Deoarece intervalul  $(-a, a)$  este o vecinătate oarecare a lui 0 rezultă că funcția  $f(x) = e^x$  este dezvoltabilă în serie Mac-Laurin

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \cdot f^{(n)}(0) \text{ seria Mac-Laurin a funcției } f^{(n)}(x) = e^x$$

$$f^{(n)}(0) = 1, \text{ atunci } e^x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \dots + \frac{x^n}{n!} + \dots$$

Afirmațiile anterioare rămân valabile și pentru  $a \rightarrow \infty$ . Deci  $f(x) = e^x$  este dezvoltabilă în serie de puteri  $(\forall) x \in \mathbb{R}$ .

2. Să se cerceteze dacă funcția  $f(x) = \sin x$ ,  $x \in \mathbb{R}$  este dezvoltabilă în serie Mac-Laurin și în caz afirmativ să se determine această dezvoltare.

Rezolvare:

Se știe că:

$$f^{(n)}(x) = \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right).$$

Cum

$$\left| \sin\left(x + \frac{n\pi}{2}\right) \right| \leq 1, \text{ oricare ar fi } x \in \mathbb{R} \text{ rezultă că}$$

$|f^{(n)}(x)| \leq 1 = M$ , pentru orice  $x \in (-\infty, \infty)$  care poate fi considerată cea mai mare vecinătate a lui 0.

Conform Propoziției 5.5.2 rezultă  $f(x) = \sin x$  este dezvoltabilă în serie de puteri sau seria Mac-Laurin.

$$f^{(n)}(0) = \sin \frac{n\pi}{2} = \begin{cases} 0, & n = 4p \\ 1, & n = 4p + 1 \\ 0, & n = 4p + 2 \\ -1, & n = 4p + 3 \end{cases}$$

Cu alte cuvinte seria Mac-Laurin este:

$$\sin x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \sin \frac{n\pi}{2} = \frac{x}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} + \dots$$

3. Să se cerceteze dacă funcția  $f(x) = \cos x$ ,  $x \in \mathbb{R}$  este dezvoltabilă în serie Mac-Laurin (serie de puteri) și în caz afirmativ să se determine această dezvoltare.

Rezolvare:

Se știe că:

$$f_{(x)}^{(n)}(x) = (\sin x)^{(n)} = \cos\left(x + \frac{nx}{2}\right)$$

rezultă că

$$\left| \cos\left(x + \frac{nx}{2}\right) \right| \leq 1$$

$f_{(x)}^{(n)}(x) \leq 1 = M$ , pentru orice  $x \in (-\infty, \infty)$  care poate fi considerată cea mai mare vecinătate a punctului 0.

Conform Propoziției 5,5,2 rezultă  $f(x) = \cos x$  este dezvoltabilă în serie de puteri și aceasta este:

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \cos \frac{n\pi}{2} = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} - \dots$$

**Exerciții:**

Să se dezvolte în serie Mac-Laurin funcțiile:

1)  $f(x) = \ln(1+x)$ .

2)  $f(x) = \ln(1-x)$ .

3)  $f(x) = \frac{1}{(1-x)^n}$ ,  $n = 1, 2, 3$ .

4)  $f(x) = \frac{1}{(1+x)^n}$ ,  $n = 1, 2, 3$ .

5)  $f(x) = \arctg x$

**Propoziția 5.5.3.** (FORMULELE LUI EULER) Pentru orice  $x \in \mathbb{R}$  au loc relațiile:

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2};$$

$$\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}, \quad i = \sqrt{-1},$$

care se numesc formulele lui Euler.

Demonstrație:

Se știe că oricare ar fi  $x \in \mathbb{R}$

$$\sin x = \frac{x}{1!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^5}{5!} - \frac{x^7}{7!} - \dots$$

(1)

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \dots$$

Se consideră funcția  $f(x) = e^{\alpha x}$ . Deoarece  $f^{(n)}(x) = \alpha^n \cdot e^{\alpha x}$  rezultă că  $f^{(n)}(0) = \alpha^n$ .

Deci seria Mac-Laurin pentru funcția  $f(x) = e^{\alpha x}$  este:

$$e^{\alpha x} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} = 1 + \alpha \frac{x}{1!} + \alpha^2 \frac{x^2}{2!} + \alpha^3 \frac{x^3}{3!} + \alpha^4 \frac{x^4}{4!} + \alpha^5 \frac{x^5}{5!} + \alpha^6 \frac{x^6}{6!} + \alpha^7 \frac{x^7}{7!} + \dots$$

În această egalitate dacă se consideră  $\alpha = i$  și  $\alpha = -i$  se obțin următoarele relații:

Se știe că:

$$e^{ix} = 1 + i \frac{x}{1!} - \frac{x^2}{2!} - i \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} - i \frac{x^5}{5!} - \frac{x^6}{6!} - i \frac{x^7}{7!} + \dots$$

(2)

$$e^{-ix} = 1 - i \frac{x}{1!} - \frac{x^2}{2!} + i \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} - i \frac{x^5}{5!} - \frac{x^6}{6!} + i \frac{x^7}{7!} + \dots$$

Conform relațiilor (1), relațiile (2) devin:

$$e^{ix} = \cos x + i \sin x$$

$$e^{-ix} = \cos x - i \sin x$$

Dacă se adună cele două relații se obține:

$$\cos x = \frac{e^{ix} + e^{-ix}}{2}$$

Dacă se scad cele două relații se obține:

$$\sin x = \frac{e^{ix} - e^{-ix}}{2i}$$

Astfel s-au obținut formulele lui Euler.

**Propoziția 5.5.4.** (SERIA BINOMIALĂ) Dacă  $|x| < 1$ , atunci seria binomială

$$1 + \frac{\lambda}{1!}x + \frac{\lambda(\lambda-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{\lambda(\lambda-1)\dots(\lambda-n+1)}{n!}x^n + \dots$$
 este convergentă către

$$f(x) = (1+x)^\lambda, \text{ oricare ar fi } \lambda \in \mathbb{R}.$$

*Demonstrație:*

Se scrie formula lui Mac-Laurin cu restul sub forma lui Cauchy pentru funcția  $f(x) = (1+x)^\lambda$ .

Într-adevăr, pentru a putea scrie această formulă, se știe că:

$$R_n(x) = \frac{(1-\theta)^n}{n!} \cdot x^{n+1} \cdot f^{(n+1)}(\theta \cdot x), \theta \in (0,1)$$

este restul sub forma lui Cauchy pentru funcția  $y = f(x)$ .

Deoarece în cazul de față

$$f^{(n)}(x) = \lambda(\lambda-1)(\lambda-2)\dots(\lambda-n+1)(1+x)^{\lambda-n}$$

rezultă

$$f^{(n+1)}(\theta \cdot x) = \lambda(\lambda-1)(\lambda-2)\dots(\lambda-n)(1+\theta x)^{\lambda-n-1}$$

Iar restul sub forma lui Cauchy este:

$$R_n(x) = \frac{(1-\theta)^n}{n!} \cdot x^{n+1} \cdot \lambda(\lambda-1)(\lambda-2)\dots(\lambda-n) \cdot (1+\theta x)^{\lambda-n-1}.$$

Conform Propoziției 5.5.1 ca această funcție să fie dezvoltabilă în serie de puteri (Mac-Laurin) trebuie ca  $\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = 0$ .

Pentru a arăta această egalitate se fac următoarele notații:

$$u_n = \frac{\lambda(\lambda-1)(\lambda-2)\dots(\lambda-n)}{n!} \cdot (1+\theta x)^{\lambda-1} \quad \text{și} \quad v_n = \left(\frac{1-\theta}{1+\theta x}\right)^n \cdot (1+\theta x)^{\lambda-1}$$

Cu aceste notații rezultă că  $R_n(x) = v_n \cdot u_n$

(1)

Dacă se aplică criteriul raportului seriei  $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$  rezultă

$$\left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = \left| \frac{\lambda(\lambda-1)(\lambda-2)\dots(\lambda-n-1) \cdot x^{n+2}}{(n+1)!} \cdot \frac{n!}{\lambda(\lambda-1)\dots(\lambda-n)} \cdot x^{-n-1} \right| = \left| \frac{\lambda-n-1}{n+1} x \right|$$

Deci

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{u_{n+1}}{u_n} \right| = |x| < 1, \text{ oricare ar fi } x \in (-1,1).$$

Deci seria  $\sum_{n=0}^{\infty} u_n$  un convergent pentru  $x \in (-1,1)$ .

Atunci  $\lim_{n \rightarrow \infty} u_n = 0$

(2)

$$\lim_{n \rightarrow \infty} v_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \left(\frac{1-\theta}{1+\theta x}\right)^n (1+\theta x)^{\lambda-1} = 0$$

(3)

Din (1), (2) și (3) se obține:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} R_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} u_n \cdot v_n = 0, \quad (\forall) x \in (-1,1).$$

Ținând cont de Propoziția 5.5.1 rezultă că funcția  $f(x) = (1+x)^\lambda$  este dezvoltabilă în serie de puteri pe intervalul  $(-1,1)$ .

Ținând cont de faptul că:

$$f(x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^n}{n!} \cdot f^{(n)}(0)$$



$$f^{(n)}(x) = \lambda(\lambda-1)(\lambda-2)\dots(\lambda-n+1)(1+x)^{\lambda-n}.$$

De aici rezultă că

$$f^{(n)}(0) = \lambda(\lambda-1)(\lambda-2)\dots(\lambda-n+1)$$

Atunci rezultă că

$$(1+x)^\lambda = 1 + \frac{\lambda}{1!}x + \frac{\lambda(\lambda-1)}{2!}x^2 + \dots + \frac{\lambda(\lambda-1)(\lambda-2)\dots(\lambda-n-1)}{2!}x^n + \dots$$

care este **seria binomială**.

**Exemplu:**

Să se dezvolte în serie de puteri funcția  $f(x) = \sqrt{1+x}$ ,  $x \in (-1,1)$ .

Rezolvare:

$$\sqrt{1+x} = (1+x)^{\frac{1}{2}}.$$

Deci pentru a obține dezvoltarea în serie a acestei funcții se înlocuiește în seria binomială  $\lambda = \frac{1}{2}$  și se obține:

$$\sqrt{1+x} = 1 + \frac{x}{2} - \frac{1}{2^2 \cdot 2!}x^2 + \frac{1 \cdot 3}{2^3 \cdot 3!}x^3 - \frac{1 \cdot 3 \cdot 5}{2^4 \cdot 4!}x^4 + \dots + (-1)^{n+1} \cdot \frac{1 \cdot 3 \cdot 5 \cdot \dots \cdot (2n-3)}{2^n \cdot n!}x^n + \dots$$

## 6. Exerciții rezolvate

**Exercițiul 5.6.1.** Să se studieze convergența (simplă și uniformă) pentru următoarele șiruri de funcții:

a)  $f_n : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = x^n$

b)  $f_n : [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = \frac{n \cdot x}{1 + nx}$

c)  $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = \frac{x}{1 + nx^2}$

d)  $f_n : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = e^{-nx^2} \sin x$

e)  $f_n : \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}, f_n(x) = \sqrt[n]{x}$

Rezolvare:

După cum se știe, sunt adevărate următoarele afirmații:

1° Dacă  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = f(x)$  atunci  $f_n(x) \xrightarrow[A]{S} f(x)$

2°  $f_n \xrightarrow[A]{U} f(x)$  dacă și numai dacă

i)  $\sup_{x \in A} |f_n(x) - f(x)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$

sau

ii) Există un șir de numere pozitive  $a_n \rightarrow 0$  a.î.  $|f_n(x) - f(x)| \leq a_n$   
( $\forall$ )  $x \in A$

sau

iii) Există șirul de funcții  $q_n(x) \xrightarrow[A]{U} 0$  a.î.  $|f_n(x) - f(x)| \leq q_n(x)$   
( $\forall$ )  $x \in A$

iv)  $\|f_n(x) - f(x)\|_\infty \rightarrow 0$

a)  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} x^n = \begin{cases} 0; & x \in [0, 1) \\ 1; & x = 1 \end{cases}$ .

Deci  $f : [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$   $f(x) = \begin{cases} 0; & x \in [0, 1) \\ 1; & x = 1 \end{cases}$  este funcție spre care șirul converge

simplu.

$$|f_n(x) - f(x)| = \begin{cases} x^n; & x \in [0, 1) \\ 1; & x = 1 \end{cases}$$

Deci  $\sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - f(x)| = 1, (\forall) n \geq 1$ . Deoarece este evident că nu este

satisfăcut 2° i), șirul nu este uniform convergent.

**Observație:**

Dacă  $a \in (0, 1)$  atunci

$\sup_{x \in [0, a]} |f_n(x) - f(x)| = a^n$  și  $\lim_{n \rightarrow \infty} a^n = 0$ . Așadar  $\sup_{x \in [0, a]} |f_n(x) - f(x)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$  și, conform cu 2° i), șirul converge uniform la  $f(x)$  pe  $[0, a]$ .

b)  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 1 \quad \forall x \in \mathbf{R}_+$ . Deci funcția  $f: [0, \infty) \rightarrow \mathbf{R}$ .  $f(x) = 1$  este funcția spre care șirul  $(f_n(x))_{n \geq 1}$  converge simplu.

$$|f_n(x) - f(x)| = \frac{1}{1 + nx} \Rightarrow \sup_{x \in [0, \infty)} |f_n(x) - f(x)| = 1. \quad \text{Atunci}$$

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [0, \infty)} |f_n(x) - f(x)| = 1$  și, conform cu 2° i), șirul  $f_n(x)$  nu converge uniform la  $f(x)$ .

**Observație:**

Fie  $a > 0$  atunci  $\sup_{x \in [a, \infty)} |f_n(x) - f(x)| = \frac{1}{1 + na}$ . Atunci

$\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{x \in [a, \infty)} |f_n(x) - f(x)| = 0$  și, conform cu 2° i),  $f_n(x) \xrightarrow[u \in [a, \infty)]{u} f(x) \quad a > 0$ .

c)  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0 \quad \forall x \in \mathbf{R}$ . Deci funcția  $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ ;  $f(x) = 0$  este funcția spre care șirul converge simplu.

$$|f_n(x) - f(x)| = \frac{x}{1 + nx^2}.$$

Se calculează  $\|f_n(x) - f(x)\|_\infty = \|f_n(x)\|_\infty$ . Pentru aceasta se folosește relația:

$$\|f\|_\infty = \max_{x \in \mathbf{R}} \{|f(-\infty)|, |f(x_1)|, \dots, |f(x_p)|, |f(+\infty)|\}$$

unde  $x_1, x_2, \dots, x_p$  sunt rădăcinile ecuației  $f'(x) = 0$ .

$$\text{În acest caz } f'(x) = 0 \Rightarrow 1 - nx^2 = 0 \Rightarrow x_1 = -\frac{1}{\sqrt{n}}; \quad x_2 = \frac{1}{\sqrt{n}}.$$

$$\left| f_n \left( \pm \frac{1}{\sqrt{n}} \right) \right| = \frac{1}{2\sqrt{n}}.$$

Atunci  $\|f_n\|_\infty = \frac{1}{2\sqrt{n}} \rightarrow 0$ . Deci, conform cu 2° iv),  $f_n(x) \xrightarrow[\mathbf{R}]{u} 0$ .

d)  $|f_n(x)| = |e^{-nx^2} \cdot \sin nx| \leq e^{-nx^2} \quad (\forall) x \in \mathbf{R}^*$ . Atunci  $\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = 0$ . Cum  $f_n(0) = 0$  rezultă că  $f_n(x) \xrightarrow[\mathbf{R}]{S} 0$ .

$$\sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x)| > e^{-\frac{1}{n}} \cdot \sin 1 > e^{-1} \cdot \sin 1 > 0. \quad \text{Deci } \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x)| \right) \neq 0. \quad \text{Așadar}$$

$f_n(x)$  nu converge uniform pe  $[0, 1]$ .

$$\text{Fie } a > 0 \text{ atunci } \sup_{|x| \geq a} |f_n(x)| < e^{-na^2} \rightarrow 0.$$

Deci  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sup_{|x| \geq a} |f_n(x)| = 0$ . Deci, conform cu 2° iv),  $f_n(x) \xrightarrow[A]{u} 0$  unde  $A = \{x \in \mathbf{R} \mid x \geq a\}$ .

**Exercițiul 5.6.2.** Fie  $f_n: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$  un șir de funcții definit astfel:

$$f_1(x) = \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} \text{ și } f_n(x) = f_1 \circ f_{n-1} \quad (\forall) n \geq 2.$$

Să se arate că  $f_n \xrightarrow[\mathbf{R}]{u} 0$ .

Rezolvare:

Din relația de recurență  $f_n(x) = \frac{f_{n-1}(x)}{\sqrt{1+f_{n-1}^2(x)}}$  se obține  $f_2(x) = \frac{x}{\sqrt{1+2x^2}}$ ,

$$f_3(x) = \frac{x}{\sqrt{1+3x^2}}, \dots,$$

Se presupune adevărat că  $f_n(x) = \frac{x}{\sqrt{1+nx^2}}$  și se demonstrează că

$$f_{n+1}(x) = \frac{x}{\sqrt{1+(n+1)x^2}}.$$

$$\begin{aligned} \text{Într-adevăr } f_{n+1}(x) &= \frac{f_n(x)}{\sqrt{1+f_n^2(x)}} = \frac{\frac{x}{\sqrt{1+nx^2}}}{\sqrt{1+\frac{x^2}{1+nx^2}}} = \\ &= \frac{x}{\sqrt{1+nx^2}} \cdot \frac{\sqrt{1+nx^2}}{\sqrt{1+(n+1)x^2}} = \frac{x}{\sqrt{1+(n+1)x^2}}. \end{aligned}$$

Așadar  $f_{n+1}(x) = \frac{x}{\sqrt{1+(n+1)x^2}}$  c.c.t.d.

Atunci conform inducției rezultă că  $f_n(x) = \frac{x}{\sqrt{1+nx^2}} \quad (\forall) n \geq 1$ .

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x}{\sqrt{1+nx^2}} = 0 \quad (\forall) x \in \mathbf{R}.$$

Așadar  $f_n(x) \xrightarrow[\mathbf{R}]{s} 0$ . Se cercetează dacă convergența este și uniformă.

$$\begin{aligned} f_n'(x) &= \left( \sqrt{1+nx^2} - \frac{x \cdot nx}{\sqrt{1+nx^2}} \right) \cdot \frac{1}{1+nx^2} = \frac{1+nx^2 - nx^2}{(1+nx^2)\sqrt{1+nx^2}} = \\ &= \frac{1}{(1+nx^2)\sqrt{1+nx^2}}. \end{aligned}$$

Deoarece  $f'_n(x) = 0$  nu are rădăcini, atunci  $\|f_n\|_\infty = \max\{f_n(+\infty), f_n(-\infty)\} = 0$ . Deci  $\lim_{n \rightarrow \infty} \|f_n\|_\infty = 0$  și atunci, conform cu 2° iv),  $f_n(x) \xrightarrow{\mathbf{R}} 0$ .

**Observație:**

Faptul că șirul  $f_n(x) = \frac{x}{\sqrt{1+nx^2}}$  converge uniform pe  $\mathbf{R}$  la 0 se poate arăta folosind Propoziția 5.1.2. Într-adevăr

$$|f_n(x)| = \frac{|x|}{\sqrt{1+nx^2}} \leq \frac{|x|}{|x| \cdot \sqrt{n}} = \frac{1}{\sqrt{n}} \rightarrow 0 \quad (\forall) x \in \mathbf{R}.$$

**Exercițiul 5.6.3.** Să se arate că șirul de funcții  $f_n : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ ;  $f_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin x}{n(n+1)}$  este uniform convergent pe  $[a, b]$  și funcția limită  $f(x)$  este o funcție uniform continuă.

Rezolvare:

Deoarece nu se poate determina funcția limită  $f(x)$  pentru a studia uniform convergența se utilizează Propoziția 5.1.1.

$$|f_{n+p}(x) - f_n(x)| = \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{\sin kx}{k(k+1)} \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} \left| \frac{\sin kx}{k(k+1)} \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{1}{k(k+1)} = \frac{1}{n+1} - \frac{1}{n+p} = \frac{n+p-1}{(n+1)(n+p)} < \frac{n+p}{(n+1)(n+p)} = \frac{1}{n+1} < \varepsilon \quad (\forall) n > [N(\varepsilon)] = \left\lceil \frac{1-\varepsilon}{\varepsilon} \right\rceil \text{ care este finit } (\forall) \varepsilon > 0.$$

Cum  $(\forall) \varepsilon > 0$  și  $(\forall) n > \left\lceil \frac{1-\varepsilon}{\varepsilon} \right\rceil$   $|f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \varepsilon$   $(\forall) p \in \mathbf{N}$  conform cu Propoziția 5.1.1 șirul  $f_n(x)$  este uniform convergent pe  $[a, b]$  către funcția  $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$ .

Cum funcțiile  $f_n(x) = \frac{\sin x}{n(n+1)}$  sunt continue pe  $[a, b]$ , atunci conform cu Propoziția 5.1.3, funcția  $f : [a, b] \rightarrow \mathbf{R}$  este continuă. Domeniul de definiție fiind compactul  $[a, b]$  ea este uniform continuă.

**Exercițiul 5.6.4.** Fie  $f_n : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ ,  $f_n(x) = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos k^2 x}{k^4}$ . Să se arate că șirul de funcții este uniform convergent către o funcție derivabilă  $f : \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ .

Rezolvare:

$$|f_{n+p}(x) - f_n(x)| = \left| \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{\cos k^2 x}{k^4} \right| \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{|\cos k^2 x|}{k^4} \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{1}{k^4} < \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{1}{k^2} \leq \sum_{k=n+1}^{n+p} \frac{1}{(k-1) \cdot k} = \frac{1}{n} - \frac{1}{n+p} < \frac{1}{n}$$

$$\frac{1}{n} < \varepsilon \quad (\forall) \varepsilon > 0 \text{ și } n > \left[ \frac{1}{\varepsilon} \right].$$

Deci  $|f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \varepsilon$ ,  $(\forall) \varepsilon > 0$  și  $(\forall) n > \left[ \frac{1}{\varepsilon} \right]$ .

Așadar, conform cu Propoziția 5.1.3 există o funcție  $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$  a.i.  $f_n(x) \xrightarrow[\mathbf{R}]{u} f(x)$ .

Funcțiile  $f_n(x) = \sum_{k=1}^n \frac{\cos k^2 x}{k^4}$  sunt derivabile și  $f'_n(x) = \sum_{k=1}^n \frac{\sin k^2 x}{k^2}$ .

În mod analog se arată că acest șir al derivatelor este, de asemenea, uniform convergent către o funcție  $q: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$ .

Conform cu Propoziția 5.1.4 funcția  $f: \mathbf{R} \rightarrow \mathbf{R}$  este derivabilă și  $f'(x) = q(x)$ .

**Exercițiul 5.6.5.** Să se determine mulțimea de convergență pentru următoarele serii de funcții:

a)  $\sum_{n=1}^{\infty} (2-x)(2-\sqrt{x}) \dots (2-\sqrt[n]{x}), \quad x > 0$

b)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(1+a^n)}{n^x}, \quad a > 0$

c)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+x^2)^\alpha}$

Rezolvare:

a) Pentru  $x=2$  seria este evident convergentă. Fie  $x > 0$  atunci  $\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{x} = 1$ . Deci există un rang  $N_0$  a.î.  $(\forall) n > N_0$  termenii seriei vor fi pozitivi.

Seria, deci, poate fi considerată ca serie cu termeni pozitivi. I se aplică acestei serii criteriul Rasle-Duhamel și se obține:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} n \left( \frac{f_n(x)}{f_{n+1}(x)} - 1 \right) = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n \left( x^{\frac{1}{n+1}} - 1 \right)}{2 - x^{\frac{1}{n+1}}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n}{n+1}$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{x^{\frac{1}{n+1}} - 1}{\frac{1}{n+1}} \cdot \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{2 - x^{\frac{1}{n+1}}} = \ln x.$$

Deci pentru  $\ln x > 1 \Leftrightarrow x \in (e, \infty)$  seria este convergentă. Pentru  $x = e$  seria este divergentă. Deci mulțimea de convergență a seriei este  $(e, \infty)$ .

b)

- Seria este evident o serie cu termeni pozitivi  $(\forall) x \in \mathbf{R}$  și  $a > 0$ . Folosind criteriul raportului se obține:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{f_{n+1}(x)}{f_n(x)} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n}{n+1} \right)^x \cdot \frac{\ln(1+a^{n+1})}{\ln(1+a^n)} = a.$$

- Dacă  $a < 1$ . Deci pentru  $a \in (0,1)$  seria este convergentă  $(\forall) x \in \mathbf{R}$ .

Pentru  $a = 1$  seria este  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln 2}{n^x}$  care este convergentă oricare ar fi  $n > 1$ .

- Pentru  $a > 1$  are loc egalitatea

$$\frac{\ln(1+a^n)}{n^x} = \frac{\ln a^n \left(1 + \frac{1}{a^n}\right)}{n^x} = \frac{\ln a}{n^{x-1}} + \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{a^n}\right)}{n^x}.$$

$$\text{Deci } \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(1+a^n)}{n^x} = \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln a}{n^{x-1}} + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{a^n}\right)}{n^x}.$$

Ținând cont de seria lui Reimann, seria  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln a}{n^{x-1}}$  este convergentă  $(\forall) x > 2$ .

Deoarece  $\frac{\ln\left(1 + \frac{1}{a^n}\right)}{n^x} < \frac{\ln 2}{n^x}$  seria  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln\left(1 + \frac{1}{a^n}\right)}{n^x}$  este convergentă pentru  $x > 1$ .

Deci pentru  $x > 2$  seria  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(1+a^n)}{n^x}$  este convergentă pentru  $(\forall) a > 1$ .

c) Se observă că seria  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+x^2)^\alpha}$  este o serie cu termeni pozitivi  $(\forall) x \in \mathbf{R}$ .

Folosind al treilea criteriu al comparației se obține:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^\alpha}{(x^2+n)^\alpha} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{n}{n+x^2} \right)^\alpha = 1, (\forall) x \in \mathbf{R}.$$

Deci  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}$  și  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+x^2)^\alpha}$  au aceeași natură  $(\forall) x \in \mathbf{R}$ .

Așadar, pentru  $\alpha > 1$  seria  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+x^2)^\alpha}$  este convergentă ( $\forall x \in \mathbf{R}$ ). Iar pentru  $\alpha \leq 1$  seria de funcții  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{(n+x^2)^\alpha}$  are mulțimea de convergență vidă.

**Exercițiul 5.6.6.** Se consideră seria de funcții  $1 + \sum_{n=1}^{\infty} (x^n - x^{n-1})$ . Să se determine mulțimea de convergență a seriei și să se arate că mulțimea  $\left[0, \frac{1}{2}\right]$  este o mulțime de uniform convergență.

Rezolvare:

Termenul general al șirului sumelor parțiale al seriei  $1 + \sum_{n=1}^{\infty} (x^n - x^{n-1})$  este

$$S_n = 1 + \sum_{k=1}^n (x^k - x^{k-1}) = x^n. \text{ Cum } \lim_{n \rightarrow \infty} S_n = \begin{cases} 0, & x \in (-1, 1) \\ 1, & n = 1 \\ \infty, & x > 1 \\ \text{nu exista pentru } & x \leq -1 \end{cases}$$

Deci mulțimea de convergență a seriei este  $(-1, 1]$ .

Din cele arătate anterior, rezultă că  $1 + \sum_{n=1}^{\infty} (x^n + x^{n-1}) \xrightarrow[S \left[0, \frac{1}{2}\right]]{S} 0$ . Deci

$f: \left[0, \frac{1}{2}\right] \rightarrow \mathbf{R}$   $f(x) = 0$  este suma seriei.

Din  $|S_n - 0| < \varepsilon \Leftrightarrow x^n < \varepsilon$  ( $\forall \varepsilon > 0$ ) se obține  $N(\varepsilon, x) = \left[\frac{\ln \varepsilon}{\ln x}\right]$ .

Se observă că mulțimea  $\left\{N(\varepsilon, x) \mid x \in \left[0, \frac{1}{2}\right], \varepsilon > 0\right\}$  este mărginită de 0 și

$\left[\frac{\ln \varepsilon}{\ln 0,5}\right]$ . Deci conform Propoziției 5.2.2 rezultă că  $1 + \sum_{n=1}^{\infty} (x^n + x^{n-1}) \xrightarrow[S \left[0, \frac{1}{2}\right]]{u} 0$ .

**Exercițiul 5.6.7.** Să se determine mulțimea de convergență a următoarelor serii de puteri:

a)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{1+\frac{1}{n}}}{\left(n + \frac{1}{n}\right)^n} \cdot x^n$

b)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{2n}}{(n^2 + 1)^n} \cdot \cos^n \frac{2n\pi}{3} \cdot x^n$



$$c) \sum_{n=1}^{\infty} \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n^2} \cdot x^n$$

Rezolvare:

$$a) \sup \sqrt[n]{|a_n|} = \sup \sqrt[n]{\frac{n^{1+\frac{1}{n}}}{\left(n + \frac{1}{n}\right)^n}} = \sup \frac{n \cdot \sqrt[n]{n}}{n + \frac{1}{n}} = \sup \frac{\sqrt[n]{n}}{1 + \frac{1}{n^2}} = \frac{\sqrt[n]{n}}{1 + \frac{1}{n^2}}.$$

$\omega = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = 1 \Rightarrow R = 1$ . Deoarece conform cu Observația 5.3.3

$$R = \frac{1}{\omega}.$$

Din seria dată pentru  $x=1$  și  $x=-1$  se obțin seriile  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{n+\frac{1}{n}}}{\left(n + \frac{1}{n}\right)^n}$ ,

$$\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \frac{n^{n+\frac{1}{n}}}{\left(n + \frac{1}{n}\right)^n}.$$

Datorită faptului că

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^{n+\frac{1}{n}}}{\left(n + \frac{1}{n}\right)^n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} \left( \frac{n}{n + \frac{1}{n}} \right)^n = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n} \left( \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n^2}\right)^{n^2}} \right)^{\frac{1}{n}} = 1 \cdot \left(\frac{1}{e}\right)^0 = 1,$$

rezultă că seriile nu sunt convergente. Deci mulțimea de convergență a seriei este  $(-1, 1)$ .

$$b) \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{n^{2n}}{n^2 + 1} \cdot \left| \cos \frac{2n\pi}{3} \right|.$$

Cum  $\left| \cos \frac{6n\pi}{3} \right| = 1$  și  $\left| \cos \frac{2(3n+1)\pi}{3} \right| = \left| \cos \frac{2(3n+2)\pi}{3} \right| = \frac{1}{2}$  (s-au folosit schimbările de funcție  $n \rightarrow 3n$ ,  $n \rightarrow 3n+1$ ,  $n \rightarrow 3n+2$ ) se obține

$$\sup \sqrt[n]{|a_n|} = \frac{n^{2n}}{n^2 + 1}.$$

Deci  $\omega = \limsup_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{|a_n|} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n^2}{n+1} = 1$ . Atunci  $R = \frac{1}{\omega} = 1$ .

Pentru  $x = 1$  și  $x = -1$  se obțin seriile numerice  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n^{2n}}{(n^2+1)^n} \cdot \cos^n \frac{2n\pi}{3}$  și  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{n^{2n}}{(n^2+1)^n} \cdot \cos^n \frac{2n\pi}{3}$ .

Se observă că șirul  $a_n = \frac{n^{2n}}{(n^2+1)^n} \cdot \cos^n \frac{2n\pi}{3}$  nu este convergent deoarece  $a_{3n} \rightarrow 1$  și  $a_{3n+1} \rightarrow 0$ .

Într-adevăr:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{3n} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(3n)^{6n}}{[(3n)^2+1]^{3n}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{m^{2m}}{(m^2+1)^m} = \lim_{n \rightarrow \infty} \left[ \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{m^2}\right)^m} \right]^{\frac{1}{m}} = \left(\frac{1}{e}\right)^0 = 1$$

( $m = 3n$ )

$$\lim_{n \rightarrow \infty} a_{3n+1} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(3n+1)^{2(3n+1)}}{[(3n+1)^2+1]^{3n+1}} \cdot \frac{1}{2^{3n+1}} = \lim_{p \rightarrow \infty} \frac{p^{2p}}{(p^2+1)^{p^2}} \cdot \frac{1}{2^p} = 1 \cdot 0 = 0$$

( $p = 3n+1$ )

Cum termenul general al celor două serii nu are limită, rezultă că seriile sunt divergente. Deci mulțimea de convergență a seriei de puteri este  $(-1, 1)$ .

$$c) \omega = \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{-n^2}} = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^n} = \frac{1}{e}$$

$$R = \frac{1}{\omega} = e$$

Pentru  $x = -e$  și  $x = e$  se obțin seriile  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}}$ ,  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{e^n}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}}$ ,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^n}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}} = \frac{e^n}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}} = \left(\frac{e^{\frac{1}{n}}}{1 + \frac{1}{n}}\right)^{n^2}. \text{ Se consideră funcția } f(x) = \left(\frac{e^x}{1+x}\right)^{\frac{1}{x^2}}$$

Se calculează:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left(\frac{e^x}{1+x}\right)^{\frac{1}{x^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left[ \left(1 + \frac{e^x - x - 1}{1+x}\right)^{\frac{1+x}{e^x - x - 1}} \right]^{\frac{e^x - x - 1}{(1+x)x^2}}$$

(1)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - x - 1}{x^2 + x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x - 1}{2x + 3x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^x}{2 + 6x} = \frac{1}{2}$$

(2)

Din (1) și (2)  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x) = \sqrt{e}$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{e^n}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}} = \lim_{x \rightarrow \infty} f\left(\frac{1}{n}\right) = \sqrt{e}$$

Așadar seria  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{e^n}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}}$  este divergentă.

Dacă se consideră  $x_n = \frac{(-1)^n \cdot e^n}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}} \Rightarrow x_{2n} \rightarrow \sqrt{e}$  și  $x_{2n+1} \rightarrow -\sqrt{e}$ . Atunci

seria  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(-1)^n \cdot e^n}{\left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2}}$  nu este convergentă. Deci seria de puteri are mulțimea de

convergență  $(-e, e)$ .

**Exercițiul 5.6.8.** Să se determine raza de convergență și suma seriilor:

a)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2n-1}, \quad |x| < 1$

b)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n-1}}{4n-1}, \quad |x| < 1$

c)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n-3}}{4n-3}, \quad |x| < 1$

Rezolvare:

a)  $a_n = \frac{1}{2n-1}, \quad R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{2n+1}{2n-1} = 1$ . Seria este uniform convergentă pe intervalul  $[0, x] \subset (-1, 1)$ .

Se consideră seria geometrică  $\sum_{n=1}^{\infty} t^{2n-2} \quad t \in [0, x]$  care, de asemenea, este uniform convergentă și se poate integra termen cu termen.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{2n-1}}{2n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x t^{2n-2} dt = \int_0^x \frac{dt}{1-t^2} = \frac{1}{2} \ln \frac{1-x}{1+x}$$

b)  $a_n = \frac{1}{4n-1}, \quad R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n+3}{4n-1} = 1$ .

Seria  $\sum_{n=1}^{\infty} t^{4n-2}$  este uniform convergentă pe intervalul  $[0, x] \subset (-1, 1)$  și se poate integra termen cu termen și astfel se obține:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n-1}}{4n-1} = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x t^{4n-2} dt = \int_0^x \frac{t^2 dt}{1-t^4} = \frac{1}{2} \int_0^x \left( \frac{1}{1-t^2} - \frac{1}{1+t^2} \right) dt = \frac{1}{4} \ln \frac{1-x}{1+x} - \frac{1}{2} \operatorname{arctg} x$$

c)  $a_n = \frac{1}{4n-3}, R = \lim_{n \rightarrow \infty} \left| \frac{a_n}{a_{n+1}} \right| = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{4n+1}{4n-3} = 1.$

Seria  $\sum_{n=1}^{\infty} t^{4n-4}$  este uniform convergentă pe intervalul  $[0, x] \subset (-1, 1)$  și se integrează termen cu termen.

$$\sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n-3}}{4n-3} = \sum_{n=1}^{\infty} \int_0^x t^{4n-4} dt = \frac{1}{2} \int_0^x \left( \frac{1}{1+t^2} - \frac{1}{1-t^2} \right) dt = \frac{1}{4} \ln \frac{1-x}{1+x} + \frac{1}{2} \operatorname{arctg} x.$$

**Exercițiul 5.6.9.** Să se determine mulțimea de convergență și suma următoarelor serii de puteri:

a)  $\sum_{n=1}^{\infty} n^2 \cdot x^n$

b)  $\sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n}}{(4n)!}$

c)  $\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2)(n+1) \cdot x^n$

**Rezolvare:**

a) Se observă că  $M_c = (-1, 1)$ . Se consideră seria geometrică  $\sum_{n=1}^{\infty} x^n$  care este uniform convergentă pe  $(-1, 1)$  și se poate deriva termen cu termen.

$$\sum_{n=1}^{\infty} x^n = \frac{x}{1-x} \text{ se derivează egalitatea și se obține:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \cdot x^{n-1} = \frac{1}{(1-x)^2}. \text{ Se înmulțește această egalitate cu } x \text{ și se obține:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n \cdot x^n = \frac{x}{(1-x)^2}. \text{ Se derivează termen cu termen și se obține:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 \cdot x^{n-1} = \frac{1+x}{(1-x)^3}. \text{ Se înmulțește această egalitate cu } x \text{ și se obține:}$$

$$\sum_{n=1}^{\infty} n^2 \cdot x^n = \frac{x(1+x)}{(1-x)^3}.$$

b)  $M_c = \mathbf{R}$ . Se știe că:

$$e^x = 1 + \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} + \frac{x^5}{5!} + \frac{x^6}{6!} + \frac{x^7}{7!} + \frac{x^8}{8!} + \dots$$

$$e^{-x} = 1 - \frac{x}{1!} + \frac{x^2}{2!} - \frac{x^3}{3!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^5}{5!} + \frac{x^6}{6!} - \frac{x^7}{7!} + \frac{x^8}{8!} + \dots$$

$$\cos x = 1 - \frac{x^2}{2!} + \frac{x^4}{4!} - \frac{x^6}{6!} + \frac{x^8}{8!} + \dots$$

Se observă că:  $\frac{1}{4}(e^x + e^{-x} + 2\cos x) = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{4n}}{(4n)!}$ .

c)  $M_c = (-1, 1)$ .

Se știe că seria geometrică  $\sum_{n=0}^{\infty} x^{n+3}$  este uniform convergentă pe  $(-1, 1)$ .

$$\sum_{n=0}^{\infty} x^{n+3} = \frac{x^3}{1-x}. \text{ Se derivează termen cu termen și se obține:}$$

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+3) \cdot x^{n+2} = \frac{-2x^3 + 3x^2}{(1-x)^2}. \text{ Se derivează această egalitate termen cu}$$

termen și se obține:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+2)(n+3) \cdot x^{n+1} = \frac{2x^3 - 6 + 6xx^2}{(1-x)^3}. \text{ Se derivează termen cu termen și}$$

se obține:

$$\sum_{n=0}^{\infty} (n+1)(n+2)(n+3) \cdot x^n = \frac{6}{(1-x)^4}.$$

**Exercițiul 5.6.10.** Să se descompună în funcții simple funcția  $f(x) = \frac{x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 4x + 5}{(x-1)^6}$

Rezolvare:

Fie  $P(x) = x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 4x + 5$ . Folosind formula lui Taylor pentru polinoame se obține:

$$P(x) = P(1) + \frac{x-1}{1!} \cdot P'(1) + \frac{(x-1)^2}{2!} \cdot P''(1) + \frac{(x-1)^3}{3!} \cdot P'''(1) + \frac{(x-1)^4}{4!} \cdot P^{IV}(1)$$

$$P(1) = 15; P'(x) = 4x^3 + 6x^2 + 6x + 4; P'(1) = 20$$

$$P''(x) = 12x^2 + 12x + 6; P''(1) = 30; P'''(x) = 24x + 12; P'''(1) = 36$$

$$P^{IV}(x) = 24; P^{IV}(1) = 24$$

Ținând cont de acestea se obține:

$$P(x) = 15 + \frac{(x-1)}{1!} \cdot 20 + \frac{(x-1)^2}{2!} \cdot 30 + \frac{(x-1)^3}{3!} \cdot 36 + \frac{(x-1)^4}{4!} \cdot 24$$

$$P(x) = 15 + 20(x-1) + 15(x-1)^2 + 6(x-1)^3 + (x-1)^4$$

(1)

Ținând cont de egalitatea (1) se obține:

$$\frac{x^4 + 2x^3 + 3x^2 + 4x + 5}{(x-1)^6} = \frac{1}{(x-1)^2} + \frac{6}{(x-1)^3} + \frac{15}{(x-1)^4} + \frac{20}{(x-1)^5} + \frac{15}{(x-1)^6}$$

**Observație:**

Această modalitate de descompunere în fracții simple (în cazuri de acest tip) este mult mai comodă din punct de vedere al calculului, decât metoda clasică de descompunere.

**Exercițiul 5.6.11.** Să se dezvolte în serie de puteri funcțiile:

a)  $f(x) = \ln \sqrt{\frac{1+x}{1-x}}; \quad |x| < 1$

b)  $f(x) = \frac{3x}{x^2 + 5x + 6}; \quad x \in (-\infty, -3) \cup (-3, -2) \cup (-2, \infty)$

c)  $f(x) = \ln(x + \sqrt{1+x^2}); \quad x \in \mathbf{R}$

d)  $f(x) = \cos^4 x; \quad x \in \mathbf{R}$

e)  $f(x) = \sin^6 x + \cos^6 x; \quad x \in \mathbf{R}$

Rezolvare:

a)  $f'(x) = \frac{1}{1-x^2} = (1-x^2)^{-1} \quad |x| < 1.$

Dacă se înlocuiește  $-x^2 = t$  se obține

$$(1-x^2)^{-1} = (1+t)^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot t^n = \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n}.$$

Deci  $f'(x) = \sum_{n=0}^{\infty} x^{2n} \quad |x| < 1. \quad (1)$

Se știe că pentru  $|x| < 1$  seria  $\sum_{n=0}^{\infty} x^{2n}$  este uniform convergentă, deci se poate integra termen cu termen pe  $[0, x] \subset (-1, 1)$ .

Deci integrând egalitatea (1) se obține:

$$\ln \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} = \sum_{n=0}^{\infty} \int_0^x x^{2n} dx = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}, \quad |x| < 1$$

Așadar:  $\ln \sqrt{\frac{1+x}{1-x}} = \sum_{n=0}^{\infty} \frac{x^{2n+1}}{2n+1}$

b) Se observă că  $\frac{3x}{x^2 + 5x + 6} = \frac{9}{x+3} - \frac{6}{x+2}.$

Deci  $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$  unde  $f_1(x) = \frac{9}{x+3}, \quad f_2(x) = -\frac{6}{x+2}.$

$$f_1(x) = 3 \cdot \left(1 + \frac{x}{3}\right)^{-1}, \quad f_2(x) = -3 \cdot \left(1 + \frac{x}{2}\right)^{-1}.$$

Funcția  $f_1(x)$  se poate dezvolta în serie de puteri pentru  $|x| < 3$ , iar  $f_2(x)$  se poate dezvolta în serie de puteri pentru  $|x| < 2$ . Ținând cont de acestea,

rezultă că funcția  $f(x) = f_1(x) + f_2(x)$  este dezvoltabilă în serie de puteri pentru  $|x| < 2$ .

$$f_1(x) = 3 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^n}{3^n} \text{ și } f_2(x) = -3 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^n}{2^n}.$$

$$\text{Deci } \frac{3x}{x^2 + 5x + 6} = 3 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \left( \frac{1}{2^n} - \frac{1}{3^n} \right) \cdot x^n, \quad |x| < 2$$

$$c) f'(x) = -2 \cdot \frac{x+1}{x^2 + 2x + 2} = -2(x+1) \cdot \frac{1}{1+(x+1)^2}.$$

Se observă că funcția  $f_1(x) = \frac{1}{1+(n+1)^2}$  este dezvoltabilă în jurul punctului  $x_0 = -1$  pe orice interval  $[-1, x] \subset (-2, 0)$  și se obține  $f_1(x) = [1+(x+1)^2]^{-1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot (x+1)^{2n}$  pentru  $x \in (-2, 0)$ .

$$\text{Așadar se obține: } f'(x) = 2 \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot (1+x)^{2n+1}.$$

Integrând această egalitate pe intervalul  $[-1, x] \subset (-2, 0)$  se obține  $\ln \frac{1}{x^2 + 2n + 1} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot \frac{(x+1)^{2n+1}}{n+1}; \quad x \in (-2, 0)$ .

d) Deoarece  $\cos^4 x = \frac{3}{4} + \cos 2x + \frac{1}{4} \cos 4x$  se știe că:

$$\cos x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n}}{(2n)!!} \quad x \in \mathbf{R}.$$

De aici rezultă că:

$$\cos 2x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{4^n \cdot x^{2n}}{(2n)!!} \text{ și } \cos 4x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{16^n \cdot x^{2n}}{(2n)!!}.$$

Ținând cont de acestea se obține:

$$\cos^4 x = \frac{3}{4} + \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{4^{n+1} + 16^n}{4 \cdot (2n)!!} \cdot x^{2n} \quad x \in \mathbf{R}.$$

$$e) \text{ Deoarece } \cos^6 x + \sin^6 x = \frac{5}{8} + \frac{3}{8} \cdot \cos 4x \text{ și } \cos 4x = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{16^n \cdot x^{2n}}{(2n)!!}$$

$$\text{atunci } \cos^6 x + \sin^6 x = \frac{5}{8} + \frac{3}{8} \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{16^n \cdot x^{2n}}{(2n)!!}.$$

**Exercițiul 5.6.12.** Să se calculeze:

$$a) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4}$$

$$b) \lim_{x \rightarrow \infty} \left[ x - x^2 \cdot \ln \left( 1 + \frac{1}{x} \right) \right]$$

Rezolvare:

Dacă  $R_n(x)$  este restul de ordinul  $n$  din formula lui Taylor a funcției  $f(x)$  dezvoltată în jurul punctului  $x = a$  are loc relația  $\lim_{x \rightarrow a} \frac{R_n(x)}{(x-a)^n} = 0$

(1)

$$a) \cos x = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{24} + R_4^1(x)$$

(2)

$$e^{-\frac{x^2}{2}} = 1 - \frac{x^2}{2} + \frac{x^4}{8} + R_4^2(x)$$

(3)

Din (2) și (3) se obține:  $\frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4} = \frac{1}{24} - \frac{1}{8} + \frac{R_4^1(x)}{x^4} - \frac{R_4^2(x)}{x^4}$ . Atunci ținând cont de (1) se obține:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x - e^{-\frac{x^2}{2}}}{x^4} = -\frac{1}{12}.$$

b) Dacă se face substituția  $x = \frac{1}{t}$  se obține:

$$\lim_{x \rightarrow \infty} \left[ x - x^2 \ln \left( 1 + \frac{1}{x} \right) \right] = \lim_{t \rightarrow 0} \left( \frac{1}{t} - \frac{1}{t^2} \cdot \ln(1+t) \right) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t - \ln(1+t)}{t^2}$$

$$\ln(1+t) = t - \frac{t^2}{2} + R_2(t)$$

$$\text{Atunci } \lim_{t \rightarrow 0} \frac{t - \ln(1+t)}{t^2} = \frac{1}{2} + \lim_{t \rightarrow 0} \frac{R_2(t)}{t^2} = \frac{1}{2}.$$

**Exercițiul 5.6.13.** Să se calculeze cu patru zecimale exacte  $\int_0^1 e^{-x^2} dx$ .

Rezolvare:

Seria Mac-Laurin a funcției  $f(x) = e^{-\frac{x^2}{2}}$  este  $e^{-\frac{x^2}{2}} = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n}}{n!}$ .

Se integrează această egalitate pe intervalul  $[0, x] \subset \mathbf{R}$  și se obține:

$$\int_0^x e^{-x^2} dx = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{x^{2n+1}}{n!(2n+1)}.$$

Aici se consideră  $x = 1$  și se obține:

$$\int_0^1 e^{-x^2} dx = \sum_{n=0}^{\infty} (-1)^n \cdot \frac{1}{n!(2n+1)} = 1 - \frac{1}{3} + \frac{1}{10} - \frac{1}{42} + \frac{1}{216} - \frac{1}{1320} + \frac{1}{9360} - \frac{1}{75600} + \dots$$



Dacă se adună acești termeni eroarea făcută este mai mică decât  $\frac{1}{75600} < \frac{1,5}{105}$ .

Calculând suma acestor fracții prin lipsă și prin adaos la zecimala a cincea se obține:  $0,74681 < \int_0^1 e^{-x^2} dx < 0,74685$ .

Deci  $\int_0^1 e^{-x^2} dx < 0,7468\dots$ .

# CAPITOLUL VI

## FUNCȚII REALE ȘI FUNCȚII VECTORIALE

### 1. Limită. Definiții. Proprietăți generale

După cum se știe tipurile de funcții se clasifică după natura domeniului, respectiv codomeniului. În acest sens există următoarele tipuri de funcții:

#### Definiția 6.1.1.

a) Funcțiile  $f : X \subseteq \mathbb{R} \rightarrow Y \subseteq \mathbb{R}$  se numesc funcții reale de variabilă reală și au forma generală  $y = f(x)$ .

b) Funcțiile  $F : X \subseteq \mathbb{R} \rightarrow Y \subseteq \mathbb{R}^m$  se numesc funcții vectoriale din variabilă reală și au următoarea formă:  $F(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x))$  unde  $f_i(x)$ , oricare ar fi  $i = \overline{1, m}$  se numesc protecțiile funcției vectoriale  $F(x)$  și aceste protecții sunt funcții reale de variabilă reală.

c) Funcțiile  $f : X \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow Y \subseteq \mathbb{R}$  se numesc funcții reale de variabilă vectorială și au forma generală  $y = f(\bar{x}) = f(x_1, x_2, \dots, x_m)$ . Aceste funcții mai poartă denumirea de funcții de mai multe variabile.

d) Funcțiile  $F : X \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow Y \subseteq \mathbb{R}^p$  se numesc funcții vectoriale de variabilă vectorială și au forma  $F(\bar{x}) = (f_1(\bar{x}), f_2(\bar{x}), \dots, f_n(\bar{x}))$  unde  $\bar{x} = (x_1, x_2, \dots, x_m)$  iar funcțiile  $f_i(\bar{x})$ , oricare ar fi  $i = \overline{1, p}$  sunt funcții reale de variabilă vectorială.

Acestea sunt tipuri de funcții ce vor fi studiate în cele ce urmează din punct de vedere al limitei și continuității.

Cel mai general cadru în care poate fi definită noțiunea de limită este atunci când domeniul și codomeniul sunt înzestrate cu structura de spațiu topologic.

Cum spațiul metric și spațiul vectorial normat sunt spații topologice noțiunea de limită are sens și atunci când domeniul și codomeniul sunt înzestrate cu aceste structuri.

Limita unei funcții în punctul de acumulare  $x_0$  a lui  $X$  se definește după cum urmează:

#### Definiția 6.1.2. (Limita în spațiu topologic)

Fie  $f : X \rightarrow Y$ , unde  $(X, \tau_1)$  și  $(Y, \tau_2)$  sunt două spații topologice oarecare. Se spune că funcția  $f(x)$  are limita  $\ell$  în punctul  $x_0$  și se scrie  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$  dacă

pentru orice  $W$  vecinătate a lui  $\ell$ , există o vecinătate  $V$  a punctului  $x_0$ , astfel încât pentru orice  $x \neq x_0 \mid x \in V \cap X$ , rezultă  $f(x) \in W$ .

**Observația 6.1.1.** Ca noțiunea de limită definită de Definiția 6.1.2 să aibă sens (limita să fie unică) trebuie ca spațiile topologice  $(X, \tau_1)$  și  $(Y, \tau_2)$  să fie spații topologice separate.

c) Între domeniul de definiție  $X$  al tuturor funcțiilor din șir și mulțimea de convergență există relația  $M_C \subseteq X$ .

d) Punctul  $x_0 \in X$  dacă nu este un punct de convergență al șirului de funcții se numește punct de divergență al altui șir și mulțimea tuturor punctelor de divergență ale șirului de funcții se notează cu  $M_D$  și are relația  $M_D = X \setminus M_C$ .

**Definiția 6.1.3.** (Limita în spații metrice)

Fie  $f: X \rightarrow Y$  iar  $(X, d)$  și  $(Y, \rho)$  spații metrice. Funcția  $f(x)$  are limită  $\ell \in Y$  în punctul  $x_0$  și se scrie  $f(x) \rightarrow \ell$  sau  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$  dacă pentru orice  $\varepsilon > 0$ , există  $\delta(\varepsilon) > 0$  astfel încât pentru orice  $x \neq x_0 \mid d(x, x_0) < \delta(\varepsilon)$  rezultă  $\rho(f(x), \ell) < \varepsilon$ .

**Observația 6.1.2.**

a) Se știe că spațiul metric este un spațiu topologic separat, de aceea limita definită de Definiția 6.1.3 este unică, deci noțiunea este bine definită.

b) Dacă se particularizează metricile  $d$  și  $\rho$  se obțin diverse forme echivalente ale acestei definiții.

**Exemplu:**

1.  $X \subset \mathbb{R}$ ,  $Y \subset \mathbb{R}$   $d, \rho$  metrica euclidiană a lui  $\mathbb{R}$ , adică modulul, atunci Definiția 6.1.3 capătă forma cunoscută, adică:

$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$  dacă oricare ar fi  $\varepsilon > 0$ , există  $\delta(\varepsilon) > 0$ , astfel încât pentru orice  $x \in X \mid |x - x_0| < \delta(\varepsilon)$  rezultă  $|f(x) - \ell| < \varepsilon$ .

2. Definiția 6.1.3 dacă  $X \subseteq \mathbb{R}^m$  și  $Y \subseteq \mathbb{R}^p$  pentru cazurile:

a)  $p \geq 2$ ,  $m = 1$ ;

b)  $m \geq 2$ ,  $p = 1$ ;

are următoarele forme:

a) Funcția este de forma  $F: X \subseteq \mathbb{R} \rightarrow Y \subseteq \mathbb{R}^p$ ,  
 $F(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_p(x))$  și în acest caz definiția este:

$\lim_{x \rightarrow x_0} F(x) = \bar{L}$ ,  $\bar{L} = (\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_p)$  dacă  $(\forall) \varepsilon > 0$ ,  $(\exists) \delta(\varepsilon) > 0$  a.î.

$(\forall) x \neq x_0 \in X \mid |x - x_0| < \delta(\varepsilon)$  rezultă  $\sqrt{\sum_{k=1}^p (f_k(x) - \ell_k)^2} < \varepsilon$ .

b) Funcția este de forma  $f : X \subseteq \mathbb{R}^m \rightarrow Y \subseteq \mathbb{R}$  și în acest caz definiția este:

$\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} f(\bar{x}) = \ell$ , dacă  $(\forall) \varepsilon > 0$ ,  $(\exists) \delta(\varepsilon) > 0$  a.î.

$(\forall) \bar{x} \neq \bar{x}_0 \in X \mid \sqrt{\sum_{k=1}^m (x_k - x_{0k})^2} < \delta(\varepsilon)$  rezultă  $|f(\bar{x}) - \ell| < \varepsilon$ .

**Definiția 6.1.4.** (Limita în spațiu vectorial normat)

Fie  $f : X \rightarrow Y$  o funcție și  $(X, \|\cdot\|_1)$ ,  $(Y, \|\cdot\|_2)$  spații vectoriale normate. Se spune că funcția  $f$  are limita  $\ell \in Y$  în punctul  $x_0$  și se scrie  $f(x) \rightarrow \ell$  sau  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = \ell$  dacă oricare ar fi  $\varepsilon > 0$ , există  $\delta(\varepsilon) > 0$  astfel încât pentru orice  $x \neq x_0 \mid \|x - x_0\|_1 < \delta(\varepsilon)$  rezultă  $\|f(x) - \ell\|_2 < \varepsilon$ .

**Observația 6.1.3.**

a) Deoarece spațiile vectoriale normate sunt spații topologice separate, limita definită de Definiția 6.1.4 este unică. Particularizând normele  $\|\cdot\|_1$  și  $\|\cdot\|_2$  se obțin definiții echivalente cu Definiția 6.1.4.

b) Definițiile 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 sunt definiții echivalente, adică considerând-o pe una ca definiție, celelalte două devin propoziții care pot fi demonstrate.

În cele ce urmează se vor considera funcțiile vectoriale de variabilă vectorială, adică funcții de forma

$$F : X \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow Y \subseteq \mathbb{R}^m, F(\bar{x}) = (f_1(\bar{x}), f_2(\bar{x}), \dots, f_m(\bar{x}))$$

unde  $f_i : X \subseteq \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ;  $\bar{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ .

Dacă  $n = 1$  și  $m \geq 2$ , atunci se obțin funcții vectoriale de variabilă reală, care au forma  $F(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_m(x))$ ,  $x \in \mathbb{R}$ .

Dacă simultan  $n = 1$  și  $m = 1$  se obțin funcții reale de variabilă reală.

Deoarece mulțimea numerelor reale este o mulțime ordonată se poate stabili dacă  $x$  converge către punctul de acumulare  $x_0$ , crescător sau descrescător și astfel se poate defini limita la stânga, respectiv limita la dreapta în punctul  $x_0$  pentru funcția  $f : X \subseteq \mathbb{R} \rightarrow Y \subseteq \mathbb{R}$ .

**Observația 6.1.4.**

a) Definițiile limitei unei funcții într-un punct au fost date considerând limita  $\ell$ , cât și punctul  $x_0$  finite. Cea mai utilizată dintre cele trei definiții ale limitei funcției într-un punct este Definiția 6.1.3.

b) Pentru funcțiile vectoriale de variabilă vectorială, dacă se consideră metrică euclidiană a lui  $\mathbb{R}^n$ , respectiv  $\mathbb{R}^m$ , Definiția 6.1.3 are următoarea formă:

$$\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} F(\bar{x}) = \bar{L} \quad (\bar{L} = (\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_m))$$

dacă pentru orice  $\varepsilon > 0$ , există  $\delta(\varepsilon) > 0$ , astfel încât pentru orice  $\bar{x} \in X$  cu proprietatea că:

$$\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - x_{0i})^2} < \delta(\varepsilon) \text{ rezultă } \sqrt{\sum_{j=1}^m (f_j(\bar{x}) - \ell_j)^2} < \varepsilon$$

c) Definițiile 6.1.2, 6.1.3, 6.1.4 pot fi transpuse pentru funcțiile reale de variabilă reală și în cazul în care  $l = \infty$  sau  $x_0 = \infty$ ;  $l$  finit,  $x_0 = \infty$ ;  $x_0$  finit,  $l = \infty$ .

### Propoziția 6.1.1.

Fie  $f : X \subset \mathbb{R} \rightarrow Y \subset \mathbb{R}$  și  $x_0 \in X'$  un punct de acumulare al domeniului de definiție:

a) Dacă există  $l_s, l_d$  în punctul  $x_0$  pentru funcția  $f$  și  $l_s = l_d = l$  atunci funcția  $f$  are limită în punctul  $x_0$  și această limită are valoarea  $l$ .

b) Dacă funcția  $f$  are limită  $l$  în punctul  $x_0$  atunci există  $l_s$  și  $l_d$  și  $l_s = l_d = l$ .

Dacă se consideră  $f : X \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow Y \subset \mathbb{R}$  și  $\bar{x}_0 = (x_{01}, x_{02}) \in X'$ , atunci, spre deosebire de cazul când  $X \subset \mathbb{R}$  există o infinitate de posibilități ca punctul  $\bar{x} = (x_1, x_2)$  să convergă către punctul  $\bar{x}_0 = (x_{01}, x_{02})$ . Aceste posibilități sunt date de toate drumurile plane ce trec prin punctul  $\bar{x}_0 = (x_{01}, x_{02})$ .

### Propoziția 6.1.2.

Funcția  $f : X \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow Y \subset \mathbb{R}$  are limita în punctul  $\bar{x}_0 = (x_{01}, x_{02}) \in X'$  dacă și numai dacă pe orice drum ce trece prin acest punct, funcția  $f$  are limită și aceste limite sunt egale.

Folosind Propoziția 6.1.2 se poate arăta că o funcție nu are limită într-un punct ca în exemplul următor.

### Exemplu:

Fie  $f = f(x, y)$  și  $(x_0, y_0)$  punctul în care se pune problema limitei.

$y = g(x)$ ,  $y = h(x)$  curbe ce trec prin punctul  $(x_0, y_0)$ .

Dacă:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0 \\ y = g(x)}} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, g(x)) = l_1$$

și

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0 \\ y=h(x)}} f(x,y) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, h(x)) = \ell_2$$

și

$$\ell_1 \neq \ell_2$$

Atunci funcția  $f = f(x,y)$  nu are limită în punctul  $(x_0, y_0)$ .

**Propoziția 6.1.3. (limita funcțiilor vectoriale de variabilă vectorială)**

Fie  $F(\bar{x}) = (f_1(\bar{x}), f_2(\bar{x}), \dots, f_m(\bar{x}))$ ,  $\bar{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$  o funcție vectorială de variabilă vectorială.

Funcția  $F(\bar{x})$  are limita  $\bar{L} = (\ell_1, \ell_2, \dots, \ell_m)$  în punctul  $\bar{x}_0 = (x_{01}, x_{02}, \dots, x_{0n})$  dacă și numai dacă  $\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} f_j(\bar{x}) = \ell_j$ , oricare ar fi  $j = \overline{1, m}$ .

*Demonstrație:*

Într-adevăr, ținând cont de Definiția 6.1.4, punctul b) rezultă  $\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} F(\bar{x}) = \bar{L}$

dacă:

$$\left[ (\forall) \varepsilon > 0, (\exists) \delta(\varepsilon) > 0 \text{ a.î. } (\forall) \bar{x} \in X \left| \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - x_{0i})^2} < \delta(\varepsilon) \Rightarrow \sqrt{\sum_{j=1}^m (f_j(\bar{x}) - \ell_j)^2} < \varepsilon \right. \right]$$

Rezultă  $|f_j(\bar{x}) - \ell_j| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{m}} = \varepsilon'$ , oricare ar fi  $j = \overline{1, m}$ .

Dar, ținând cont de limita unei funcții reale de variabilă vectorială, rezultă  $\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} f_j(\bar{x}) = \ell_j$ ,  $j = \overline{1, m}$ .

Reciproca se demonstrează în mod analog.

**Observația 6.1.5.**

a) Funcția  $F(\bar{x})$  are limita  $\bar{L}$  în punctul  $\bar{x}_0$  dacă și numai dacă fiecare proiecție are limită în acel punct.

b) Ținând cont de Propoziția 6.1.3, dacă funcția  $F(\bar{x})$  are limită în punctul  $\bar{x}_0 = (x_{01}, x_{02}, \dots, x_{0n})$ .

Atunci are loc egalitatea

$$\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} F(\bar{x}) = \left( \lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} f_1(\bar{x}), \lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} f_2(\bar{x}), \dots, \lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} f_m(\bar{x}) \right).$$

c) Dacă funcțiile  $F(\bar{x})$  și  $G(\bar{x})$ ,  $\bar{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$  au limita în punctul  $\bar{x}_0 = (x_{01}, x_{02}, \dots, x_{0n})$ , atunci funcțiile  $F(\bar{x}) \pm G(\bar{x})$ ;  $\lambda \cdot F(\bar{x})$ ,  $\lambda \in \mathbb{R}$  au limită în  $\bar{x}_0$  și au loc egalitățile:

$$\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} (F(\bar{x}) \pm G(\bar{x})) = \lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} F(\bar{x}) \pm \lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} G(\bar{x}); \lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} \lambda \cdot F(\bar{x}) = \lambda \lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} F(\bar{x}).$$

Pentru înmulțire și împărțire nu există definiții deoarece aceste operații nu sunt definite în spații vectoriale.

Un rol deosebit din punct de vedere practic îl are limita unei funcții definită cu ajutorul șirurilor. Această problemă este rezolvată de următoarea propoziție:

**Propoziția 6.1.4.** Fie  $f : X \subset \mathbb{R}^p \rightarrow Y \subset \mathbb{R}^m$ . Condiția necesară și suficientă ca funcția  $F(\bar{x})$  să aibă limita  $\bar{L}$  în punctul  $\bar{x}_0 \in X'$  este: oricare ar fi  $(\bar{x}_n)_{n \geq 0} \mid \bar{x}_n \neq \bar{x}_0 ; \bar{x}_n \in X$  și  $\bar{x}_n \rightarrow \bar{x}_0$  să rezulte că șirul  $(F(\bar{x}_n))_{n \geq 0} \rightarrow L$  (unic).

*Demonstrație:*

În definiția dată de Observația 6.1.4, punctul b), dacă se înlocuiește

$$\bar{x} = (\bar{x}_1, \bar{x}_2, \dots, \bar{x}_p) \text{ cu } \bar{x}_n = (\bar{x}_{n1}, \bar{x}_{n2}, \dots, \bar{x}_{np})$$

și

$$F(\bar{x}) = (f_1(\bar{x}), f_2(\bar{x}), \dots, f_m(\bar{x})) \text{ cu } F(\bar{x}_n) = (f_1(\bar{x}_n), f_2(\bar{x}_n), \dots, f_m(\bar{x}_n))$$

se obține Propoziția 6.1.4.

### Observația 6.1.6.

Această propoziție se enunță mai general pentru funcții  $f : X \rightarrow Y$ ,  $X, Y$  organizate ca spații topologice.

### Algoritm pentru calculul limitelor pentru funcțiile reale de variabilă vectorială

Fără a afecta generalitatea problemei, se vor considera funcțiile reale de două variabile.

Pentru a studia existența limitei  $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y)$  și eventual a o determina să

procedeze astfel:

1<sup>o</sup> Se consideră fascicolul de drepte care trec prin punctul  $(x_0, y_0)$ . Acest fascicul are următoarea ecuație  $y = y_0 + m(x - x_0)$ ,  $m \in \mathbb{R}$ .

2<sup>o</sup> Se calculează  $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0 \\ (y=y_0+m(x-x_0))}} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y_0 + m(x - x_0)) = \ell(m)$ .

3<sup>o</sup> a) Dacă  $\ell = \ell(m)$ , adică limita depinde de parametrul  $m$ , funcția nu are limită în punctul  $(x_0, y_0)$ , conform cu Propoziția 6.1.2.

b) Dacă  $\ell = \text{ct.}$  (nu depinde de  $m$ ) funcția poate să aibă sau să nu aibă limită în punctul  $(x_0, y_0)$  conform Propoziția 6.1.2.

În cazul 3<sup>o</sup> b) studiul se continuă astfel:

4<sup>o</sup> Dacă funcția nu are limită, există cel puțin un drum de ecuație  $y = g(x)$  care trece prin punctul  $(x_0, y_0)$  și are loc relația:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} f(x, g(x)) \neq \ell$$

5<sup>0</sup> Dacă funcția are limită, ea nu poate fi decât constanta  $\ell$  și se demonstrează acest lucru folosind Definiția 6.1.3 particularizată la funcțiile reale de două variabile ( $p=2, n=1$ ) sau criteriile ale majorării.

Pentru calculul limitelor funcțiilor de mai multe variabile se poate folosi acest algoritm combinat cu tabelul limitelor fundamentale pentru funcții de mai multe variabile.

Acest tabel este următorul:

$$1^0 \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} \frac{\sin^m [f(x, y)]}{[f(x, y)]^m} = 1, \text{ dacă } \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = 0$$

$$2^0 \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} \frac{\operatorname{tg}^m [f(x, y)]}{[f(x, y)]^m} = 1, \text{ dacă } \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = 0$$

$$3^0 \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} \frac{\arcsin^m [f(x, y)]}{[f(x, y)]^m} = 1, \text{ dacă } \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = 0$$

$$4^0 \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} \frac{\operatorname{arctg}^m [f(x, y)]}{[f(x, y)]^m} = 1, \text{ dacă } \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = 0$$

$$5^0 \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} [1 + f(x, y)]^{\frac{1}{f(x, y)}} = e, \text{ dacă } \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = 0$$

$$6^0 \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} \frac{\ln(1 + \alpha f(x, y))}{f(x, y)} = \alpha, \text{ dacă } \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = 0$$

$$7^0 \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} \frac{a^{f(x, y)} - 1}{f(x, y)} = \ln a, \text{ dacă } \lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x, y) = 0$$

Tabelul se poate generaliza la funcții de trei sau mai multe variabile.

**Definiția 6.1.4.**  $\lim_{x \rightarrow x_0} \left[ \lim_{y \rightarrow y_0} f(x, y) \right]$  sau  $\lim_{y \rightarrow y_0} \left[ \lim_{x \rightarrow x_0} f(x, y) \right]$  se numesc **limite iterate**. Între limita funcției  $f(x, y)$  în punctul  $(x_0, y_0)$  și limitele iterate în acest punct există următoarea legătură:

**Propoziția 6.1.4.** Dacă există limita funcției într-un punct și una din limitele iterate în acest punct atunci acestea sunt egale.

## 2. Continuitatea

Noțiunea de continuitate a derivat din aspectul fizic sau geometric a numeroase procese practice. Astfel drumul parcurs de un proiectil în spațiu este o linie continuă. Din punct de vedere matematic noțiunea de continuitate a unei



funcții are sens (poate fi pusă) numai dacă domeniul și codomeniul funcției sunt organizate ca: spații topologice, spații metrice sau spații vectoriale normate.

În aceste cazuri noțiunea de continuitate este definită după cum urmează.

**Definiția 6.2.1. (continuitatea în spații topologice)** Fie  $(X, \tau_1)$  și  $(Y, \tau_2)$  spații topologice și  $f: X \rightarrow Y$  o funcție oarecare. Funcția  $f$  este continuă în punctul  $x_0 \in X$  dacă oricare ar fi  $W$  vecinătate a lui  $f(x_0) \in Y$ , există  $V$  vecinătate a lui  $x_0$  astfel încât  $f(V) \subseteq W$ .

Punctul  $x_0 \in X$  care satisface aceste proprietăți este punct de continuitate al funcției  $f(x)$ .

**Definiția 6.2.2. (continuitatea în spații metrice)** Fie  $(X, d)$  și  $(Y, \rho)$  spații metrice și  $f: X \rightarrow Y$  o funcție oarecare. Funcția  $f$  este continuă în punctul  $x_0 \in X$  dacă oricare ar fi  $\varepsilon > 0$ , există  $\delta(\varepsilon) > 0$  astfel încât pentru orice  $x \in X \mid d(x, x_0) < \delta(\varepsilon)$  rezultă  $\rho(f(x), f(x_0)) < \varepsilon$ .

**Definiția 6.2.3. (continuitatea în spații vectoriale normate)** Fie  $(X, \|\cdot\|_1)$  și  $(Y, \|\cdot\|_2)$  spații vectoriale normate și  $f: X \rightarrow Y$  o funcție oarecare. Funcția  $f$  este continuă în punctul  $x_0 \in X$  dacă oricare ar fi  $\varepsilon > 0$ , există  $\delta(\varepsilon) > 0$  astfel încât pentru orice  $x \in X \mid \|x - x_0\|_1 < \delta(\varepsilon)$  rezultă  $\|f(x) - f(x_0)\|_2 < \varepsilon$ .

**Observația 6.2.1.**

a) Spre deosebire de noțiunea de limită care are sens numai în punctele de acumulare ale domeniului de definiție, noțiunea de continuitate are sens, după cum se observă din cele trei definiții, numai în punctele domeniului de definiție.

b) Noțiunea de continuitate este o particularizare a noțiunii de limită. Particularizarea constă în faptul că limita  $\ell$  este înlocuită cu  $f(x_0)$ , iar  $x_0 \in X$ .

c) Cea mai des utilizată definiție a continuității este Definiția 6.2.2, această definiție pentru funcțiile vectoriale capătă următoarea formă:

Funcția  $F: X \subset \mathbb{R}^n \rightarrow Y \subset \mathbb{R}^m$ ,  $F(\bar{x}) = (f_1(\bar{x}), f_2(\bar{x}), \dots, f_m(\bar{x}))$  unde  $\bar{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$  este continuă în punctul  $\bar{x}_0 = (x_{01}, x_{02}, \dots, x_{0n}) \in X$  dacă oricare ar fi  $\varepsilon > 0$ , există  $\delta(\varepsilon) > 0$  astfel încât pentru orice

$$x \in X \mid \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - x_{0i})^2} < \delta(\varepsilon) \text{ rezultă } \sqrt{\sum_{j=1}^m (f_j(\bar{x}) - f_j(\bar{x}_0))^2} < \varepsilon.$$

**Propoziția 6.2.1.** Fie  $F : X \subset \mathbb{R}^n \rightarrow Y \subset \mathbb{R}^m$  o funcție vectorială de variabilă vectorială. Condiția necesară și suficientă ca funcția  $F(\bar{x})$  să fie continuă în punctul  $\bar{x}_0 \in X$  este ca orice proiecție a sa să fie continuă în acest punct.

*Demonstrație:*

Se consideră  $F(\bar{x}) = (f_1(\bar{x}), f_2(\bar{x}), \dots, f_m(\bar{x}))$  continuă în  $\bar{x}_0 = (x_{01}, x_{02}, \dots, x_{0n})$  și se demonstrează că  $f_j(\bar{x})$ ,  $j = \overline{1, m}$  sunt continue în  $\bar{x}_0$ .

Într-adevăr, ținând cont de observația 6.2.1 punctul b), rezultă  $F(\bar{x})$  continuă în  $\bar{x}_0$  dacă

$$\left[ (\forall) \varepsilon > 0, (\exists) \delta(\varepsilon) > 0 \text{ a.î. } (\forall) \bar{x} \in X \left| \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - x_{0i})^2} < \delta(\varepsilon) \Rightarrow \sqrt{\sum_{j=1}^m (f_j(\bar{x}) - f_j(\bar{x}_0))^2} < \varepsilon \right. \right]$$

rezultă

$$|f_j(\bar{x}) - f_j(\bar{x}_0)| < \frac{\varepsilon}{\sqrt{m}}, \text{ oricare ar fi } j = \overline{1, m}.$$

Dar ținând cont de continuitatea funcțiilor reale de variabilă vectorială, rezultă  $f_j(\bar{x})$  continuă în  $\bar{x}_0 \in X$ , oricare ar fi  $j = \overline{1, m}$ .

Reciproca se demonstrează în mod analog.

Ținând cont de definiția limitei și definiția continuității sunt evidente următoarele propoziții care au o mare utilitate practică în studiul continuității.

**Propoziția 6.2.2.** Fie  $f : X \rightarrow Y$  o funcție oarecare. Funcția  $f$  continuă în punctul  $x_0 \in X$  dacă și numai dacă  $\lim_{x \rightarrow x_0} f(x) = f(x_0)$ .

**Propoziția 6.2.3.** Fie  $f : X \rightarrow Y$  o funcție oarecare. Funcția  $f$  continuă în punctul  $x_0 \in X$  dacă și numai dacă pentru orice șir  $(x_n)_{n \geq 0} | x_n \in X, x_n \neq x_0, x_n \rightarrow x_0$  rezultă  $(f(x_n))_{n \geq 0}$  este șir convergent și are limita  $f(x_0)$ .

Pentru funcțiile de mai multe variabile există două tipuri de continuități, continuitate parțială și continuitate globală. Legătura dintre aceste tipuri de continuitate este dată în următoarele două propoziții.

**Propoziția 6.2.4.** Fie  $F : X \subset \mathbb{R}^n \rightarrow Y \subset \mathbb{R}$  o funcție reală de variabilă vectorială. Dacă funcția  $f$  este continuă în  $\bar{x}_0 \in X$ , atunci  $f$  este continuă în raport cu fiecare variabilă  $x_i$ ,  $i = \overline{1, n}$  în parte (continuă parțial).

*Demonstrație:*

Fie  $f$  continuă în  $\bar{x}_0 = (x_{01}, x_{02}, \dots, x_{0n})$ . Ținând cont de continuitatea funcțiilor reale de variabilă vectorială rezultă că pentru orice  $\varepsilon > 0$ , există

$\delta(\varepsilon) > 0$  astfel încât oricare ar fi  $\bar{x} \in X \left| \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - x_{0i})^2} < \delta(\varepsilon) \right.$  rezultă

$|f(\bar{x}) - f(\bar{x}_0)| < \varepsilon$ . Relația anterioară  $\sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - x_{0i})^2} < \delta(\varepsilon)$  este satisfăcută și de

$\bar{x}' = (x_1, x_{02}, \dots, x_{0n})$ . Dar această relație pentru  $\bar{x}'$  capătă următoarea formă: oricare ar fi  $x_1 \in pr_{0x_1} X$  verifică relația  $|x_1 - x_{01}| < \delta(\varepsilon)$  și  $|f(x_1, x_{02}, x_{03}, \dots, x_{0n}) - f(x_{01}, x_{02}, \dots, x_{0n})| < \varepsilon$ .

Deci rezultă că funcția  $f(\bar{x})$  este continuă în punctul  $x_0$  în raport cu variabila  $x_1$ .

În mod analog se demonstrează continuitatea cu  $x_2, x_3, \dots, x_n$ .

**Propoziția 6.2.5.** Dacă funcția  $F : X \subset \mathbb{R}^n \rightarrow Y \subset \mathbb{R}$  este continuă în punctul  $\bar{x}_0 \in X$  în raport cu fiecare dintre variabilele  $x_i, i = \overline{1, n}$  în parte nu se poate afirma nimic despre continuitatea globală a funcției în punctul  $\bar{x}_0$  (în raport cu ansamblul variabilelor).

*Demonstrație:*

Se consideră un contra exemplu, adică se alege o funcție care este continuă parțial în raport cu variabilele sale, dar care nu este continuă global. Fie

$$f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^4 \cdot y}{x^6 + y^3}; & x \cdot y \neq 0 \\ 0 & ; x \cdot y = 0 \end{cases} \text{ și se arată că deși în punctul } O(0,0)$$

este continuă, atât în raport cu  $x$ , cât și în raport cu  $y$  nu este continuă global în acest punct.

Într-adevăr:

$$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^4 \cdot y}{x^6 + y^3} = 0 \text{ și } f(0, y) = 0$$

rezultă  $f(x, y)$  este continuă în raport cu  $x$  în punctele  $(0, y), y \in \mathbb{R}$  deci și în  $(0, 0)$ .

$$\lim_{y \rightarrow 0} f(x, y) = \lim_{y \rightarrow 0} \frac{x^4 \cdot y}{x^6 + y^3} = 0 \text{ și } f(x, 0) = 0$$

rezultă  $f(x, y)$  este continuă în raport cu  $y$  în punctele  $(x, 0)$  oricare ar fi  $x \in \mathbb{R}$  deci și în  $(0, 0)$ .

$$\text{Dar } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0 \\ (x=y)}} f(x, y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3}{x^6 + x^3} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2 + 1} = 0$$

(1)

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0 \\ (y=x^2)}} f(x,y) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^6}{x^6 + x^6} = \frac{1}{2}$$

(2)

Din (1) și (2) rezultă că funcția  $f(x,y)$  nu are limită în punctul  $(0,0)$ , deci ea nu este continuă în acest punct în raport cu ansamblul variabilelor.

### Observația 6.2.2.

a) Ținând cont de Propozițiile 6.2.4 și 6.2.5 rezultă că pentru funcțiile reale de variabilă vectorială (funcțiile de mai multe variabile) există continuitate globală și continuitate parțială și că orice funcție continuă globală este continuă și parțial, dar reciproc nu.

b) Punctul  $\bar{x}_0$  care nu este punct de continuitate pentru funcția  $f$  se va numi punct de discontinuitate al acestei funcții.

c) Pentru funcțiile reale de variabilă reală există trei tipuri de discontinuități:

- discontinuitate de speța întâi;
- discontinuitate de speța a doua;
- discontinuitate de speța a treia;

Acestea se definesc astfel:

### Definiția 6.2.4.

a) Punctul  $x_0 \in X \subset \mathbb{R}$  este punct de discontinuitate de speța întâi pentru funcția  $f : X \subset \mathbb{R} \rightarrow Y \subset \mathbb{R}$  dacă există  $l_s, l_d$  finite și diferite sau  $l_s = l_d \neq f(x_0)$ .

b) Punctul  $x_0 \in X \subset \mathbb{R}$  este punct de discontinuitate de speța a doua pentru funcția  $f : X \subset \mathbb{R} \rightarrow Y \subset \mathbb{R}$  dacă  $l_s$  sau  $l_d$  au valori infinite.

c) Punctul  $x_0 \in X \subset \mathbb{R}$  este punct de discontinuitate de speța a treia pentru funcția  $f : X \subset \mathbb{R} \rightarrow Y \subset \mathbb{R}$  dacă  $l_s$  sau  $l_d$  nu există.

### Definiția 6.2.5. (prelungirea prin continuitate)

Fie  $f : X \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  și  $x_0$  punct de acumulare ce nu aparține lui  $X \subset \mathbb{R}$ .

Dacă  $y_0 = \lim_{x \rightarrow x_0} f(x)$  atunci funcția

$$\tilde{f}(x) = \begin{cases} f(x); & x \in X \\ y_0; & x = x_0 \end{cases}$$

se numește prelungirea prin continuitate în punctul  $x_0$  a funcției  $f(x)$ .

Pentru funcțiile reale de variabilă reală, pe lângă noțiunea de continuitate mai apare și noțiunea de continuitate uniformă care se definește după cum urmează:

### Definiția 6.2.5. (continuitatea uniformă)

Fie  $f : X \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ . Se spune că funcția  $f(x)$  este uniform continuă pe mulțimea  $X$  dacă: pentru orice  $\varepsilon > 0$ , există  $\delta(\varepsilon) > 0$  astfel încât  $|f(x'') - f(x')| < \varepsilon$ , pentru orice  $x', x'' \in X$   $|x'' - x'| < \delta(\varepsilon)$ .

**Observația 6.2.3.**

Dacă continuitatea este o noțiune punctuală, adică ea are sens într-un punct  $x_0 \in X$ , continuitatea uniformă este o proprietate globală, adică ea are sens sau se pune pe o întreagă mulțime  $X$ .

Fenomenele practice a căror modelare matematică conduce către funcții uniform continue sunt fenomene pentru care se poate asigura un proces de prognoză. De aceea, uniform continuitatea este foarte importantă.

În continuare se dau câteva proprietăți ale funcțiilor continue și uniform continue:

**Propoziția 6.2.6.**

Fie  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ .

a) dacă  $f$  este o funcție monotonă, atunci aceasta poate avea numai puncte de discontinuitate de speța I, și acestea formează o mulțime cel mult numărabilă;

b) dacă funcția  $f$  este continuă, atunci funcția  $f$  este mărginită și își atinge marginile.

**Propoziția 6.2.7.**

Fie  $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ . Dacă funcția  $f$  este continuă pe  $[a, b]$  atunci ea este uniform continuă pe  $[a, b]$ .

*Demonstrație:*

Se presupune că  $f$  nu este uniform continuă pe  $[a, b]$ . Deci  $(\exists)\varepsilon > 0$ ,  $(\forall)\delta(\varepsilon) > 0$  astfel încât  $(\exists)\xi', \xi'' \in [a, b]$   $|\xi' - \xi''| < \delta(\varepsilon)$  astfel încât

$$|f(\xi') - f(\xi'')| < \varepsilon$$

(1)

Dacă se consideră  $\delta(\varepsilon) = \frac{1}{n}$  și se dau lui  $n$  valorile 1,2,3,... se obțin două

șiruri  $(\xi'_n)_{n \geq 1}$  și  $(\xi''_n)_{n \geq 1}$  cu proprietatea că:  $\xi'_n, \xi''_n \in [a, b]$  și  $|\xi'_n - \xi''_n| < \frac{1}{n}$ ,  $n = 1, 2, 3, \dots$ . Deci șirurile sunt mărginite și conform lemei lui Cesaro există subșirurile convergente  $(\xi'_{n_p})$ ,  $(\xi''_{n_p})$  către aceeași limită  $\xi$  deoarece

$$|\xi'_{n_p} - \xi''_{n_p}| < \frac{1}{n}.$$

Deoarece  $f$  este continuă pe  $[a,b]$ , rezultă  $f(\xi'_{n_p}) \rightarrow f(\xi)$  și  $f(\xi''_{n_p}) \rightarrow f(\xi)$  adică  $|f(\xi'_{n_p}) - f(\xi''_{n_p})| < \varepsilon$ . Această inegalitate intră în contradicție cu egalitatea (1). Deci presupunerea că  $f(x)$  nu este uniform continuă pe  $[a,b]$  este falsă. Această propoziție se numește **Teorema lui Cantor**.

**Observația 6.2.4.**

Ținând cont de definiția celor două noțiuni rezultă că, continuitatea uniformă implică continuitatea, dar reciproca nu este general valabilă. Propoziția 6.2.7 pune în evidență condițiile particulare în care și reciproca este adevărată.

**Definiția 6.2.7.** Fie  $f : X \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție reală de variabilă reală, astfel încât pentru orice  $x', x'' \in X$ , există  $M > 0$  astfel încât  $|f(x'') - f(x')| < M|x'' - x'|$ , atunci funcția  $f$  se numește funcție de tip Lipschitz sau o funcție lipschitziană.

**Propoziția 6.2.8.** Orice funcție lipschitziană este o funcție uniform continuă.

*Demonstrație:*

Într-adevăr, în definiția uniform continuității, dacă se alege  $\delta(\varepsilon) = \frac{\varepsilon}{M}$ , pentru orice  $\varepsilon > 0$  atunci din condiția Lipschitz se obține că  $|f(x'') - f(x')| < M \frac{\varepsilon}{M} = \varepsilon$  rezultă

$$\left[ |x'' - x'| < \delta(\varepsilon) = \frac{\varepsilon}{M} \Rightarrow |f(x'') - f(x')| < \varepsilon \right]$$

relație care definește uniform continuitatea.

**Propoziția 6.2.9.** Fie  $f : [a,b] \rightarrow \mathbb{R}$  dacă:

- 1<sup>o</sup>  $f$  continuă;
- 2<sup>o</sup>  $f(a) \cdot f(b) < 0$

Atunci există  $x_0 \in [a,b]$  astfel încât  $f(x_0) = 0$ .

**Propoziția 6.2.10.** Dacă  $f$  este o funcție continuă pe intervalul compact  $[a,b]$  atunci  $f$  are proprietatea lui Darboux.

*Demonstrație:*

Dup cum se știe, pentru a arăta că o funcție are proprietatea lui Darboux trebuie arătat că atunci când trece de la o valoare  $y_0$  la o valoare  $y_1$ , ia toate valorile cuprinse între  $y_0$  și  $y_1$  cel puțin o dată ( $y_0 < y_1$ ).

În condițiile Propoziției 6.2.10, ținând cont de Propoziția 6.2.6 punctul b), rezultă că există  $m_f$  și  $M_f$ . Deci în mod normal pentru a arăta că o funcție are proprietatea lui Darboux trebuie arătat că există  $x_0 \in [a, b]$  astfel încât  $f(x_0) = \alpha$ , oricare ar fi  $\alpha \in (m_f, M_f)$ .

Într-adevăr se consideră funcția  $g(x) = f(x) - \alpha$ . Cum funcția  $f$  este o funcție continuă pe  $[a, b]$ , rezultă  $g$  este continuă pe  $[a, b]$ .

Fie  $\xi', \xi'' \in [a, b]$  astfel încât  $m_f = f(\xi')$  și  $M_f = f(\xi'')$  puncte care există conform Propoziției 6.2.6 punctul b).

$$\text{Atunci } \left\{ \begin{array}{l} g(\xi') = f(\xi') - \alpha = m_f - \alpha < 0 \\ g(\xi'') = f(\xi'') - \alpha = M_f - \alpha < 0 \end{array} \right\} \Rightarrow g(\xi'), g(\xi'') < 0$$

Cum funcția  $g$  este continuă pe  $[a, b]$ , conform Propoziției 6.2.9 rezultă că există  $x_0 \in (\xi', \xi'')$  astfel încât  $g(x_0) = 0$ ;  $g(x_0) = f(x_0) - \alpha = 0$  rezultă  $f(x_0) = \alpha$ .

#### Observația 6.2.5.

a) Proprietatea lui Darboux nu este o proprietate caracteristică funcțiilor continue, adică există funcții care nu sunt continue, dar au proprietatea lui Darboux.

b) Dacă  $C^0[a, b]$  este mulțimea funcțiilor continue pe intervalul  $[a, b]$  și  $D[a, b]$  este mulțimea funcțiilor care au proprietatea lui Darboux pe  $[a, b]$ . Atunci are loc relația:

$$C^0[a, b] \subset D[a, b].$$

Definiția 6.2.6 poate fi generalizată și pentru funcțiile  $F: E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  astfel:

**Definiția 6.2.8.** Funcția  $F(\bar{x})$  este uniform continuă pe  $E$  dacă: pentru orice  $\varepsilon > 0$  există  $\delta(\varepsilon) > 0$  astfel încât oricare ar fi  $\bar{x}', \bar{x}'' \in E$ , cu  $\|\bar{x}' - \bar{x}''\| < \delta(\varepsilon)$ , să avem  $\|F(\bar{x}') - F(\bar{x}'')\| < \varepsilon$ .

**Propoziția 6.2.11.** Funcția vectorială de variabilă vectorială  $F: E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$  este uniform continuă pe  $E$  dacă și numai dacă toate proiecțiile sale  $f_i: E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $i = \overline{1, m}$  sunt uniform continue pe  $E$ .

*Demonstrație:*

Se folosesc inegalitățile evidente

$$\|f(\bar{x}') - f(\bar{x}'')\| \leq \|F(\bar{x}') - F(\bar{x}'')\| \leq \sum_{i=1}^n |f_i(\bar{x}') - f_i(\bar{x}'')|^2$$

**Propoziția 6.2.12.** Dacă  $F(\bar{x})$  este uniform continuă (în raport cu ansamblul variabilelor) pe  $E$  atunci ea este uniform continuă cu fiecare variabilă în parte  $x_i$  pe  $pr_{Ox_i} E$ ,  $i = \overline{1, n}$ .

Reciproca nu este în general valabilă.

*Demonstrație:*

Modul de raționare este cel din Propoziția 6.2.4 ținând cont de Definiția 6.2.8.

Pentru a arăta că reciproca nu este în general valabilă se folosește un contraexemplu.

Fie  $f : [-1, 1] \times [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$

$$f(x, y) = \begin{cases} \frac{xy}{x^2 + y^2}, & \text{dacă } x^2 + y^2 > 0 \\ 0, & \text{dacă } x^2 + y^2 = 0 \end{cases}$$

Fie  $(x_0, y_0) \in [-1, 1] \times [-1, 1]$  arbitrar dar fixat atunci funcțiile parțiale

$$f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}, f(x, y_0) = \frac{xy_0}{x^2 + y_0^2} \text{ și}$$

$$f : [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}, f(x_0, y) = \frac{x_0 y}{x_0^2 + y^2}$$

sunt uniform continue.

Dar  $f(x, y)$  nu este continuă în origine, deci nu este uniform continuă pe  $[-1, 1] \times [-1, 1]$ .

**Propoziția 6.2.13.** Fie  $F : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^m$ .

a) Dacă  $E$  este compactă și  $F$  este continuă pe  $E$  atunci  $F$  este mărginită.

b) Dacă  $E$  este compactă și  $F$  continuă pe  $E$  atunci  $F$  este uniform continuă pe  $E$ .

c) Dacă  $F$  continuă și  $E$  compactă, atunci  $F(E)$  este compactă.

*Demonstrație:*

Pentru demonstrațiile proprietăților a), b), c) se raționează ca la funcțiile reale de variabilă reală (înlocuind modulul cu norma euclidiană pe  $\mathbb{R}^n$  respectiv  $\mathbb{R}^m$ ).

**Observația 6.2.6.** Dacă funcția este reală de mai multe variabile atunci proprietatea a) din Propoziția 6.2.13 are următoarea formă:

O funcție reală de mai multe variabile continuă pe mulțimea compactă  $E \subset \mathbb{R}^n$  este mărginită și își atinge marginile.



**Propoziția 6.2.14.** Suma și produsul unui număr finit de funcții uniform continue este o funcție uniform continuă.

### 3. Exerciții rezolvate

**Exercițiul 6.3.1.** Să se calculeze următoarele limite:

$$\begin{aligned} \text{a) } \lim_{x \rightarrow 0} & \left[ \frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2 x}, \frac{(\sin x)^{\frac{\sin x}{x - \sin x}}}{x} \right] \\ \text{b) } \lim_{x \rightarrow 0} & \left[ \frac{e^{\sin 2x} - e^{\sin x}}{x}, \frac{\ln(1+x) - \ln(1-x)}{\arctg(1+x) - \arctg(1-x)} \right] \\ \text{c) } \lim_{x \rightarrow 1} & \left[ \frac{n \cdot x^{n+1} - (n+1)x^n + 1}{(x-1)^2}, \frac{x + x^2 + \dots + x^n - n}{x-1} \right] \\ \text{d) } \lim_{x \rightarrow a} & \left[ \frac{x^x - a^a}{x-a}, \frac{a^{a^x} - a^{a^a}}{x-a} \right], a > 0 \end{aligned}$$

Rezolvare:

Dacă  $F: X \subset \mathbb{R} \rightarrow Y \subseteq \mathbb{R}^2$  unde  $F(x) = (f_1(x), f_2(x))$  atunci

$$\lim_{x \rightarrow x_0} F(x) = \left( \lim_{x \rightarrow x_0} f_1(x), \lim_{x \rightarrow x_0} f_2(x) \right)$$

(1)

a) Ținând cont de (1)

$$\lim_{x \rightarrow 0} \left[ \frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2 x}, \frac{(\sin x)^{\frac{\sin x}{x - \cos x}}}{x} \right] = \left[ \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2 x}, \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(\sin x)^{\frac{\sin x}{x - \cos x}}}{x} \right]$$

Pentru a calcula  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2 x}$  se procedează astfel:

$$\frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2 x} = \frac{\sqrt[6]{\cos^3 x} - \sqrt[6]{\cos^2 x}}{\sin^2 x} = \frac{\cos^3 x - \cos^2 x}{\sin^2 x \cdot \bar{E}(x)} \quad (1)$$

unde  $\bar{E}(x) = \sqrt[6]{\cos^{15} x} + \sqrt[6]{\cos^{14} x} + \sqrt[6]{\cos^{13} x} + \sqrt[6]{\cos^{12} x} + \sqrt[6]{\cos^{11} x} + \sqrt[6]{\cos^{10} x}$ .

Este evident că  $\lim_{x \rightarrow 0} \bar{E}(x) = 6$

(2)

$$\text{Dar } \frac{\cos^3 x - \cos^2 x}{\sin^2 x \cdot \bar{E}} = \frac{\cos^2 x - (\cos x - 1)}{\sin^2 x \cdot \bar{E}} = \frac{-2 \cos^2 x \cdot \sin^2 \frac{x}{2}}{4 \sin^2 \frac{x}{2} \cdot \cos^2 \frac{x}{2} \cdot \bar{E}(x)} =$$

$$= -\frac{\cos^2 x}{2 \cos^2 \frac{x}{2} \cdot \bar{E}(x)}$$

(3)

Din (1) și (2) rezultă că:  $\frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2 x} = -\frac{\cos^2 x}{2 \cos^2 \frac{x}{2} \cdot \bar{E}(x)}$

Ținând cont de (2) rezultă că:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2 x} = -\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos^2 x}{2 \cos^2 \frac{x}{2} \cdot \bar{E}(x)} = -\frac{1}{12}$$

$$\begin{aligned} \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{\sin x}{x - \sin x}} &= \lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{1}{\frac{x}{\sin x} - 1}} = \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \left[ 1 + \left( \frac{\sin x}{x} - 1 \right) \right]^{\frac{1}{\frac{x}{\sin x} - 1}} \right\}^{\frac{\frac{x}{\sin x} - 1}{\frac{x}{\sin x} - 1}} = \\ &= \lim_{x \rightarrow 0} \left\{ \left[ 1 + \left( \frac{\sin x}{x} - 1 \right) \right]^{\frac{1}{\frac{x}{\sin x} - 1}} \right\}^{\frac{\sin x}{x}} = \frac{1}{e} \end{aligned}$$

Așadar  $\lim_{x \rightarrow 0} \left[ \frac{\sqrt{\cos x} - \sqrt[3]{\cos x}}{\sin^2 x}, \left( \frac{\sin x}{x} \right)^{\frac{\sin x}{x - \sin x}} \right] = \left( -\frac{1}{12}, \frac{1}{e} \right)$ .

b) Se procedează ca la punctul anterior și se calculează:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin 2x} - e^{\sin x}}{x} \quad \text{și} \quad \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - \ln(1-x)}{\arctg(1+x) - \arctg(1-x)}$$

$$\begin{aligned} \frac{e^{\sin 2x} - e^{\sin x}}{x} &= \frac{e^{\sin x} \cdot (e^{\sin 2x - \sin x} - 1)}{x} = e^{\sin x} \cdot \frac{e^{\sin 2x - \sin x} - 1}{\sin 2x - \sin x} \cdot \frac{\sin 2x - \sin x}{x} = \\ &= e^{\sin x} \cdot \frac{e^{\sin 2x - \sin x} - 1}{\sin 2x - \sin x} \cdot \frac{\sin x}{x} \cdot (2 \cos x - 1). \end{aligned}$$

Ținând cont de aceasta se obține:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{\sin 2x} - e^{\sin x}}{x} = \lim_{x \rightarrow 0} e^{\sin x} \cdot \frac{e^{\sin 2x - \sin x} - 1}{\sin 2x - \sin x} \cdot \frac{\sin x}{x} \cdot (2 \cos x - 1) = 1 \cdot \ln e \cdot 1 \cdot 1 = 1$$

$$\frac{\ln(1+x) - \ln(1-x)}{\arctg(1+x) - \arctg(1-x)} = \frac{\ln \frac{1+x}{1-x}}{\arctg \frac{2x}{2-x^2}} = \frac{\ln \left[ 1 + \frac{2x}{1-x} \right]}{\frac{2x}{1-x}} \cdot \frac{\frac{2x}{2-x^2}}{\arctg \frac{2x}{2-x^2}} \cdot \frac{2-x^2}{1-x}$$

Ținând cont de acestea se obține:

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x) - \ln(1-x)}{\operatorname{arctg}(1+x) - \operatorname{arctg}(1-x)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln\left(1 + \frac{2x}{1-x}\right)}{\frac{2x}{1-x}} \cdot \frac{\frac{2x}{2-x^2}}{\operatorname{arctg} \frac{2x}{2-x^2}} \cdot \frac{2-x^2}{1-x} = 1 \cdot 1 \cdot 2 = 2$$

Aşadar  $\lim_{x \rightarrow 0} \left( \frac{e^{\sin 2x} - e^{\sin x}}{x}, \frac{\ln(1+x) - \ln(1-x)}{\operatorname{arctg}(1+x) - \operatorname{arctg}(1-x)} \right) = (1, 2)$

c)

$$\bullet \frac{n \cdot x^{n+1} - (n+1) \cdot x^n + 1}{(x-1)^2} = \frac{n \cdot x^n (x-1) - (x^n - 1)}{(x-1)^2} = \frac{nx^n - x^{n-1} - x^{n-2} - x^{n-3} - \dots - x - 1}{x-1} =$$

$$= \frac{x^{n-1}(x-1) + x^{n-2}(x-1)(x+1) + x^{n-3}(x-1)(x^2+x+1) + \dots + (x-1)(x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + x + 1)}{x-1} =$$

$$= x^{n-1} + x^{n-2}(x+1) + x^{n-3}(x^2+x+1) + \dots + (x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + x + 1). \text{ Deci}$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{n \cdot x^{n+1} - (n+1)x^n + 1}{(x-1)^2} = \lim_{x \rightarrow 0} [x^{n-1} + x^{n-2}(x+1) \dots + (x^{n-1} + x + 1)] = 1 + 2 + 3 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

$$\bullet \frac{x + x^2 + \dots + x^n - n}{x-1} = \frac{(x-1) + (x-1)(x+1) + \dots + (x-1)(x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + x + 1)}{x-1} =$$

$$= 1 + (x+1) + \dots + (x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + x + 1).$$

Deci:

$$\lim_{x \rightarrow 1} \frac{x + x^2 + \dots + x^n - n}{x-1} = \lim_{x \rightarrow 1} (1 + (x+1) + \dots + (x^{n-1} + x^{n-2} + \dots + x + 1)) = 1 + 2 + \dots + n = \frac{n(n+1)}{2}$$

Aşadar

$$\lim_{x \rightarrow 1} \left( \frac{n \cdot x^{n+1} - (n+1)x^n + 1}{(x-1)^2}, \frac{x + x^2 + \dots + x^n - n}{x-1} \right) = \left( \frac{n(n+1)}{2}, \frac{n(n+1)}{2} \right).$$

$$d) \frac{x^x - a^a}{x-a} = \frac{x^x - x^a}{x-a} + \frac{x^a - a^a}{x-a}$$

(1)

$$\bullet \frac{x^x - a^a}{x-a} = x^a \cdot \frac{x^{x-a} - 1}{x-a} = x^a \frac{t}{\ln(1+t)} \cdot \ln x$$

(2)

unde  $t = x^{x-a} - 1$ .

$$\text{Deci } \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^x - x^a}{x - a} = \lim_{x \rightarrow a} (x^a \cdot \ln x) \cdot \lim_{t \rightarrow a} \frac{t}{\ln(1+t)} = a^a \cdot \ln a \quad (3)$$

$$\bullet \frac{x^x - a^a}{x - a} = \frac{e^{a \ln x} - e^{a \ln a}}{x - a} = a^a \frac{e^{a \ln x - a \ln a} - 1}{a \ln x - a \ln a} \cdot \frac{a \ln x - a \ln a}{x - a} = a^a \cdot \frac{e^{a \ln x - a \ln a} - 1}{a \ln x - a \ln a} \cdot a \frac{\ln \left(1 + \frac{x - a}{a}\right)}{x - a}$$

$$\text{Deci } \lim_{x \rightarrow a} \frac{x^x - x^a}{x - a} = a^a \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{e^{a \ln x - a \ln a} - 1}{a \ln x - a \ln a} \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{\ln \left(1 + \frac{x - a}{a}\right)}{\frac{x - a}{a}} = a^a \cdot 1 \cdot 1 = a^a \quad (4)$$

Din (1), (3) și (4) se obține:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{x^x - a^a}{x - a} = a^a \cdot \ln a + a^a = a^a (\ln a + 1) \quad (5)$$

$$\bullet \frac{a^{a^x} - a^{a^a}}{x - a} = a^{a^a} \cdot \frac{a^{a^x - a^a} - 1}{a^x - a^a} \cdot a^a \cdot \frac{a^{x-a} - 1}{x - a}$$

$$\text{Așadar } \lim_{x \rightarrow a} \frac{a^{a^x} - a^{a^a}}{x - a} = a^{a^a} \cdot a^a \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{a^{a^x - a^a} - 1}{a^x - a^a} \cdot \lim_{x \rightarrow a} \frac{a^{x-a} - 1}{x - a} = a^{a^a} \cdot a^a \cdot \ln^2 a \quad (6)$$

Ținând cont de (5) și (6) se obține:

$$\lim_{x \rightarrow a} \left( \frac{x^x - a^a}{x - a}, \frac{a^{a^x} - a^{a^a}}{x - a} \right) = \left( a^a \cdot (\ln a + 1), a^{a^a} \cdot a^a \cdot \ln^2 a \right).$$

### Exercițiul 6.3.2.

Să se cerceteze dacă funcțiile au limită în punctele specificate și în caz afirmativ să se calculeze:

a)  $f(x, y) = \frac{1}{x \cdot y} \cdot \operatorname{arctg} \frac{x+y}{1-xy}$ ;  $(x, y) = (0, 0)$

b)  $f(x, y) = \frac{1}{x \cdot y} \cdot \ln(1 + x^2 + y^2)$ ;  $(x, y) = (0, 0)$

c)  $f(x, y) = \frac{x^3 \cdot y^2}{x^4 + y^4}$ ;  $(x, y) = (0, 0)$

d)  $f(x, y) = \frac{y}{x} \cdot \operatorname{arctg} \frac{x+y}{1-xy}$ ;  $(x, y) = (0, 0)$

e)  $f(x, y) = \frac{\sqrt{x^2 \cdot y^2 + 1} - 1}{x^2 + y^2}$ ;  $(x, y) = (0, 0)$

f)  $f(x, y) = \frac{x^2 y}{x^2 + y^2}$ ;  $(x, y) = (0, 0)$

g)  $f(x, y) = \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2}$ ;  $(x, y) = (0, 0)$

$$h) f(x, y) = \frac{xy}{x^2 + y^2}; (x, y) = (0, 0)$$

$$i) f(x, y) = \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}; (x, y) = (0, 0)$$

Rezolvare:

a)  $y = mx$  este un fascicul de drepte ce trece prin punctul  $(0, 0)$ .

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{mx^2} \cdot \operatorname{arctg} \frac{(1+m)x}{1-mx^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\operatorname{arctg} \frac{(1-m)x}{1-mx^2}}{\frac{(1+m)x}{1-mx^2}} \cdot \frac{(1-m)x}{(1-mx^2) \cdot mx^2}.$$

Această limită nu există deoarece pentru funcția  $g(x) = \frac{1+m}{(1-mx^2) \cdot mx}$ ,

$\lim_{x \nearrow 0} g(x)$  și  $\lim_{x \searrow 0} g(x)$  sunt infinite și de semn contrar. Deci nu există

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{1}{xy} \cdot \operatorname{arctg} \frac{x+y}{1-xy}.$$

b) Se procedează analog ca la punctul a).

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{1}{mx^2} \cdot \ln \left[ 1 + (1+m^2) \cdot x^2 \right] = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln \left[ 1 + (1+m^2) \cdot x^2 \right]}{(1+m^2) \cdot x^2} \cdot \frac{(1+m^2) \cdot x^2}{mx^2} = \frac{1+m^2}{m}.$$

Deoarece această limită depinde de  $m$ , nu există  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{1}{xy} \cdot \ln(1+x^2+y^2)$ .

c) Ca și la punctele anterioare, se calculează

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{m^2 x^5}{(1+m^4)x^4} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{m^2 x}{1+m^4} = 0.$$

Dacă  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^3 \cdot y^2}{x^4 + y^4}$  există, ea nu poate fi decât 0. Dar este evident că

$$\left| \frac{x^3 \cdot y^2}{x^4 + y^4} \right| < \left| \frac{x^3 \cdot y^2}{2x^2 y^2} \right| = \frac{1}{2} |x| \rightarrow 0. \text{ Deci conform criteriului majorării } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^3 \cdot y^2}{x^4 + y^4} = 0.$$

$$d) \text{ Se observă că } f(x, y) = \frac{\operatorname{arctg} \frac{x+y}{1-xy}}{\frac{x+y}{1-xy}} \cdot \frac{y(x+y)}{x(1-xy)}.$$

$$\text{Se observă că } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\operatorname{arctg} \frac{x+y}{1-xy}}{\frac{x+y}{1-xy}} = 1 \quad (1)$$

Se cercetează dacă există  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{y(x+y)}{x(1-xy)}$ .

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{mx(x+mx)}{x(1-mx^2)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{mx(1+m)}{1-mx^2} = 0$$

(2)

Se consideră curba  $y = \sqrt{x}$  care trece prin  $(0,0)$  și

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = \sqrt{x}}} \frac{y(x+y)}{x(1-xy)} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x}(x+\sqrt{x})}{x(1-x\sqrt{x})} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sqrt{x}+1}{1-x\sqrt{x}} = 1 \quad (3)$$

Din (2) și (3) rezultă că nu există  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{y(x+y)}{x(1-xy)}$  (4)

Din (1) și (4) rezultă că nu există  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{y}{x} \cdot \operatorname{arctg} \frac{x+y}{1-xy}$ .

$$e) \frac{\sqrt{x^2 \cdot y^2 + 1} - 1}{x^2 + y^2} = \frac{x^2 \cdot y^2}{x^2 + y^2} \cdot \frac{1}{1 + \sqrt{x^2 \cdot y^2 + 1}}$$

(1)

$$\text{Cum } \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{1}{1 + \sqrt{x^2 \cdot y^2 + 1}} = \frac{1}{2} \quad (2)$$

Se cercetează dacă există  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 \cdot y^2}{x^2 + y^2}$ .

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 \cdot m^2 x^2}{x^2 + m^2 x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{m^2 x^4}{(1+m^2)x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{m^2 x^2}{1+m^2} = 0.$$

Dacă există această limită nu poate fi decât 0.

$$\frac{x^2 \cdot y^2}{x^2 + y^2} < \frac{x^2 \cdot y^2}{2|x \cdot y|} = \frac{1}{2}|x \cdot y| \rightarrow 0.$$

Deci conform criteriului majorării  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 \cdot y^2}{x^2 + y^2} = 0$

(3)

Din (1), (2) și (3) se obține  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sqrt{x^2 \cdot y^2 + 1} - 1}{x^2 \cdot y^2} = 0.$

$$f) \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 mx}{x^2 + m^2 x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot m}{1 + m^2} = 0$$

$$\left| \frac{x^2 \cdot y}{x^2 + y^2} \right| < \left| \frac{x^2 \cdot y}{2xy} \right| = \frac{1}{2}|x| \rightarrow 0.$$

Deci  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 \cdot y}{x^2 + y^2} = 0$ .

g)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^3 + m^3 x^3}{x^2 + m^2 x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x(1+m^3)}{1+m^2} = 0$

$$\left| \frac{x^2 + y^3}{x^2 + y^2} \right| = \frac{|x+y| |x^2 - xy + y^2|}{x^2 + y^2} \leq \frac{|x+y| [x^2 + y^2 + |xy|]}{x^2 + y^2} \leq \frac{3|x+y|(x^2 + y^2)}{2(x^2 + y^2)} = \frac{3}{2}|x+y| \rightarrow 0$$

Deci conform criteriului majorării  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^3 + y^3}{x^2 + y^2} = 0$ .

h)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x \cdot mx}{x^2 + m^2 x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{mx^2}{x^2(1+m^2)x^2} = \frac{m}{1+m^2}$ . Deci nu există  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x \cdot y}{x^2 + y^2}$ .

i)  $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 - m^2 x^2}{x^2 + m^2 x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(1-m^2)x^2}{x^2(1+m^2)x^2} = \frac{1-m^2}{1+m^2}$ .

Deci nu există  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}$ .

### Exercițiul 6.3.3.

Să se calculeze:

a)  $\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{x^2 + y^2}{x^4 + y^4}$ ;

b)  $\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{x+y}{x^2 - xy + y^2}$ ;

c)  $\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \left(1 + \frac{\alpha}{x}\right)^{\frac{x^2 \cdot y}{x+y}}$ ,  $\alpha > 0$

d)  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (1+xy)^{\frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}}$

Rezolvare:

a) Să se calculeze dacă există  $\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{x^2 + y^2}{x^4 + y^4}$ . Se face substituția  $u = \frac{1}{x}$  și

$v = \frac{1}{y}$  și atunci se obține  $\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{x^2 + y^2}{x^4 + y^4} = \lim_{\substack{u \rightarrow 0 \\ v \rightarrow 0}} \frac{u^2 v^2 (u^2 + v^2)}{u^4 + v^4}$ .

Se folosește fascicolul de dreapta  $v = mu$ .

$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{m^2 u^6 (1+m^2)}{u^4 + (1+m^4)} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{m^2 (1+m^2) \cdot u^2}{1+m^4} = 0.$$

Dacă există  $\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{x^2 + y^2}{x^4 + y^4}$  nu poate fi decât 0.

$$\frac{x^2 + y^2}{x^4 + y^4} < \frac{x^2 + y^2}{2x^2 y^2} = \frac{1}{2} \left( \frac{1}{x^2} + \frac{1}{y^2} \right) \xrightarrow[\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}]{} 0.$$

Conform criteriului majorării  $\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{x^2 + y^2}{x^4 + y^4} = 0.$

b) Se procedează ca la punctul a) și se obține  $u = \frac{1}{x}$ ;  $v = \frac{1}{y}$ .

$$\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{x+y}{x^2 + y^2 - xy} = \lim_{\substack{u \rightarrow 0 \\ v \rightarrow 0}} \frac{u \cdot v (u+v)}{u^2 - uv + v^2}.$$

Se folosește fascicolul de drepte  $v = mu$  și

$$\lim_{u \rightarrow 0} \frac{m(1+m)u^3}{(1+m^2-m)u^2} = \lim_{u \rightarrow 0} \frac{m(1+m)u}{1+m^2-m} = 0.$$

Dacă există  $\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{x+y}{x^2 + y^2 - xy}$  atunci aceasta nu poate fi decât 0.

$$\frac{x+y}{x^2 + y^2 - xy} < \frac{x+y}{|xy|} = \frac{\pm 1}{|x|} + \frac{\pm 1}{|y|} \xrightarrow[\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}]{} 0.$$

Conform criteriului majorării  $\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{x+y}{x^2 + y^2 - xy} = 0.$

$$c) \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \left(1 + \frac{\alpha}{x}\right)^{\frac{x^2 \cdot y}{x+y}} = \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \left[ \left(1 + \frac{\alpha}{x}\right)^{\frac{x}{\alpha}} \right]^{\frac{\alpha xy}{x+y}}.$$

Se notează  $f(x) = \left(1 + \frac{\alpha}{x}\right)^{\frac{x}{\alpha}}$  și  $g(x, y) = \frac{\alpha xy}{x+y}$ ,  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = e$ ;

Se cercetează dacă există  $\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{\alpha xy}{x+y}$ .

$$u = \frac{1}{x}; v = \frac{1}{y}.$$

$$\lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \frac{\alpha xy}{x+y} = \lim_{\substack{u \rightarrow 0 \\ v \rightarrow 0}} \frac{\alpha}{u+v} = \infty.$$

$$\text{Așadar } \lim_{\substack{x \rightarrow \infty \\ y \rightarrow \infty}} \left(1 + \frac{\alpha}{x}\right)^{\frac{x^2 \cdot y}{x+y}} = e^\infty = \infty.$$



$$d) \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (1+xy)^{\frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}} = \lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \left[ (1+xy)^{\frac{1}{xy}} \right]^{\frac{xy}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}}.$$

Se notează  $f(x,y) = (1+xy)^{\frac{1}{xy}}$  și  $g(x,y) = \frac{xy}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}$ . Cum  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x,y) = e$ .

Se cercetează dacă  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}$  există.

$$\left| \frac{xy}{\sqrt{x}+\sqrt{y}} \right| < \left| \frac{xy}{2\sqrt{xy}} \right| = \frac{1}{2} |xy|^{\frac{3}{2}} \xrightarrow[\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}]{} 0$$

Conform cu criteriul majorării  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{xy}{\sqrt{x}+\sqrt{y}} = 0$ .

Deci  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} (1+xy)^{\frac{1}{\sqrt{x}+\sqrt{y}}} = e^0 = 1$ .

#### Exercițiul 6.3.4.

Să se cerceteze continuitatea globală și continuitatea parțială a funcțiilor:

$$a) f(x,y) = \begin{cases} \frac{\sin x}{\sqrt{x^2+y^2}}; & (x,y) \neq (0,0) \\ \alpha & ; (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

$$b) f(x,y) = \begin{cases} \frac{\sin xy}{x^2+y^2}; & x \cdot y \neq 0 \\ \alpha & ; x \cdot y = 0 \end{cases}$$

$$c) f(x,y) = \begin{cases} \frac{x^2+y^2}{\sin xy}; & (x,y) \in \mathbb{R} \setminus Ox \cup Oy \\ \alpha & ; (x,y) \in Ox \cup Oy \end{cases}$$

#### Rezolvare:

Se știe că  $f(x,y)$  este continuă în punctul  $(x_0, y_0)$  dacă  $\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow y_0}} f(x,y) = f(x_0, y_0)$ ,  $(x_0, y_0)$  este punct al domeniului de definiție.

De asemenea, se știe că dacă o funcție  $f(x,y)$  este continuă într-un punct, ea este continuă parțial în acel punct dar reciproca nu este valabilă.

a) Se consideră fascicolul de drepte  $y = mx$  și se calculează  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y=mx}} \frac{\sin x}{\sqrt{x^2+y^2}} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{x\sqrt{1+m^2}} = \frac{1}{\sqrt{1+m^2}}$ . Deci nu există  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{\sin x}{\sqrt{x^2+y^2}}$ . Așadar funcția nu este continuă în  $(0,0)$ .

Se consideră funcția  $f(x,0) = \frac{\sin x}{|x|}$ ,  $\lim_{x \rightarrow 0} f(x,0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\sin x}{|x|} = 1$ .

Deci pentru  $\alpha = 1$  funcția  $f(x,y)$  este continuă parțial în raport cu  $x$  în punctul  $(0,0)$ .

Se consideră funcția  $f(0,y) = 0$ . Funcția  $f(x,y)$  este continuă parțial în raport cu  $y$  în punctul  $(0,0)$  pentru  $\alpha = 0$ .

b) Se consideră fascicolul de drepte  $y = mx$  și se calculează

$$\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y = mx}} \frac{\sin xy}{x^2 + y^2} = \frac{m}{1 + m^2}.$$

Deci nu există  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x,y)$ . Atunci această funcție nu poate fi continuă în  $(0,0)$ ,  $(\forall) \alpha \in \mathbb{R}$ .

Se observă că funcțiile  $f(x,0) = \alpha$  și  $f(0,y) = \alpha$ . Deci sunt continue în punctul  $(0,0)$ . Așadar pentru  $(\forall) \alpha \in \mathbb{R}$  funcția  $f(x,y)$  este continuă parțial în  $(0,0)$  atât cu variabila  $x$  cât și cu variabila  $y$ .

c) Fie  $y = mx$ ;  $m \neq 0$ .

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2(1+m^2)}{\sin mx^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{mx^2}{\sin mx^2} \cdot \frac{1+m^2}{m} = \frac{1+m^2}{m}.$$

Deci funcția  $f(x,y)$  nu are limită în  $(0,0)$ . Așadar  $f(x,y)$  nu este continuă în  $(0,0)$ ,  $(\forall) \alpha \in \mathbb{R}$ .  $f(x,0) = \alpha$  și  $f(0,y) = \alpha$ . Deci aceste funcții sunt continue în  $(0,0)$ , oricare ar fi  $\alpha \in \mathbb{R}$ . Așadar funcția  $f(x,y)$  este continuă parțial în  $(0,0)$ ,  $(\forall) \alpha \in \mathbb{R}$ .

În punctul  $(x_0,0)$  funcția  $f(x,y)$  nu este continuă deoarece

$$\lim_{\substack{x \rightarrow x_0 \\ y \rightarrow 0}} \frac{x^2 + y^2}{\sin xy} = \pm\infty. \text{ Analog funcția nu este continuă în punctul } (0, y_0).$$

Deci punctele de discontinuitate ale funcției sunt  $Ox \cup Oy$ .

Deoarece  $f(x,0) = \alpha$  este continuă în  $(x_0,0)$ ,  $(\forall) \alpha \in \mathbb{R}$  rezultă că funcția  $f(x,y)$  este continuă parțial în raport cu  $x$  pe mulțimea  $Ox \setminus \{(0,0)\}$ .

$\lim_{x \rightarrow 0} f(x, y_0) = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2 + y_0^2}{\sin y_0 x} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{(x^2 + y_0^2)}{y_0 x} \cdot \frac{y_0 x}{\sin y_0 x} = \pm\infty$ . Deci funcția  $f(x, y_0)$  nu este continuă în punctele  $(0, y_0)$ ,  $(\forall) \alpha \in \mathbb{R}$ .

Așadar funcția  $f(x,y)$  nu este continuă parțial în raport cu  $x$  pe mulțimea  $Ox \setminus \{(0,0)\}$ . Analog se studiază continuitatea parțială în raport cu  $y$ .

**Exercițiul 6.3.5.**

Să se studieze uniform continuitatea funcțiilor:

a)  $f : (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x}{x+1} + x;$

b)  $f : (-1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \frac{x}{x+1} + x;$

c)  $f : (0, 1) \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln x;$

d)  $f : [\varepsilon, e] \rightarrow \mathbb{R}, f(x) = \ln x, \varepsilon \in (0, e).$

Rezolvare:

a) Fie  $x_1, x_2 > 0$

$$\begin{aligned} |f(x_1) - f(x_2)| &= \left| \frac{x_1}{x_1+1} + x_1 - \frac{x_2}{x_2+1} - x_2 \right| = \left| (x_1 - x_2) + \frac{x_1 x_2 + x_1 - x_1 x_2 - x_2}{(x_1+1)(x_2+1)} \right| = \\ &= |x_1 - x_2| \left| 1 + \frac{1}{(x_1+1)(x_2+1)} \right| < 2|x_1 - x_2| = \delta. \end{aligned}$$

Dacă se consideră  $\delta = \frac{\varepsilon}{2}$  atunci  $(\forall) x_1, x_2 \in (0, \infty),$

$$|x_1 - x_2| < \frac{\varepsilon}{2} \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \varepsilon.$$

Deci  $f(x)$  este uniform continuă pe  $(0, \infty)$ , deși se observă că este nemărginită pe acest interval deoarece  $\lim_{x \rightarrow \infty} f(x) = +\infty.$

b) Fie  $x' = -\frac{n+2}{n+3}$  și  $x'' = -\frac{n+1}{n+2}.$

$$|x' - x''| = \frac{1}{(n+1)(n+2)}$$
 rezultă că  $x'$  și  $x''$  sunt suficient de apropiate

pentru  $n$  suficient de mare.

$$|f(x') - f(x'')| = 1 + \frac{1}{(n+1)(n+2)} > 1$$

Deci funcția  $f(x)$  nu este uniform continuă pe  $(-1, \infty).$

c) Fie  $x' = \frac{1}{e^n}, x'' = \frac{1}{e^{n+1}}, x', x'' \in (0, 1).$

$$|x' - x''| = \left| \frac{1}{e^n} - \frac{1}{e^{n+1}} \right| = \frac{e-1}{e^{n+1}}$$
 rezultă că  $x'$  și  $x''$  sunt suficient de apropiate

când  $n$  este suficient de mare.

$$|f(x') - f(x'')| = \left| \ln \frac{1}{e^n} - \ln \frac{1}{e^{n+1}} \right| = |-n + n + 1| = 1.$$
 Deci  $f(x)$  nu este uniform

continuă pe  $(0, 1).$

d) Este evident că  $f(x) = \ln x$  este continuă pe  $[\varepsilon, e], (\forall) \varepsilon \in (0, e).$

Deci  $f(x)$  este continuă pe intervalul compact  $[\varepsilon, e]$ . Conform cu Propoziția 6.2.7 funcția  $f(x)$  este uniform continuă.

**Exercițiul 6.3.6.**

Să se studieze uniform continuitatea funcției  $f : (0, \infty) \times (0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$ ,

$$f(x, y) = x + y + \frac{x + y + 2xy}{(x+1)(y+1)}.$$

Rezolvare:

Fie  $(x', y'), (x'', y'') \in (0, \infty) \times (0, \infty)$  cu proprietatea  $|x' - x''| < \delta$  și  $|y' - y''| < \delta$ .

Atunci:

$$\begin{aligned} |f(x', y') - f(x'', y'')| &= \left| x' + y' + \frac{x' + y' + 2x'y'}{(x'+1)(y'+1)} - x'' - y'' - \frac{x'' + y'' + 2x''y''}{(x''+1)(y''+1)} \right| \leq \\ &\leq |x' - x''| \left| 1 + \frac{1}{(x'+1)(y'+1)} \right| + |y' - y''| \cdot \left| \frac{1}{(x''+1)(y''+1)} \right| < 2|x' - x''| + 2|y' - y''| = 4\delta \end{aligned}$$

Luând  $\delta = \frac{\varepsilon}{4}$ , atunci  $(\forall)(x', y'), (x'', y'') \in (0, \infty) \times (0, \infty)$  cu proprietatea

$|x' - x''| < \delta$  și  $|y' - y''| < \delta \Rightarrow |f(x', y') - f(x'', y'')| < \frac{\varepsilon}{4}$  și funcția  $f(x, y)$  este uniform continuă pe  $(0, \infty) \times (0, \infty)$ .

# CAPITOLUL VII

## DERIVATA ȘI DIFERENȚIALA

### 1. Derivata

Pentru funcțiile reale de variabilă reală definiția derivatei, precum și formulele și regulile de derivare ca și unele proprietăți legate de derivată cum ar fi teoremele: FERMAT, ROLLE, CAUCHY, LAGRANGE, L'HOSPITAL se consideră cunoscute. În cazul acestor funcții se discută în continuare despre: derivata funcției compuse, derivata funcției inverse, teorema lui Darboux.

**Propoziția 7.1.1. (derivata funcției compuse pentru funcții reale de variabilă reală)**

Fie  $u : I \rightarrow J$ ,  $f : J \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $I, J$  - intervale de numere reale. Dacă funcția  $u$  este derivabilă în punctul  $x_0 \in I$  și  $f$  este derivabilă în punctul  $u(x_0) \in J$ .

Atunci funcția  $F : I \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $F(x) = f(u(x))$  este derivabilă în punctul  $x_0$  și are loc relația:  $F'(x_0) = f'(u(x_0)) \cdot u'(x_0)$ .

*Demonstrație:*

Știind că funcțiile  $u$  și  $f$  sunt derivabile în punctul  $x_0$  respectiv  $u_0 = u(x_0)$  conform definiției derivatei unei funcții reale de variabilă reală au loc relațiile:

$$u'(x_0) = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{u(x) - u(x_0)}{x - x_0} \quad \text{și} \quad \lim_{u \rightarrow u_0} \frac{f(u) - f(u_0)}{u - u_0} = f'(u_0).$$

Pentru a arăta că funcția  $F(x)$  este derivabilă în punctul  $x_0$  trebuie arătat că există și că este finită  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0}$ .

Într-adevăr

$$\frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} = \frac{f(u(x)) - f(u(x_0))}{u(x) - u(x_0)} \cdot \frac{u(x) - u(x_0)}{x - x_0}.$$

Trecând la limite și ținând de relațiile anterioare rezultă că există și este finită:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(u(x)) - f(u(x_0))}{u(x) - u(x_0)} \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{u(x) - u(x_0)}{x - x_0} = f'(u_0) \cdot u'(x_0)$$

(limitele din membrul drept există și sunt finite din ipoteză)

Așadar,

$$F'(x_0) = f'(u(x_0)) \cdot u'(x_0).$$

**Observația 7.1.1.**

Dacă funcția  $u$  este derivabilă în orice punct  $x \in I$  și funcția  $f$  este derivabilă în orice punct  $u(x) \in J$ , atunci funcția  $F(x)$  este derivabilă pe intervalul  $I$  și are loc egalitatea:

$$F'(x) = f'(u(x)) \cdot u'(x)$$

care constituie formula de derivare a funcțiilor compuse reale de variabilă reală.

**Propoziția 7.1.2. (derivata funcției inverse pentru funcții reale de variabilă reală).** Fie  $f : I \subset \mathbb{R} \rightarrow J \subset \mathbb{R}$ ,  $I, J$  - intervale. Dacă funcția  $f$  este bijectivă pe intervalul  $I$  și derivabilă în punctul  $x_0 \in I$  astfel încât  $f'(x_0) \neq 0$ , atunci există  $f^{-1} : J \rightarrow I$  derivabilă în  $y_0 = f(x_0)$  și are loc egalitatea

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

*Demonstrație:*

Funcția  $f$  este bijectivă  $\Leftrightarrow f$  este inversabilă. Există  $f^{-1} : J \rightarrow I$ . Cum  $f$  este derivabilă în  $x_0 \in I$  atunci  $f$  este continuă în acest punct, adică  $(\forall)$  șirul  $y_n \rightarrow y_0$  există șirul  $x_n \rightarrow x_0$  astfel încât  $y_n = f(x_n)$ . Deci  $x_n = f^{-1}(y_n)$ . Ținând cont de acestea rezultă că există și este finită  $\lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f^{-1}(y_n) - f^{-1}(y_0)}{y_n - y_0}$ . Deci

$$(f^{-1})'(y_0) = \frac{1}{f'(x_0)}.$$

**Observația 7.1.2.**

Dacă funcția  $f$  este derivabilă în orice punct  $x \in I$ , rezultă că funcția  $f^{-1}$  derivabilă în orice punct  $y = f(x) \in J$  și are loc egalitatea  $(f^{-1})'(y) = \frac{1}{f'(x)}$  care reprezintă formula de derivare a funcției inverse.

**Propoziția 7.1.3. (teorema lui Darboux)** Dacă funcția  $f(x)$  este funcție derivată, atunci funcția  $f$  are proprietatea lui Darboux.

*Demonstrație:*

Funcția  $f$  este funcție derivată dacă există o funcție derivabilă  $g : I \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  astfel încât  $g'(x) = f(x)$ .

Pentru a demonstra că funcția  $f$  are proprietatea lui Darboux trebuie arătat că oricare ar fi  $\alpha \in (f(a), f(b))$  există  $c_\alpha \in (a, b)$  astfel încât  $f(c_\alpha) = \alpha$ .

Deci după cum se observă, fără a micșora generalitatea, se consideră că dacă  $a < b$ ,  $a, b \in I$  și  $f(a) < f(b)$ .

Se consideră funcția  $h(x) = g(x) - \alpha \cdot x$ . Pentru că funcția  $g$  este o funcție derivabilă pe  $I$  rezultă  $h(x)$  este derivabilă pe  $I$  deci și pe intervalul  $[a, b]$  și are loc egalitatea  $h'(x) = g'(x) - \alpha$ , rezultă  $h'(x) = f(x) - \alpha$ .

Cum  $h$  este derivabilă pe intervalul  $[a, b]$  înseamnă că funcția  $h$  este continuă. Deci, dacă se consideră  $[a, b]$  ca domeniu de definiție al acestei funcții rezultă că funcția  $h$  este o funcție mărginită și își atinge marginile.

Se observă că  $h'(a) < 0$  și  $h'(b) > 0$ . Într-adevăr,  $h'(a) = f(a) - \alpha < 0$  și  $h'(b) = f(b) - \alpha > 0$ . Cum funcția este și o funcție continuă rezultă că aceste două proprietăți sunt valabile pe o vecinătate întreagă a punctului  $a$ , respectiv  $b$ .

Deci se poate afirma că există  $V \in \mathcal{D}(a)$  și  $W \in \mathcal{D}(b)$  astfel încât  $\frac{h(x) - h(a)}{x - a} < 0$ , pentru orice  $x \in V \cap [a, b]$  și  $\frac{h(x) - h(b)}{x - b} > 0$ , oricare ar fi  $x \in W \cap [a, b]$ .

$$\text{Dar } \begin{cases} x - a > 0 \Rightarrow h(x) - h(a) < 0, (\forall) x \in V \cap [a, b] \\ x - b < 0 \Rightarrow h(x) - h(b) < 0, (\forall) x \in W \cap [a, b] \end{cases}$$

rezultă că există  $c \in [a, b]$  astfel încât  $h(c) = m_n$  (valoarea minimă a funcției  $h$ ).

Conform teoremei lui FERMAT rezultă  $h'(c) = 0$ .

Dar  $h'(c) = f(c) - \alpha$  rezultă  $f(c) = \alpha$ .

Dacă se consideră  $c_\alpha = c$  atunci proprietatea este demonstrată.

### Observația 7.1.3.

- O funcție derivată nu are puncte de discontinuitate de speța I.
- Funcțiile care nu au proprietatea lui Darboux nu sunt funcții derivate.

O altă categorie de funcții pentru care se studiază noțiunea de derivată sunt funcțiile vectoriale de variabilă reală.

**Propoziția 7.1.4.** Fie  $F : X \subset \mathbb{R} \rightarrow Y \subset \mathbb{R}^n$ ;  $F(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x))$  o funcție vectorială de variabilă reală. Funcția  $F(x)$  este derivabilă în punctul  $x_0 \in X$  dacă și numai dacă  $f_i(x)$ ,  $i = \overline{1, n}$  sunt derivabile în  $x_0$  și are loc relația:

$$F'(x_0) = (f'_1(x_0), f'_2(x_0), \dots, f'_n(x_0)).$$

*Demonstrație:*

Se presupune că funcția  $F(x)$  este derivabilă în  $x_0$  și se demonstrează că  $f_i(x)$ ,  $i = \overline{1, n}$  sunt derivabile în  $x_0$ .

Într-adevăr, din derivabilitatea lui  $F(x)$  în punctul  $x_0$  rezultă că există și este finită

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0}.$$

Dar

$$\frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} = \left( \frac{f_1(x) - f_1(x_0)}{x - x_0}, \frac{f_2(x) - f_2(x_0)}{x - x_0}, \dots, \frac{f_n(x) - f_n(x_0)}{x - x_0} \right)$$

Ținând cont de egalitatea anterioară și de limita funcțiilor vectoriale de variabilă reală rezultă că fiecare raport  $\frac{f_i(x) - f_i(x_0)}{x - x_0}$  are limită finită în punctul  $x_0$ .

Deci funcțiile  $f_i(x)$ ,  $i = \overline{1, n}$  sunt derivabile în punctul  $x_0$ . Din egalitatea evidentă

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} = \left( \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1(x) - f_1(x_0)}{x - x_0}, \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_2(x) - f_2(x_0)}{x - x_0}, \dots, \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_n(x) - f_n(x_0)}{x - x_0} \right)$$

rezultă

$$F'(x_0) = (f'_1(x_0), f'_2(x_0), \dots, f'_n(x_0)).$$

Afirmația reciprocă se demonstrează în mod asemănător.

#### **Observația 7.1.4.**

Dacă funcția  $F(x)$  este derivabilă în orice punct al domeniului său de definiție  $X \subset \mathbb{R}$ , atunci prin înlocuirea lui  $x_0$  cu  $x$  are loc egalitatea:

$F'(x) = (f'_1(x), f'_2(x), \dots, f'_n(x))$  - formula de derivare a funcțiilor vectoriale de variabilă reală.

#### **Exemplu:**

Fie  $F(x) = (f_1(x), f_2(x))$ ,  $f_1(x) = \frac{1}{x-a}$ ,  $f_2(x) = \ln(x-a)$ . Să se cerceteze dacă funcția  $F(x)$  este derivabilă și să se găsească derivata acesteia.

#### Rezolvare:

Se observă că  $D_F = (a, +\infty)$ . Cum funcțiile  $f_1$  și  $f_2$  sunt funcții elementare definite pe  $(a, +\infty)$  și orice funcție elementară este derivabilă pe domeniul său de definiție, rezultă  $f_1$  și  $f_2$  sunt derivabile simultan, pentru orice  $x \in (a, +\infty)$ .

Conform Propoziției 7.1.4 rezultă  $F(x)$  este derivabilă, oricare ar fi  $x \in (a, +\infty)$  și are loc egalitatea:



$$F'(x) = (f_1'(x), f_2'(x)) = \left( \frac{-1}{(x-a)^2}, \frac{1}{x-a} \right).$$

**Definiția 7.1.1.** Funcția  $F(x) = (f_1(x), f_2(x), \dots, f_n(x))$  este derivabilă de două ori în punctul  $x_0$  din domeniul său de definiție dacă funcția  $H(x) = (f_1'(x), f_2'(x), \dots, f_n'(x))$  este derivabilă în punctul  $x_0$  și are loc relația  $F''(x) = (f_1''(x), f_2''(x), \dots, f_n''(x))$ .

**Observația 7.1.5.**

a) Ținând cont de Definiția 7.1.1 și continuând raționamentul din aproape în aproape se spune că funcția  $F(x)$  este derivabilă de  $n$  ori în punctul  $x_0 \in D_F$ , dacă funcția  $G(x) = (f_1^{(n-1)}(x), f_2^{(n-1)}(x), \dots, f_n^{(n-1)}(x))$  este derivabilă în  $x_0$ .

b) Dacă se înlocuiește  $x_0$  cu  $x$ , adică funcția este derivabilă pe întregul său domeniu de definiție se obține egalitatea:

$$F^{(n)}(x) = (f_1^{(n)}(x), f_2^{(n)}(x), \dots, f_n^{(n)}(x))$$

care este formula de calcul a derivatei de ordinul  $n$  pentru o funcție vectorială de variabilă reală.

**Exemplu:** Dacă se consideră funcția din exemplul anterior:

$$F^{(n)}(x) = (f_1^{(n)}(x), f_2^{(n)}(x)) \Rightarrow F^{(n)}(x) = \left( \frac{(-1)^n \cdot n!}{(x-a)^{n+1}}, \frac{(-1)^{n+1} \cdot (n-1)!}{(x-a)^n} \right)$$

Un alt tip de funcții pentru care se studiază derivabilitatea și derivata sunt funcțiile reale de variabilă vectorială  $f : X \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ .

**Definiția 7.1.2.** Fie  $a, b \in \mathbb{R}^n$ ,  $a \neq b$

a) mulțimea  $\{x \in \mathbb{R}^n \mid x = a + t(b-a), t \in \mathbb{R}\}$  se numește dreapta ce trece prin  $a$  și  $b$ .

b) mulțimea  $\{x \in \mathbb{R}^n \mid x = a + t(b-a), t \geq 0\}$  este semidreapta ce pornește din  $a$  și trece prin  $b$ .

c) mulțimea  $\{x \in \mathbb{R}^n \mid x = a + t(b-a), t \in [0,1]\}$  este segmentul de dreaptă de capete  $a$ ,  $b$  și se notează  $[a, b]$ .

d) Orice semidreaptă ce pornește din  $O \in \mathbb{R}^n$  se numește direcție în  $\mathbb{R}^n$ .

**Observația 7.1.6.**

a) Dacă se consideră semidreapta  $\{x \in \mathbb{R}^n \mid x = a + t(b - a), t \geq 0\}$  atunci direcția determinată de această semidreaptă este  $s = \frac{b - a}{\|b - a\|}$ .

b) Fie  $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  și  $a = (a_1, a_2, \dots, a_n) \in A$  fixat, iar  $x = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in A$  punct curent și  $s = (s_1, s_2, \dots, s_n) \in \mathbb{R}^n$  a.î.  $\|s\| = 1$ .

Cu aceste notații este bine definită funcția  $g : (-r, r) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $g(t) = f(a + ts)$ ,  $r > 0$  a.î.  $B(a, r) \subset A$ .

**Definiția 7.1.3.** Funcția  $f : A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  este derivabilă în punctul  $a \in A$  după direcția  $s$  dacă funcția  $g$  este derivabilă în  $t = 0$  și are loc egalitatea

$$\frac{df(\bar{a})}{ds} = g'(0) = \lim_{t \rightarrow 0} \frac{g(t) - g(0)}{t}.$$

$\frac{df(\bar{a})}{ds}$  este derivata lui  $f$  după direcția  $s$  în punctul  $\bar{a} \in \mathbb{R}^n$ .

**Observația 7.1.7.** Dacă în locul lui  $s$  se consideră versorii  $e_1 = (1, 0, 0, \dots, 0)$ ,  $e_2 = (0, 1, 0, \dots, 0)$ , ...,  $e_n = (0, 0, \dots, 0, 1)$  atunci din derivata după direcția  $f$  se obțin derivatele parțiale, în raport cu variabilele  $x_1, x_2, \dots, x_n$ . În mod explicit acestea se definesc după cum urmează:

**Definiția 7.1.4.**

Fie  $f : X \subset \mathbb{R}^n \rightarrow Y \subset \mathbb{R}$  o funcție reală de variabilă vectorială definită prin  $f = f(x_1, x_2, \dots, x_{k-1}, x_k, x_{k+1}, \dots, x_n)$ . Funcția este derivabilă în punctul  $x_0 = (x_{01}, x_{02}, \dots, x_{0k-1}, x_{0k}, x_{0k+1}, \dots, x_{0n})$  în raport cu variabila  $x_k$  dacă există și este finită

$$\lim_{x_k \rightarrow x_{0k}} \frac{f(x_{01}, x_{02}, \dots, x_{0k-1}, x_k, x_{0k+1}, \dots, x_{0n}) - f(x_{01}, x_{02}, \dots, x_{0k-1}, x_{0k}, x_{0k+1}, \dots, x_{0n})}{x_k - x_{0k}}.$$

Limita respectivă, în cazul în care există și este finită, se notează astfel:

$$\frac{\partial f(\bar{x}_0)}{\partial x_k} \text{ sau } f'_{x_k}(\bar{x}_0)$$

și poartă denumirea de derivata parțială a funcției  $f$  în raport cu  $x_k$  calculată în punctul  $\bar{x}_0$ .

**Observația 7.1.8.**

a) Dacă funcția este derivabilă parțial în raport cu variabila  $x_k$  pe întreg domeniul său de definiție, atunci se obține prin înlocuirea lui  $\bar{x}_0$  cu  $\bar{x}$  funcția

$\frac{\partial f(\bar{x})}{\partial x_k}$  sau  $f'_{x_k}(\bar{x})$  care poartă denumirea de derivata parțială a funcției  $f$  în raport cu variabila  $x_k$ .

b) În cazul în care funcția are două sau trei variabile nu se mai notează acestea cu  $(x_1, x_2)$  sau  $(x_1, x_2, x_3)$ . În acest caz notațiile sunt  $(x, y)$  sau  $(x, y, z)$  și atunci Definiția 7.1.4 are următoarele forme particulare:

i) dacă  $f = f(x, y)$  se spune că funcția  $f$  este derivabilă în punctul  $(x_0, y_0)$  în raport cu variabila  $x$ , dacă

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0}$$
 există și este finită și această limită se

$$\text{notează } \frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x}.$$

ii) în mod asemănător  $f(x, y)$  este derivabilă în raport cu  $y$  dacă

$$\lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f(x_0, y) - f(x_0, y_0)}{y - y_0}$$
 există și este finită și aceasta se notează

$$\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y}.$$

c) Ținând cont de definiția derivatei unei funcții reale de variabilă reală și de Definiția 7.1.4 se poate afirma că pentru a determina derivatele parțiale ale unei funcții reale de variabilă vectorială se folosesc formulele și regulile de derivare de la funcții reale de variabilă reală, considerând variabilă doar variabila specificată în procesul de derivare, iar celelalte variabile se consideră constante.

**Exemplu:** Fie  $f : X \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x, y) = \frac{\cos(x^2 + y^2) + \sin^2(x + y)}{x + y}$ .

Să se calculeze:

$$\frac{\partial f}{\partial x} \text{ și } \frac{\partial f}{\partial y}$$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \left( \frac{\cos(x^2 + y^2) + \sin^2(x + y)}{x + y} \right)'_x =$$

$$= \frac{(-2x \sin(x^2 + y^2) + 2 \sin(x + y) \cos(x + y))(x + y) - \cos(x^2 + y^2) + \sin^2(x + y)}{(x + y)^2}$$

Analog pentru  $\frac{\partial f}{\partial y}$ .

**Definiția 7.1.5.**

Funcția  $f : X \subset \mathbb{R}^n \rightarrow Y \subset \mathbb{R}$  este derivabilă parțial de două ori în raport cu variabila  $x_k$  dacă funcția  $h(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{\partial f(\bar{x})}{\partial x_k}$  este derivabilă parțial în raport cu variabila  $x_k$  și se obține relația:  $\frac{\partial^2 f}{\partial x_k^2} = \frac{\partial h(\bar{x})}{\partial x_k}$ ,  $\bar{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ .

Din aproape în aproape se spune că funcția  $f = f(\bar{x})$  este derivabilă de  $n$  ori în raport cu variabila  $x_k$  dacă funcția  $g(\bar{x}) = \frac{\partial^{n-1} f(\bar{x})}{\partial x_k^{n-1}}$  este derivabilă în raport cu variabila  $x_k$  și se obține egalitatea:  $\frac{\partial^n f(\bar{x})}{\partial x_k^n} = \frac{\partial g(\bar{x})}{\partial x_k}$ .

**Definiția 7.1.6.**

Se spune că funcția  $f = f(\bar{x})$  este derivabilă în raport cu variabila  $x_k$  și  $x_l$  (în această ordine) dacă funcția  $\frac{\partial f(\bar{x})}{\partial x_k} = h(\bar{x})$  este derivabilă în raport cu variabila  $x_l$  și se obține relația  $\frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_l} = \frac{\partial h(\bar{x})}{\partial x_l}$  care poartă denumirea de derivată mixtă de ordinul al doilea al funcției  $f$  în raport cu  $x_k$  și  $x_l$ .

**Observația 7.1.9.**

Numărul derivatelor mixte de ordinul  $k$  pentru funcția  $f = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  este  $C_{n+k-1}^k$

Deci pentru funcția de trei variabile  $f = f(x, y, z)$  numărul derivatelor mixte de ordinul doi este  $C_4^2 = 6$ .

Dar în anumite situații derivatele mixte pot fi egale. Acest lucru este dat de următoarea teoremă:

**Propoziția 7.1.5. (teorema lui Schwarz)** Fie  $f : X \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ;  $f = f(x, y)$

o funcție de două variabile. Dacă:

1<sup>0</sup> Funcția admite derivate parțiale mixte de ordinul al doilea într-o vecinătate  $V$  a punctului  $(x, y)$ , adică există  $f''_{xy}$  și  $f''_{yx}$ .

2<sup>0</sup>  $f''_{xy}$  este continuă în punctul  $(x, y)$ . Atunci  $f''_{xy}(x, y) = f''_{yx}(x, y)$ .

**Demonstrație:**

Se consideră expresia

$$E = f(x+h, y+k) - f(x+h, y) - f(x, y+k) + f(x, y).$$

Se notează  $\varphi(x) = f(x, y+k) - f(x, y)$ . În urma acestei notații expresia  $E$  capătă forma:

$$E = \varphi(x+h) - \varphi(x)$$

Se observă că funcția  $\varphi$  este continuă și derivabilă și are loc egalitatea:

$$\varphi'(x) = f'_x(x, y+k) - f'_x(x, y)$$

(1)

Se aplică formula lui Lagrange expresiei  $E$  și se obține:

$$E = h \cdot \varphi'(\xi); \quad \xi \in [x, x+h]$$

(2)

Ținând cont de relațiile (1) și (2) rezultă:

$$E = h [f'_x(\xi, y+k) - f'_x(\xi, y)]$$

(3)

Prin aplicarea teoremei lui Lagrange funcției  $f'_x$  se obține:

$$f'_x(x, y+k) - f'_x(x, y) = k \cdot f''_{xy}(x, \eta), \quad \eta \in [y, y+k] \quad (4)$$

Ținând cont de relațiile (3) și (4) rezultă:

$$E = h \cdot k \cdot f''_{xy}(\xi, \eta)$$

(5)

Revenind la funcția  $\varphi$  se poate observa că:

$$\lim_{k \rightarrow 0} \frac{\varphi(x) - \varphi(x+k)}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{f(x, y+k) - f(x, y)}{y+k-y} = f'_y(x, y)$$

(6)

Ținând cont de expresia lui  $E$  în raport de funcția  $\varphi$  rezultă:

$$\lim_{k \rightarrow 0} \frac{E}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} \frac{\varphi(x+h) - \varphi(x)}{k} = f'_y(x+h, y) - f'_y(x, y)$$

(7)

Din continuitatea lui  $f''_{xy}(x, y)$  rezultă că:

$$\lim_{k \rightarrow 0} \frac{E}{k} = \lim_{k \rightarrow 0} h \cdot f''_{xy}(\xi, \eta) = h \cdot f''_{xy}(\xi, y) \quad (\text{s-a folosit (5)})$$

(8)

Din (7) și (8) rezultă:  $h \cdot f''_{xy}(\xi, y) = f'_y(x+h, y) - f'_y(x, y)$  deci

$$f''_{xy}(\xi, y) = \frac{f'_y(x+h, y) - f'_y(x, y)}{h}$$

Prin trecere la limită când  $h \rightarrow 0$  ținând cont de continuitatea lui  $f''_{xy}(x, y)$  se obține  $f''_{xy}(x, y) = f''_{yx}(x, y)$  și astfel teorema este demonstrată.

Forme mai generale ale teoremei sunt următoarele:

A) Dacă:  $1^0$  Există  $f'_x$ ,  $f'_y$  și  $f''_{xy}$  pe  $V_{(a,b)}$

$2^0$   $f''_{xy}$  este continuă în  $(a, b)$

Atunci există  $f''_{yx}(a, b)$  și  $f''_{xy}(a, b) = f''_{yx}(a, b)$

B) **Criteriul lui Young**

Dacă:  $1^{\circ}$  Există  $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}$  și  $\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}$  într-o vecinătate  $V$  a lui  $(a,b)$

$2^{\circ}$   $\frac{\partial f(x,y)}{\partial x}$  și  $\frac{\partial f(x,y)}{\partial y}$  sunt diferențiabile în  $(a,b)$

Atunci există  $\frac{\partial^2 f(a,b)}{\partial x \partial y}$  și  $\frac{\partial^2 f(a,b)}{\partial y \partial x}$  și  $\frac{\partial^2 f(a,b)}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f(a,b)}{\partial y \partial x}$ .

(Diferențiabilitatea se studiază în paragraful următor)

### Observația 7.1.10.

Această afirmație este valabilă și pentru funcțiile de trei sau mai multe variabile și, de asemenea, este adevărată și pentru derivatele mixte de ordin superior lui 2.

Problema derivatelor parțiale se pune și pentru funcțiile compuse de mai multe variabile. Această problemă este rezolvată de următoarea propoziție.

**Propoziția 7.1.6.** Fie  $u: X \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  și  $v: X \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ , funcții derivabile în punctul  $x_0 \in X$  cu derivata continuă. Dacă funcția  $f: Y \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $Y = X \times X$ , are derivate parțiale continue pe mulțimea  $Y$ , atunci funcția compusă  $F(x) = f[u(x), v(x)]$  este derivabilă în punctul  $x_0$  și are loc egalitatea:

$$F'(x_0) = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{du(x_0)}{dx} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{dv(x_0)}{dx}.$$

*Demonstrație:*

Pentru a arăta că funcția  $F(x)$  este derivabilă în punctul  $x_0 \in X \subset \mathbb{R}$

trebuie arătat că raportul  $\frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0}$  are limită finită în punctul  $x_0$ . Se notează:

$$u_0 = u(x_0); v_0 = v(x_0); u = u(x); v = v(x);$$

Atunci:

$$\begin{aligned} \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} &= \frac{f(u(x), v(x)) - f(u(x_0), v(x_0))}{x - x_0} = \\ &= \frac{f(u(x), v(x)) - f(u_0, v(x)) + f(u_0, v(x)) - f(u_0, v_0)}{x - x_0} = \\ &= \frac{[f(u(x), v(x)) - f(u_0, v(x))] + [f(u_0, v(x)) - f(u_0, v_0)]}{x - x_0} \end{aligned}$$

Ținând cont de teorema lui Lagrange se obține:

$$f(u, v) - f(u_0, v) = (u - u_0) \cdot f'_u(\xi, v), \text{ unde } u_0 \leq \xi \leq u$$

$$f(u_0, v) - f(u_0, v_0) = (v - v_0) \cdot f'_v(u_0, \eta), \text{ unde } v_0 \leq \eta \leq v.$$

$$\text{Deci } \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} = \frac{u - u_0}{x - x_0} \cdot f'_u(\xi, v) + \frac{v - v_0}{x - x_0} \cdot f'_v(u_0, \eta)$$

(1)

În egalitatea (1), datorită faptului că funcțiile  $u$  și  $v$  sunt derivabile în punctul  $x_0$  și datorită continuității derivatelor parțiale pentru funcția  $f$  rezultă că membrul drept al egalității are limită finită în punctul  $x_0$ .

Deci și membrul stâng al egalității (1) are limită finită în punctul  $x_0$  ceea ce arată că funcția  $F(x)$  este derivabilă în  $x_0$  și are loc egalitatea:

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{u - u_0}{x - x_0} \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} f'_u(\xi, v) + \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{v - v_0}{x - x_0} \cdot \lim_{x \rightarrow x_0} f'_v(u_0, \eta)$$

rezultă

$$F'(x_0) = u'(x_0) \cdot f'_u(u_0, v_0) + v'(x_0) \cdot f'_v(u_0, v_0)$$

sau

$$F'(x_0) = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{du(x_0)}{dx} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{dv(x_0)}{dx}$$

Dacă se consideră că funcțiile  $u$  și  $v$  sunt derivabile pe întreg domeniul lor de definiție, iar funcția  $f$  admite derivate parțiale continue în orice punct al domeniului de definiție, rezultă  $F(x)$  derivabilă pe întreg domeniul de definiție și are loc egalitatea:

$$F'(x) = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{du(x)}{dx} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{dv(x)}{dx}$$

relație ce reprezintă formula de derivare a unei funcții compuse ce conține doi intermediari care sunt funcții reale de variabilă reală.

### Observația 7.1.9.

a) Propoziția 7.1.6 este adevărată și în cazul în care  $f: X \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  și conține  $n$  intermediari, adică: dacă funcția compusă are forma  $F(x) = f(u_1(x), u_2(x), \dots, u_n(x))$  unde  $u_i: A \subset \mathbb{R} \rightarrow B_i \subset \mathbb{R}$ ,  $i = \overline{1, n}$  și

$$X = B_1 \times B_2 \times \dots \times B_n. \text{ Atunci } F'(x) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial u_i} \cdot \frac{du_i(x)}{dx}.$$

b) Propoziția 7.1.6 se poate generaliza și astfel:

Fie funcția compusă  $F: X \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  definită astfel

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(u_1(x_1, x_2, \dots, x_n), u_2(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, u_m(x_1, x_2, \dots, x_n))$$

unde funcțiile  $u_i: A \subset \mathbb{R}^n \rightarrow B_i \subset \mathbb{R}$ ,  $i = \overline{1, m}$  sunt derivabile în raport cu  $x_k$ , pentru orice  $i = \overline{1, m}$  și funcția  $f$  admite derivate parțiale continue în raport cu fiecare din variabilele sale  $u_i$ , pentru orice  $i = \overline{1, m}$ . Atunci  $F$  este derivabilă parțial în raport cu variabila  $x_k$  și are loc egalitatea:

$$\frac{\partial F}{\partial x_k} = \sum_{i=1}^m \frac{\partial f}{\partial u_i} \cdot \frac{\partial u_i}{\partial x_k}$$

numită formula pentru derivata parțială a funcției compuse  $F$  ce are  $m$  intermediari, care sunt funcții de  $n$  variabile.

**Exemplu:**

Fie  $F : X \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $F(x) = f(\ln(x^2 + 2x + 1), \sin(x^2 + 1))$  și

$G : X \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $G(x, y) = g(\cos(x^2 + y^2), \sqrt{x^2 + y^2})$ .

Să se calculeze  $F'(x)$ ;  $\frac{\partial G}{\partial x}$ ;  $\frac{\partial G}{\partial y}$ .

Rezolvare:

- Dacă se consideră:

$$u_1(x) = \ln(x^2 + 2x + 1)$$

$$u_2(x) = \sin(x^2 + 1)$$

atunci funcția

$$F(x) = f(u_1(x), u_2(x)).$$

Ținând cont de Propoziția 7.1.6 rezultă că

$$F'(x) = \frac{\partial f}{\partial u_1} \cdot \frac{du_1}{dx} + \frac{\partial f}{\partial u_2} \cdot \frac{du_2}{dx}$$

$$\frac{du_1}{dx} = \frac{2x + 2}{(x + 1)^2} = \frac{2}{x + 1}$$

$$\frac{du_2}{dx} = 2x \cos(x^2 + 1)$$

Deci

$$F'(x) = \frac{\partial f}{\partial u_1} \cdot \frac{2}{x + 1} + \frac{\partial f}{\partial u_2} \cdot 2x \cos(x^2 + 1)$$

unde  $\frac{\partial f}{\partial u_1}$  și  $\frac{\partial f}{\partial u_2}$  rămân sub această formă deoarece funcția  $f$  este derivabilă, dar necunoscută.

Dacă  $f(u_1, u_2)$  era înlocuită spre exemplu cu  $f(u_1, u_2) = \sqrt{u_1 + u_2}$

$$\frac{\partial f}{\partial u_1} = \frac{1}{2\sqrt{u_1 + u_2}}; \quad \frac{\partial f}{\partial u_2} = \frac{1}{2\sqrt{u_1 + u_2}}$$

- Dacă se consideră:

$$u_1(x, y) = \cos(x^2 + y^2)$$

$$u_2(x, y) = \sqrt{x^2 + y^2}$$

atunci



$$G(x, y) = g(u_1(x, y), u_2(x, y)).$$

Ținând cont de Observația 7.1.9 b) rezultă:

$$\frac{\partial G}{\partial x} = \frac{\partial g}{\partial u_1} \cdot \frac{\partial u_1}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial u_2} \cdot \frac{\partial u_2}{\partial x} \quad \text{și} \quad \frac{\partial G}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial u_1} \cdot \frac{\partial u_1}{\partial y} + \frac{\partial g}{\partial u_2} \cdot \frac{\partial u_2}{\partial y}.$$

Dar

$$\frac{\partial u_1}{\partial x} = -2x \sin(x^2 + y^2); \quad \frac{\partial u_2}{\partial x} = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

$$\frac{\partial u_1}{\partial y} = -2y \sin(x^2 + y^2); \quad \frac{\partial u_2}{\partial y} = \frac{y}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

Ținând cont de aceasta rezultă:

$$\frac{\partial G}{\partial x} = -\frac{\partial g}{\partial u_1} \cdot 2x \sin(x^2 + y^2) + \frac{\partial g}{\partial u_2} \cdot \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$$

Analog pentru  $\frac{\partial G}{\partial y}$ .

### Propoziția 7.1.7. (teorema lui Euler pentru funcții omogene)

Fie  $f : X \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție reală de variabilă vectorială.

Dacă:

1<sup>o</sup>  $f$  este omogenă de ordin  $m \in \mathbb{R}$

2<sup>o</sup> există  $\frac{\partial f}{\partial x_i}$ ,  $i = \overline{1, n}$ .

Atunci are loc egalitatea:

$$\sum_{i=1}^n x_i \cdot \frac{\partial f}{\partial x_i} = m \cdot f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

*Demonstrație:*

Dacă funcția  $f$  este omogenă de ordin  $m$  are loc egalitatea:

$$f(tx_1, tx_2, \dots, tx_n) = t^m f(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

Dacă membrul stâng se consideră ca fiind funcția compusă

$$F(t) = f(u_1, u_2, \dots, u_n); \quad u_1 = tx_1, \quad u_2 = tx_2, \quad \dots, \quad u_n = tx_n$$

conform cu Observația 7.1.9 a) rezultă că:

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial (tx_i)} \cdot x_i = F'(t).$$

Dacă se derivează și membrul drept în raport cu  $t$  se obține:

$$\sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial (tx_i)} \cdot x_i = m \cdot t^{m-1} \cdot f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

egalitate adevărată pentru orice  $t$  număr real.

Dacă se particularizează  $t = 1$  în această egalitate rezultă:

$$\sum_{i=1}^n x_i \cdot \frac{\partial f}{\partial x_i} = m \cdot f(x_1, x_2, \dots, x_n)$$

care este relația lui Euler pentru funcții omogene de ordin  $m$ .

Se cunoaște că pentru funcțiile reale de variabilă reală există **teorema lui Lagrange**. Această teoremă a lui Lagrange este valabilă și pentru funcțiile reale de variabilă vectorială și ea se prezintă sub următoarea formă:

**Propoziția 7.1.8. (teorema lui Lagrange)**

Fie  $f : X \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $(a, b) \in X$ . Dacă funcția  $f = f(x, y)$  admite derivate parțiale pe o vecinătate  $V \in \mathcal{G}(a, b)$ , atunci pentru orice  $(x, y) \in V$ , există  $\xi \in (a, x)$  și  $\eta \in (b, y)$  astfel încât:

$$f(x, y) - f(a, b) = (x - a) \cdot f'_x(\xi, y) + (y - b) \cdot f'_y(a, \eta).$$

**Observația 7.1.10.** Dacă derivatele parțiale sunt continue pe  $V$  egalitatea din **teorema lui Lagrange** are următoarea formă:

$$f(x, y) - f(a, b) = (x - a) \cdot f'_x(\xi, \eta) + (y - b) \cdot f'_y(\xi, \eta).$$

Această egalitate este valabilă și pentru funcții de  $n$  variabile, unde  $n \geq 3$

$$f(x_1, x_2, \dots, x_n) - f(a_1, a_2, \dots, a_n) = \sum_{i=1}^n (x_i - a_i) \cdot \frac{\partial f(\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n)}{\partial x_i}, \quad \xi_i \in (a_i, x_i),$$

$i = \overline{1, n}$

## 2. Diferențiala

**Definiția 7.2.1.**

Fie  $f : X \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție reală de variabilă reală. Funcția  $f$  este diferențiabilă în punctul  $x_0 \in X$  dacă există  $L \in \mathbb{R}$  și  $\theta : X \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$  cu proprietatea  $\lim_{x \rightarrow x_0} \theta(x) = 0$  astfel încât  $f(x) = f(x_0) + L(x - x_0) + \theta(x)(x - x_0)$ .

**Observația 7.2.1.**

a) Dacă egalitatea din Definiția 7.2.1 se împarte cu  $(x - x_0)$  și se trece la limită se obține  $L = f'(x_0)$ .

Așadar,  $f(x) = f(x_0) + f'(x)(x - x_0) + \theta(x)(x - x_0)$ .

b) Dacă se notează  $x - x_0 = h$  atunci  $f(x) - f(x_0) \cong h \cdot f'(x_0)$ . Funcția  $h \cdot f'(x_0)$ , care depinde liniar de  $h$  se numește diferențiala funcției  $f$  în punctul  $x_0$  și se notează cu  $df(x_0)$  și are loc egalitatea  $df(x_0) = h \cdot f'(x_0)$ .

Pe o vecinătate foarte mică a punctului  $x_0$  diferența  $x - x_0 = h$  este foarte mică și deci ea poate fi notată cu  $dx$ , adică  $dx = h$ . Atunci diferențiala funcției  $f$  în punctul  $x_0$  capătă următoarea formă:

$$df(x_0) = f'(x_0) dx.$$

Dacă funcția  $f$  este diferențiabilă în orice punct al domeniului său de definiție, diferențiala sa este:  $df(x) = f'(x) dx$ .

Se observă că diferențiabilitatea și diferențiala nu sunt noțiuni echivalente. O funcție diferențiabilă are o diferențială. Diferențiabilitatea este o proprietate, diferențiala este o expresie. Diferențiala  $df(x_0)$  aproximează diferența  $f(x) - f(x_0)$ .

**Definiția 7.2.2.** Se spune că funcția  $f$  este diferențiabilă de  $n$  ori în punctul  $x_0$  dacă funcția  $f^{(n-1)}(x)$  este diferențiabilă în punctul  $x_0$  și diferențiala de ordin  $n$  este  $d^n f(x_0) = f^{(n)}(x_0) dx^n$ .

Problema diferențiabilității poate fi pusă și pentru funcțiile reale de variabilă vectorială și se definește astfel:

**Definiția 7.2.3.** Fie  $f: X \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ . Se spune că  $f = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  este diferențiabilă în punctul  $x_0 = (x_{01}, x_{02}, \dots, x_{0n})$  dacă există  $A_i \in \mathbb{R}$ ,  $i = \overline{1, n}$  și  $\theta_i: X \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $i = \overline{1, n}$  cu proprietatea  $\lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} \theta_i(\bar{x}) = 0$ ,  $i = \overline{1, n}$  astfel încât:

$$f(\bar{x}) - f(\bar{x}_0) + \sum_{i=1}^n (x_i - x_{0i}) \cdot A_i + \sum_{i=1}^n (x_i - x_{0i}) \cdot \theta_i(\bar{x}).$$

Dacă funcția  $f$  are 2 sau 3 variabile, atunci egalitatea care definește diferențiabilitatea are una din formele:

$$f(x, y) = f(x_0, y_0) + (x - x_0)A_1 + (y - y_0)A_2 + (x - x_0)\theta_1(x, y) + (y - y_0)\theta_2(x, y)$$

$$f(x, y, z) = f(x_0, y_0, z_0) + (x - x_0)A_1 + (y - y_0)A_2 + (z - z_0)A_3 + (x - x_0)\theta_1(x, y, z) + (y - y_0)\theta_2(x, y, z) + (z - z_0)\theta_3(x, y, z).$$

**Observația 7.2.2.**

În Definiția 7.2.3 expresia  $\sum_{i=1}^n (x_i - x_{0i}) \cdot \theta_i(\bar{x})$  se poate înlocui cu

$$\theta_i(\bar{x}) \cdot \sqrt{\sum_{i=1}^n (x_i - x_{0i})^2} \text{ unde } \lim_{\bar{x} \rightarrow \bar{x}_0} \theta(\bar{x}) = 0.$$

În cele ce urmează se pune problema legăturii ce există între diferențiabilitate și derivabilitate.

**Propoziția 7.2.1.**

Fie  $f : X \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $(a,b) \in X$ . Dacă funcția  $f$  este diferențiabilă în punctul  $(a,b)$ , atunci  $f$  este continuă în  $(a,b)$  și derivabilă în  $(a,b)$  în raport cu variabilele sale.

*Demonstrație:*

Funcția  $f$  fiind diferențiabilă, ținând cont de definiția diferențiabilității funcțiilor de două variabile se poate afirma că există  $A, B \in \mathbb{R}$  și  $\theta_1(x,y), \theta_2(x,y)$  cu proprietatea  $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ y \rightarrow b}} \theta_i(x,y) = 0$ ,  $i = 1, 2$  astfel încât:

$$f(x,y) = f(a,b) + A(x-a) + B(y-b) + \theta_1(x,y)(x-a) + \theta_2(x,y)(y-b) \quad (*)$$

Trecând la limită în egalitatea (\*) se obține  $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ y \rightarrow b}} f(x,y) = f(a,b)$  ceea ce

arată că  $f(x,y)$  este continuă în  $(a,b)$ .

În egalitatea (\*) se pune  $y = b$  și se obține:

$$\frac{f(x,b) - f(a,b)}{x-a} = A + \theta_1(x,y) \quad (**)$$

Trecând la limită în (\*\*), se obține:

$$\lim_{x \rightarrow a} \frac{f(x,b) - f(a,b)}{x-a} = A. \text{ Deci } f(x,y) \text{ este derivabilă în } (a,b) \text{ în raport cu}$$

$x$ . Raționând analog se obține că  $f(x,y)$  este derivabilă în  $(a,b)$  în raport cu  $y$ .  
 $A = f'_x(a,b)$ ,  $B = f'_y(a,b)$ .

**Observația 7.2.3.**

Propoziția 7.2.1 este adevărată și pentru funcții de trei sau mai multe variabile.

**Propoziția 7.2.2.**

Fie  $f : X \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ , Dacă funcția  $f$  admite derivate parțiale de ordinul întâi continue pe o vecinătate  $V$  a punctului  $(a,b) \in X$ , atunci această funcție este diferențiabilă în punctul  $(a,b)$ .

*Demonstrație:*

Ținând cont că funcția  $f$  admite derivate parțiale continue pe o vecinătate  $V$  a punctului  $(a,b)$ , acestea se poate aplica teorema lui Lagrange pentru funcții de două variabile și se obține:

$$f(x,y) = f(a,b) + (x-a)f'_x(\xi,y) + (y-b)f'_y(a,\eta).$$

Această egalitate se poate scrie sub forma:

$$f(x, y) = f(a, b) + (x - a)f'_x(a, b) + (y - b)f'_y(a, b) + [f'_x(\xi, y) - f'_x(a, b)](x - a) + [f'_y(a, \eta) - f'_y(a, b)](y - b).$$

Dacă se notează:

$$f'_x(\xi, y) - f'_x(a, b) = \theta_1(x, y)$$

$$f'_y(a, \eta) - f'_y(a, b) = \theta_2(x, y)$$

Ținând cont de continuitatea derivatelor parțiale rezultă:

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ y \rightarrow b}} \theta_i(x, y) = 0, \quad i = \overline{1, 2}$$

În aceste condiții va avea loc egalitatea:

$$f(x, y) = f(a, b) + (x - a)A + (y - b)B + (x - a)\theta_1(x, y) + (y - b)\theta_2(x, y)$$

unde  $A = f'_x(a, b)$ ;  $B = f'_y(a, b)$ .

Această egalitate exprimă faptul că funcția  $f$  este diferențiabilă în punctul  $(a, b)$ .

#### Observația 7.2.4.

Propoziția 7.2.2 are o importanță deosebită în studiul diferențiabilității funcțiilor de două variabile (ea se poate generaliza și la funcții de trei sau mai multe variabile) deoarece reduce studiul diferențiabilității la existența și continuitatea derivatelor parțiale.

**Definiția 7.2.4.** Funcția liniară în  $x$  și  $y$ ,  $(x - a) \cdot f'_x(a, b) + (y - b)f'_y(a, b)$  se numește diferențiala de ordinul întâi a funcției  $f(x, y)$  în  $(a, b)$  și se notează  $df(a, b)$ . Diferențiala pe o întreaga vecinătate a lui  $(a, b)$  este

$$df(x, y) = \frac{\partial f(x, y)}{\partial x} \cdot dx + \frac{\partial f(x, y)}{\partial y} \cdot dy. \text{ Aceasta se poate generaliza la funcțiile de}$$

$n$  variabile și se obține  $df(\bar{x}) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f(\bar{x})}{\partial x_i} dx_i$ .

$$d\bullet = \frac{\partial \bullet}{\partial x} \cdot dx + \frac{\partial \bullet}{\partial y} \cdot dy \text{ se numește operatorul de diferențiere de ordinul întâi}$$

pentru funcția  $f(x, y)$ . Pentru funcțiile de  $n$  variabile acest operator are forma

$$d\bullet = \sum_{i=1}^n \frac{\partial \bullet}{\partial x_i} dx_i. \text{ Dacă operatorul de diferențiere se aplică în mod repetat unei}$$

funcții de două sau mai multe variabile se obține diferențiala de ordin superior a acesteia.

Pentru funcțiile de două variabile diferențiala de ordinul  $n$  are următoarea formă:

$$d^n f(x, y) = \sum_{i=1}^n C_n^i \frac{\partial^n f}{\partial x^i \partial y^{n-i}} dx^i dy^{n-i}$$

sau scrisă, ținând cont de modul recursiv în care se definește diferențiala de ordinul  $n$ , aceasta poate fi pusă sub următoarea formă:

$$d^n f(x, y) = \left( \frac{\partial \cdot}{\partial x} dx + \frac{\partial \cdot}{\partial y} dy \right)^{(n)} \cdot f(x, y)$$

unde se ridică formal la putere după formula binomului lui Newton, ridicând efectiv la puteri lungimile  $dx$ ,  $dy$  iar operatorilor  $\frac{\partial \cdot}{\partial x}, \frac{\partial \cdot}{\partial y}$  li se mărește ordinul de derivare specificat după formula binomului.

Pentru funcțiile  $f: X \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $n \geq 3$  nu există o formulă pentru diferențiala de ordinul  $n$  a lui  $f$ , deoarece nu se cunoaște formula pentru  $(A_1 + A_2 + \dots + A_n)^n$ . În acest caz, diferențialele de ordinul  $n$  se obțin după procedeul recursiv de definire a diferențialei de ordin  $n$ .

Se consideră cel mai simplu caz care nu se încadrează în formula anterioară, adică se calculează  $d^3 f(x, y, z)$ .

$$d^3 f = d^2 f \circ df = \left( \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} dx^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} dy^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} dz^2 + \frac{2\partial^2 f}{\partial x \partial y} dx^2 + \frac{2\partial^2 f}{\partial x \partial z} dx dz + \frac{2\partial^2 f}{\partial x \partial y} dx dy \right) \circ$$

$$\circ \left( \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz \right) = \frac{\partial^3 f}{\partial x^3} dx^3 + 3 \frac{\partial^3 f}{\partial y^2 \partial x} dy^2 dx + \dots$$

Deoarece se cunoaște formula

$$(A_1 + A_2 + \dots + A_n)^2 = A_1^2 + A_2^2 + \dots + A_n^2 + 2 \sum_{\substack{i,j=1 \\ i < j}}^n A_i A_j$$

rezultă:

$$d^2 f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i^2} dx_i^2 + 2 \sum_{\substack{i,j=1 \\ i < j}}^n \frac{\partial^2 f}{\partial x_i \partial x_j} dx_i dx_j.$$

### Exemplu:

Fie funcțiile:

$$f(x, y, z, u) = \ln(x^2 + y^2 + z^2 + u^2)$$

$$g(x, y, z) = \ln(x^x \cdot y^y \cdot z^z)$$

Să se calculeze:  $df$ ,  $d^2 f$ ,  $dg$ ,  $d^2 g$ ,  $d^n g$ ,  $n \geq 3$ .

### Rezolvare:

- Se știe că  $df(x, y, z, u) = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz + \frac{\partial f}{\partial u} du$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{2x}{x^2 + y^2 + z^2 + u^2}; \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{2y}{x^2 + y^2 + z^2 + u^2}; \quad \frac{\partial f}{\partial z} = \frac{2z}{x^2 + y^2 + z^2 + u^2};$$

$$\frac{\partial f}{\partial u} = \frac{2u}{x^2 + y^2 + z^2 + u^2};$$

rezultă că:

$$df(x, y, z, u) = \frac{2}{x^2 + y^2 + z^2 + u^2} (xdx + ydy + zdz + udu).$$

Se știe că:

$$d^2f = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} dx^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} dy^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} dz^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} du^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dx dy + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z} dx dz + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial u} dx du +$$

$$+ 2 \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} dy dz + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial u} dy du + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial u} dz du.$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{2(-x^2 + y^2 + z^2 + u^2)}{(x^2 + y^2 + z^2 + u^2)^2}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{2(x^2 - y^2 + z^2 + u^2)}{(x^2 + y^2 + z^2 + u^2)^2},$$

$$\frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = \frac{2(x^2 + y^2 - z^2 + u^2)}{(x^2 + y^2 + z^2 + u^2)^2}, \quad \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} = \frac{2(x^2 + y^2 + z^2 - u^2)}{(x^2 + y^2 + z^2 + u^2)^2}.$$

Analog se calculează derivate mixte de ordin doi.

Înlocuind în formula diferențialei de ordinul 2 a funcției  $f$  se obține  $d^2f(x, y, z, u)$ .

- Funcției  $g(x, y, z)$ , pentru a-i putea găsi în mod simplu derivate ce intervin în diferențialele cerute, i se face următoarea transformare:  
 $g(x, y, z) = x \ln x + y \ln y + z \ln z$ .

Se știe că:

$$dg = \frac{\partial g}{\partial x} dx + \frac{\partial g}{\partial y} dy + \frac{\partial g}{\partial z} dz$$

unde:  $\frac{\partial g}{\partial x} = \ln x + 1$ ;  $\frac{\partial g}{\partial y} = \ln y + 1$ ;

$$\frac{\partial g}{\partial z} = \ln z + 1 \Rightarrow dg = (\ln x + 1) dx + (\ln y + 1) dy + (\ln z + 1) dz$$

Se știe că:

$$d^2g = \frac{\partial^2 g}{\partial x^2} dx^2 + \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} dy^2 + \frac{\partial^2 g}{\partial z^2} dz^2 + 2 \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} dx dy + 2 \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial z} dx dz + 2 \frac{\partial^2 g}{\partial y \partial z} dy dz$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x^2} = \frac{1}{x}; \quad \frac{\partial^2 g}{\partial y^2} = \frac{1}{y}; \quad \frac{\partial^2 g}{\partial z^2} = \frac{1}{z}$$

$$\frac{\partial^2 g}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 g}{\partial x \partial z} = \frac{\partial^2 g}{\partial y \partial z} = 0$$

$$d^2 g = \frac{1}{x} dx^2 + \frac{1}{y} dy^2 + \frac{1}{z} dz^2$$

Pentru calculul lui  $d^n g$ ,  $n \geq 3$  nefiind o formulă pentru astfel de diferențiale în mod general se aplică principiul de deducere al acestora din aproape în aproape. Dar după cu s-a văzut acesta este destul de greu.

Totuși se știe că diferențiala de ordinul  $n$  a unei funcții de mai multe variabile conține două sume distincte: suma în care intervin derivatele parțiale de ordinul  $n$  în raport cu fiecare variabilă în parte și suma în care intervin derivatele parțiale mixte de ordinul  $n$ . În cazul funcției  $g(x, y, z)$  suma derivatelor parțiale mixte de ordinul  $n$  este 0, deoarece derivatele parțiale mixte de ordin doi după cum se observă sunt nule.

$$\text{Deci } d^n g = \frac{\partial^n g}{\partial x^n} dx^n + \frac{\partial^n g}{\partial y^n} dy^n + \frac{\partial^n g}{\partial z^n} dz^n.$$

$$\text{Dar } \frac{\partial^n g}{\partial x^n} = \frac{(-1)^n \cdot (n-1)!}{x^{n-1}}; \quad \frac{\partial^n g}{\partial y^n} = \frac{(-1)^n \cdot (n-1)!}{y^{n-1}}; \quad \frac{\partial^n g}{\partial z^n} = \frac{(-1)^n \cdot (n-1)!}{z^{n-1}};$$

$$d^n g(x, y, z) = (-1)^n \cdot (n-1)! \left( \frac{1}{x^{n-1}} dx^n + \frac{1}{y^{n-1}} dy^n + \frac{1}{z^{n-1}} dz^n \right).$$

În continuare se pun în evidență câteva propoziții care arată utilitatea practică a diferențialei.

### Propoziția 7.2.3.

Condiția necesară și suficientă ca  $df(x_1, x_2, \dots, x_n)$  să fie identic nulă pe  $X \subset \mathbb{R}^n$ , este ca funcția  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  să fie constantă pe  $X \subseteq \mathbb{R}^n$ .

### Propoziția 7.2.4.

Dacă expresia diferențială  $E = \sum_{i=1}^n P_i(\bar{x}) dx_i$ ,  $\bar{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$  este diferențiala unei funcții  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ , atunci  $\frac{\partial f}{\partial x_i} = P_i(x)$  și reciproc.

Demonstrațiile acestor două propoziții sunt imediate.

## 3. Unele aplicații ale diferențialei

### A. Formula lui Taylor

Într-un capitol anterior s-a demonstrat formula lui Taylor pentru funcții reale de variabilă reală. Această formulă poate fi generalizată și pentru funcții de două sau mai multe variabile. În cele ce urmează se dă formula lui Taylor pentru funcții de două variabile.



**Propoziția 7.2.5. (formula lui Taylor pentru funcții de două variabile)**

Fie  $f : X \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  diferențabilă de  $n$  ori în  $(a,b)$ ,  $(a,b) \in X$ .

Atunci are loc egalitatea:

$$f(x,y) = f(a,b) + \frac{1}{1!} \left[ \frac{\partial f(a,b)}{\partial x} \cdot (x-a) + \frac{\partial f(a,b)}{\partial y} \cdot (y-a) \right] +$$

$$+ \frac{1}{2!} \left[ \frac{\partial^2 f(a,b)}{\partial x^2} \cdot (x-a)^2 + \frac{\partial^2 f(a,b)}{\partial y^2} \cdot (y-a)^2 + 2(x-a)(y-b) \cdot \frac{\partial^2 f(a,b)}{\partial x \partial y} \right] +$$

$$+ \dots + R_n(x,y)$$

unde:

$$R_n(x,y) = \frac{1}{(n+1)!} \left[ \frac{\partial}{\partial x}(x-a) + \frac{\partial}{\partial y}(y-b) \right]^{(n+1)} \cdot f[a + (x-a) \cdot \theta, b + (y-b) \cdot \theta],$$


$$\theta \in (0,1).$$

Egalitatea poartă denumirea de formula lui Taylor pentru funcții de două variabile.

*Demonstrație:*

$R_n(x,y)$  este dat în expresia anterioară sub forma unui operator aplicat funcției  $f$ . Operatorul este similar cu operatorul pentru determinarea diferențialei de ordinul  $n+1$  în funcțiile de două variabile.

În continuare raționamentele se fac pe segmentul ce unește pe  $(a,b)$  cu  $(x,y)$  ca în figura alăturată.



$$\text{Fie } \varphi(t) = f(a + (x-a)t, b + (y-b)t), \quad t \in [0,1].$$

$$\text{Se observă că } \varphi(0) = f(a,b) \text{ iar } \varphi(1) = f(x,y).$$

Deoarece funcția  $f(x,y)$  este derivabilă de  $n+1$  ori, rezultă că și funcția  $\varphi$  este derivabilă de  $n+1$  ori pe intervalul închis  $[0,1]$ . Deci acesteia i se aplică formula lui Mac-Laurin. Conform acestei formule se obține relația:

$$\varphi(t) = \varphi(0) + \frac{t}{1!} \cdot \varphi'(0) + \frac{t^2}{2!} \varphi''(0) + \dots + \frac{t^n}{n!} \varphi^{(n)}(0) + \frac{t^{n+1}}{(n+1)!} \varphi^{(n+1)}(\theta \cdot t),$$

$\theta \in (0,1)$ .

Dar pentru  $t = 1$  se obține:

$$f(x,y) = f(a,b) + \frac{\varphi'(0)}{1!} + \frac{\varphi''(0)}{2!} + \dots + \frac{\varphi^{(n)}(0)}{n} + \frac{\varphi^{(n+1)}(\theta)}{(n+1)!}$$

Pentru a calcula derivatele  $\varphi'(0), \varphi''(0), \dots, \varphi^{(n)}(0), \varphi^{(n+1)}(\theta)$  se calculează derivatele funcției  $\varphi(t) = f(x(t), y(t))$  consideră că o fracție compusă cu doi intermediari pe segmentul I ce unește punctul  $(a,b)$  cu un punct arbitrar  $(x,y) \in V(a,b)$  fixat, unde:

$$x(t) = a + (x - a)t$$

$$y(t) = b + (y - b)t$$

variabila independentă fiind  $t$ .

Deci  $(x(t), y(t)) \in I$ .

Ținând cont de aceasta se obține:

$$\varphi'(t) = \frac{\partial f}{\partial x}(x-a) + \frac{\partial f}{\partial y}(y-b)$$

rezultă 
$$\varphi'(0) = \frac{\partial f(a,b)}{\partial x}(x-a) + \frac{\partial f(a,b)}{\partial y}(y-b)$$

$$\varphi''(t) = \left[ \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x-a) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(y-b) \right] \cdot (x-a) + \left[ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(y-b) + \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x}(x-a) \right] (y-b)$$

Ținând cont de egalitatea derivatelor mixte se obține:

$$\varphi''(t) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2}(x-a)^2 + \frac{2\partial^2 f}{\partial x \partial y}(x-a)(y-b) + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2}(y-b)^2$$

rezultă

$$\frac{\partial^2 f(a,b)}{\partial x^2}(x-a)^2 + \frac{\partial^2 f(a,b)}{\partial x \partial y}(x-a)(y-b) + \frac{\partial^2 f(a,b)}{\partial y^2}(y-b)^2 = \varphi''(0)$$

Astfel s-a obținut al treilea termen din formula lui Taylor pentru funcții de două variabile. În mod analog se calculează  $\varphi'''(0), \dots, \varphi^{(n)}(0), \varphi^{(n+1)}(0)$  și prin înlocuire în formula lui Mac-Laurin pentru funcția  $\varphi(t)$  se obține formula lui Taylor pentru funcții de două variabile.

### Observația 7.3.1.

a) Formula lui Taylor există și pentru funcții de trei sau mai multe variabile.

b) Dacă în formula lui Taylor se consideră  $n=0$  se obține formula lui Lagrange pentru funcții de două sau mai multe variabile.

c) Folosind diferențiala formula lui Taylor pentru  $f(x,y)$  în punctul  $(a,b) \in \overset{0}{X}$  este

$$f(x,y) = f(a,b) + \frac{1}{1!} df(a,b) + \frac{1}{2!} d^2f(a,b) + \dots + \frac{1}{n!} d^n f(a,b) + R_n(x,y).$$

d) Dacă  $f(x,y)$  este diferențiabilă de  $n+1$  ori pe  $V(a,b)$  atunci  $(\forall)(x,y) \in V(a,b)$ ,  $(\exists)(\xi,\eta)$  pe segmentul ce unește pe  $(a,b)$  cu  $(x,y)$  a.î.

$$R_n(x,y) = \frac{1}{(n+1)!} d^{n+1}f(\xi,\eta).$$

## B. Puncte de extrem

În cele ce urmează se consideră  $f : X \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ , dar rezultatele obținute pentru această funcție se vor generaliza pentru funcțiile de  $n$  variabile.

### Definiția 7.3.1.

Fie  $f : X \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  și  $(a,b) \in \overset{0}{X}$ . Dacă există  $V \in \mathcal{G}(a,b)$  astfel încât:

1<sup>o</sup>  $f(a,b) - f(x,y) < 0$ , pentru orice  $(x,y) \in V$ , atunci punctul  $(a,b) \in \overset{0}{X}$  se numește punct de minim local pentru  $f(x,y)$ .

2<sup>o</sup>  $f(a,b) - f(x,y) > 0$ , pentru orice  $(x,y) \in V$ , atunci punctul  $(a,b) \in \overset{0}{X}$  se numește punct de maxim local pentru  $f(x,y)$ .

Se știe că pentru funcțiile reale de variabilă reală, minimele și maximele verifică **teorema Fermat**. Această teoremă poate fi generalizată și pentru funcțiile de mai multe variabile astfel:

### Propoziția 7.3.2. (teorema lui Fermat)

Fie  $f : X \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  și  $(a,b) \in \overset{0}{X}$  un punct de extrem local al funcției  $f(x,y)$ , atunci rezultă că  $\frac{\partial f(a,b)}{\partial x} = 0$ ,  $\frac{\partial f(a,b)}{\partial y} = 0$  (se presupune că derivatele parțiale există).

*Demonstrație:*

Dacă punctul  $(a,b)$  este un punct de extrem local al funcției  $f(x,y)$ , atunci acest punct este de extrem local și pentru funcțiile  $g(x) = f(x,b)$ ;  $h(y) = f(a,y)$ . Dar aceste funcții sunt funcții de o singură variabilă și rezultă că  $g'(a) = 0$ ;  $h'(b) = 0$ .

Deci rezultă:  $\frac{\partial f(a,b)}{\partial x} = 0$  și  $\frac{\partial f(a,b)}{\partial y} = 0$ .

**Observația 7.3.2.**

a) Ca și la funcțiile reale de variabilă reală, reciproca acestei teoreme nu este în general valabilă.

b) Punctele interioare ale lui  $X$  pentru care  $df(x,y)=0$  se numesc puncte staționare ale funcției  $f(x,y)$ .

c) Ținând cont de punctele a) și b) rezultă că mulțimea punctelor de extrem a unei funcții de mai multe variabile este inclusă în mulțimea punctelor staționare.

d) Punctele staționare ale funcției  $f(x,y)$  care nu sunt puncte de extrem se numesc puncte șa și sunt echivalente punctelor de inflexiune ale funcțiilor de variabilă reală.

**Propoziția 7.3.3. (determinarea punctelor de extrem)**

Fie  $f : X \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  o funcție ce admite derivate parțiale mixte de ordinul 2 continue pe o vecinătate  $V$  a lui  $(a,b)$  și  $(a,b) \in \overset{0}{X}$  un punct staționar. Dacă se notează

$$\Delta = \frac{\partial^2 f(a,b)}{\partial x^2} \cdot \frac{\partial^2 f(a,b)}{\partial y^2} - \left[ \frac{\partial^2 f(a,b)}{\partial x \partial y} \right]^2, \text{ atunci:}$$

1<sup>o</sup> Pentru  $\Delta > 0$  și  $\frac{\partial^2 f(a,b)}{\partial x^2} < 0$  rezultă că  $(a,b)$  punct de maxim local.

2<sup>o</sup> Pentru  $\Delta > 0$  și  $\frac{\partial^2 f(a,b)}{\partial x^2} > 0$  rezultă că  $(a,b)$  punct de minim local.

3<sup>o</sup> Pentru  $\Delta < 0$  rezultă că  $(a,b)$  nu este punct de extrem.

*Demonstrație:*

Se consideră formula lui Taylor de ordinul 2 pentru funcția  $f(x,y)$

$$f(x,y) = f(a,b) + \frac{1}{1!} \left[ \frac{\partial f(a,b)}{\partial x} \cdot (x-a) + \frac{\partial f(a,b)}{\partial y} \cdot (y-a) \right] + \\ + \frac{1}{2!} \left[ \frac{\partial^2 f(a,b)}{\partial x^2} \cdot (x-a)^2 + 2(x-a)(y-b) \cdot \frac{\partial^2 f(a,b)}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 f(a,b)}{\partial y^2} \cdot (y-b)^2 \right] + R_2(x,y)$$

Ținând cont de faptul că  $(a,b)$  este punct staționar și  $\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ y \rightarrow b}} R_2(x,y) = 0$

rezultă:

$$f(x,y) = f(a,b) + \frac{1}{2} \cdot \frac{\partial^2 f(a,b)}{\partial x^2} \cdot (x-a)^2 + (x-a)(y-b) \cdot \frac{\partial^2 f(a,b)}{\partial x \partial y} + \frac{1}{2} \cdot \frac{\partial^2 f(a,b)}{\partial y^2} \cdot (y-b)^2$$

pentru orice  $(x,y) \in V$ , unde  $V$  este o vecinătate foarte mică a punctului  $(a,b)$ .

Dacă se notează:

$$\frac{\partial^2 f(a,b)}{\partial x^2} = a_{11};$$

$$\frac{\partial^2 f(a,b)}{\partial x \partial y} = a_{12};$$

$$\frac{\partial^2 f(a,b)}{\partial y^2} = a_{22}$$

rezultă:

$$E = f(x,y) - f(a,b) = \frac{1}{2} \cdot (y-b)^2 \left[ a_{11} \left( \frac{x-a}{y-b} \right)^2 + 2a_{12} \frac{x-a}{y-b} + a_{22} \right].$$

Se observă că pe vecinătatea  $V$  a punctului  $(a,b)$  semnul expresiei  $E$  este dat de expresia din paranteza dreaptă. Dar această expresie poate fi considerată un trinom de gradul 2 în variabila  $t = \frac{x-a}{y-b}$ .

$$\text{Cum } D = 4a_{12}^2 - 4a_{11} \cdot a_{22} = -4\Delta.$$

Dacă  $D < 0$ , (atunci  $\Delta > 0$ ) trinomul are peste tot semnul lui  $a_{11}$ .

Deci cu alte cuvinte, dacă:

$$1^0 \Delta > 0 \text{ și } a_{11} = \frac{\partial^2 f(a,b)}{\partial x^2} < 0$$

rezultă

$$f(x,y) - f(a,b) < 0$$

adică punctul  $(a,b)$  este un punct de maxim.

$$2^0 \Delta > 0 \text{ și } a_{11} = \frac{\partial^2 f(a,b)}{\partial x^2} > 0$$

rezultă

$$f(x,y) - f(a,b) > 0$$

adică punctul  $(a,b)$  este un punct de minim.

3<sup>0</sup> Pentru  $\Delta < 0$ ,  $f(x,y) - f(a,b)$  are variație de semn pe vecinătatea  $V$ , deci punctul  $(a,b)$  nu mai este punct de extrem.

### Observația 7.3.3.

a) Dacă  $\Delta = 0$  nu se poate afirma nimic despre natura punctului  $(a,b)$ , adică  $(a,b)$  poate fi punct de extrem sau nu. Această afirmație rezultă din exemplul următor.

- Se consideră funcțiile  $f(x,y) = x^2 + y^4$  și  $g(x,y) = x^2 + y^3$  și se consideră  $(a,b) = (0,0)$ . Se observă că  $(0,0)$  este punct de minim pentru  $f(x,y)$  și nu este punct de extrem pentru  $g(x,y)$ , dar în ambele cazuri  $\Delta = 0$ .

b) Propoziția anterioară este valabilă și pentru funcțiile de trei sau mai multe variabile. În cazul în care  $(a_1, a_2, \dots, a_n) \in \overset{0}{X}$  este punct staționar pentru funcția  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ . Se face notația  $a_{ij} = \frac{\partial^2 f(a_1, a_2, \dots, a_n)}{\partial x_i \partial x_j}$ .

Propoziția 7.3.3 se generalizează pentru funcții de  $n$  variabile și are următoarea formă:

**Propoziția 7.3.4. (teorema lui Sylvester)**

Fie  $f : X \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$  și  $(a_1, a_2, \dots, a_n) \in \overset{0}{X}$  punct staționar al funcției  $f(\bar{x})$ .

Atunci:

$$1^0 \quad \text{Pentru} \quad a_{11} > 0, \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} > 0, \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} > 0, \quad \dots,$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} > 0$$

punctul  $(a_1, a_2, \dots, a_n)$  este punct de minim local pentru  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ .

$$2^0 \text{ Pentru } a_{11} < 0, \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} > 0, \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} < 0, \quad \dots,$$

$$(-1)^n \cdot \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1n} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ a_{n1} & a_{n2} & \dots & a_{nn} \end{vmatrix} > 0$$

punctul  $(a_1, a_2, \dots, a_n)$  este punct de maxim local pentru funcția  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ .

**Exemplu:**

Să se determine punctele de extrem ale funcției:

$$f : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x, y, z) = 2x^2 + 2y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2(x + y + z) + 7$$

Rezolvare:

Algoritmul de determinare a punctelor de extrem pentru funcțiile de mai multe variabile are două etape distincte:

I. Determinarea punctelor staționare ale funcției  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  se face

$$\text{rezolvând sistemul } \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x_1} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial x_2} = 0 \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} = 0 \end{cases}$$

II. Separarea punctelor de extrem din mulțimea punctelor staționare, se face folosind **teorema Sylvester**. Concret din exemplul dat rezultă:

$$\text{I. } \begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial z} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} 4x + 2y + 2 = 0 \\ 4y + 2x + 2z + 2 = 0 \\ 2z + 2y + 6 = 0 \end{cases}$$

Acest sistem are soluția  $(-3, 5, -8)$  ( $x = -3, y = 5, z = -8$ ).

Deci mulțimea punctelor staționare are doar un singur element.

II. Se verifică cu ajutorul **teoremei Sylvester** dacă punctul  $(-3, 5, -8)$  este punct de extrem. Pentru aceasta este nevoie de numerele  $a_{ij}$  care reprezintă valorile derivatelor de ordinul 2 și derivatelor mixte de ordinul 2 în punctul  $(-3, 5, -8)$  și astfel se obține:  $a_{11} = 4$ ;  $a_{21} = a_{12} = 2$ ;  $a_{22} = 4$ ;  $a_{13} = a_{31} = 0$ ;  $a_{23} = a_{32} = 2$ ;  $a_{33} = 2$ .

Dar

$$a_{11} = 4 > 0; \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 2 \\ 2 & 4 \end{vmatrix} = 12 > 0; \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} 4 & 2 & 0 \\ 2 & 4 & 2 \\ 0 & 2 & 2 \end{vmatrix} = 8 > 0.$$

Conform **teoremei Sylvester** rezultă  $(-3, 5, -8)$  este un minim local al funcției  $f(x, y, z)$ .

**Observația 7.3.4.** Exercițiul anterior poate fi enunțat și sub forma:

Să se arate că  $2x^2 + 2y^2 + z^2 + 2xy + 2yz + 2(x + y + z) - 40 > 0$ , pentru orice  $(x, y, z) \in \mathbb{R}^3$ .

În cele ce urmează se pune problema aflării punctelor de extrem cu legături pentru o funcție cu  $n$  variabile, dându-se algoritmul de rezolvare al acestei probleme. Problema se formulează astfel:

• Să se afle punctele de extrem pentru funcția  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$ , știind că acestea îndeplinesc condițiile:

$$1^0 \begin{cases} \varphi_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ \varphi_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ \varphi_m(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \end{cases}$$

$2^0 m < n$

$$3^0 \frac{\Delta(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_m)}{\Delta(x_1, x_2, \dots, x_m)} \neq 0; \quad \frac{\Delta(\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_m)}{\Delta(x_1, x_2, \dots, x_m)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial \varphi_1}{\partial x_m} \\ \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial \varphi_2}{\partial x_m} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_1} & \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial \varphi_m}{\partial x_m} \end{vmatrix}$$

Condițiile din această problemă mai poartă denumirea și de legături pentru puncte de extrem. Pentru a rezolva această problemă se urmărește următorul algoritm:

1<sup>0</sup> Se construiește funcția lui Lagrange:

$$\phi(x_1, x_2, \dots, x_n, \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_m) = f(x_1, x_2, \dots, x_n) + \sum_{i=1}^m \lambda_i \varphi_i(x_1, x_2, \dots, x_n) = F(\bar{x})$$

unde  $\lambda_i$   $i = \overline{1, m}$  sunt variabile noi și poartă denumirea de multiplicatorii lui Lagrange. ( $\bar{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ ).

2<sup>0</sup> Se determină punctele staționare ale funcției lui Lagrange.

3<sup>0</sup> Fie  $(a_1, a_2, \dots, a_n, \mu_1, \mu_2, \dots, \mu_m)$  unul din punctele staționare ale funcției lui Lagrange (punctul  $(a_1, a_2, \dots, a_n)$  este punct staționar al funcției  $f(\bar{x})$ ). Se află diferențiala  $d^2F(\bar{x})$  ( $F(\bar{x}) = \Phi(x_1, x_2, \dots, x_n, \mu_1, \mu_2, \dots, \mu_m)$ ).

$$4^0 \text{ Se rezolvă sistemul } \begin{cases} d\varphi_1(a_1, a_2, \dots, a_n) = 0 \\ d\varphi_2(a_1, a_2, \dots, a_n) = 0 \\ \vdots \\ d\varphi_m(a_1, a_2, \dots, a_n) = 0 \end{cases}$$

în care necunoscute sunt  $dx_1, dx_2, \dots, dx_m, dx_{m+1}, \dots, dx_n$ .

Se exprimă  $dx_1, dx_2, \dots, dx_m$  în funcție de celelalte necunoscute  $dx_{m+1}, \dots, dx_n$ .

5<sup>0</sup> Cu aceste valori se vine în diferențiala de la punctul 3<sup>0</sup>, în care se înlocuiesc și  $x_1, x_2, \dots, x_n$  cu  $a_1, a_2, \dots, a_n$  și se obține următoarea egalitate:



$$d^2F(a_1, a_2, \dots, a_n) = \sum_{i,j=m+1}^n a_{ij} dx_i dx_j$$

care este o formă pătratică.

6<sup>o</sup> Acestei forme pătratice i se aplică teorema lui Sylvester pentru a decide natura punctului staționar  $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ . Dacă  $\sum_{i,j=m+1}^n a_{ij} dx_i dx_j$  este pozitiv (negativ) definită punctul  $(a_1, a_2, \dots, a_n)$  este punct de minim (maxim) al lui  $f(\bar{x})$  ce verifică legăturile.

**Observația 7.3.5.** Etapele acestui algoritm sunt prezentate pe larg în capitolul 8 paragraful 5.

**Exemplu:**

Să se afle paralelipipedul de volumul maxim ale cărui dimensiuni sunt supuse condițiilor:

$$\begin{cases} x + y - z = 4 \\ x - y - z = 8 \end{cases}$$

Rezolvare:

Din punct de vedere matematic problema mai poate fi enunțată și astfel:

Să se afle punctele de extrem ale funcției  $f(x, y, z) = x \cdot y \cdot z$  care

îndeplinesc condițiile:

$$\begin{cases} x + y - z = 4 \\ x - y - z = 8 \end{cases}$$

Pentru rezolvarea acestei probleme se folosește algoritmul prezentat.

1<sup>o</sup> Se construiește **funcția lui Lagrange**:

$\phi(x, y, z, \lambda_1, \lambda_2) = f(x, y, z) + \lambda_1 \cdot \varphi_1(x, y, z) + \lambda_2 \varphi_2(x, y, z)$  și se obține:

$$\phi(x, y, z) = x \cdot y \cdot z + \lambda_1(x + y - z - 4) + \lambda_2(x - y - z - 8)$$

2<sup>o</sup> Se determină punctele staționare ale acestei funcții, rezolvând următorul sistem:

$$\begin{cases} \frac{\partial \phi}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial \phi}{\partial y} = 0 \\ \frac{\partial \phi}{\partial z} = 0 \\ \frac{\partial \phi}{\partial \lambda_1} = 0 \\ \frac{\partial \phi}{\partial \lambda_2} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} yz + \lambda_1 + \lambda_2 = 0 \\ xz + \lambda_1 - \lambda_2 = 0 \\ xy - \lambda_1 - \lambda_2 = 0 \\ x + y - z - 4 = 0 \\ x - y - z - 8 = 0 \end{cases}$$

$$\text{Soluția acestui sistem este: } \begin{cases} x = 3 \\ y = -2 \\ z = -3 \\ \lambda_1 = \frac{3}{2} \\ \lambda_2 = -\frac{15}{2} \end{cases}$$

Deci funcția lui Lagrange admite un singur punct staționar și acesta este  $\left(3, -2, -3, \frac{3}{2}, -\frac{15}{2}\right)$ .

$$\begin{aligned} 3^0 F(x, y, z) &= \phi\left(x, y, z, \frac{3}{2}, -\frac{15}{2}\right) = x \cdot y \cdot z + \frac{3}{2}x + \frac{3}{2}y - \frac{3}{2}z - 6 - \frac{15}{2}x + \\ &+ \frac{15}{2}y + \frac{15}{2}z + 60 = x \cdot y \cdot z - 6x + 9y + 6z + 54. \end{aligned}$$

Acestei funcții îi aflăm diferențiala de ordinul II.

$$d^2F(x, y, z) = \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} dx^2 + \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} dy^2 + \frac{\partial^2 F}{\partial z^2} dz^2 + \frac{2\partial^2 F}{\partial x \partial y} dx dy + \frac{2\partial^2 F}{\partial x \partial z} dx dz + \frac{2\partial^2 F}{\partial y \partial z} dy dz$$

$$\text{Deci } d^2F(x, y, z) = 2dx dy + 2dx dz + 2dy dz.$$

4<sup>0</sup> Se rezolvă sistemul

$$\begin{cases} d\phi_1(3, -2, -3) = 0 \\ d\phi_2(3, -2, -3) = 0 \end{cases} \Leftrightarrow \begin{cases} dx + dy - dz = 0 \\ dx - dy - dz = 0 \end{cases}$$

$$2dx - 2dy = 0 \Rightarrow dx = dz$$

$$2dy = 0 \Rightarrow dy = 0$$

Se înlocuiește  $dy = 0$  și  $dz = dx$   $x = 3$ ,  $y = -2$ ;  $z = -3$  în diferențiala de la punctul 3<sup>0</sup> și se obține

$$d^2F(3, -2, -3) = 2dx dz \Rightarrow d^2F(3, -2, -3) = 2dz^2 \Rightarrow d^2\phi(3, -2, -3) > 0$$

rezultă că punctul staționar determinat este un punct de minim al funcției  $f(x, y, z) = x \cdot y \cdot z$  ce verifică legăturile date.

## 4. Exerciții rezolvate

**Exercițiul 7.4.1.** Folosind definiția derivatei să se calculeze derivatele următoarelor funcții:

$$\text{a) } F(x) = \left( \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}}, \frac{1}{\cos^n x} \right)$$

$$b) F(x) = \left( \arccos \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}, \operatorname{arctg} \frac{x}{1-x} \right)$$

**Rezolvare:**

Se observă că funcțiile date sunt funcții vectoriale de variabilă reală de forma  $F(x) = (f_1(x), f_2(x))$ . Derivata funcțiilor are sens numai în domeniul de definiție. Dacă  $x_0$  este un punct al domeniului de definiție, atunci se știe că  $F(x)$  este derivabilă în acest punct dacă există și este finită

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} \text{ și această limită este } F'(x_0).$$

$$a) F(x) = (f_1^3(x), f_2(x)) \text{ unde } f_1^3(x) = \sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} \text{ și } f_2(x) = \frac{1}{\cos^n x}.$$

$$F : D = [0, \infty) \cap \left[ \mathbb{R} \setminus \left\{ \frac{\pi}{2} + k\pi \right\} \right]_{k \in \mathbb{Z}} \rightarrow \mathbb{R}^2$$

$$\text{Fie } x_0 \in D \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \left( \frac{f_1^3(x) - f_1^3(x_0)}{x - x_0}, \frac{f_2(x) - f_2(x_0)}{x - x_0} \right)$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1^3(x) - f_1^3(x_0)}{x - x_0} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\sqrt{x + \sqrt{x + \sqrt{x}}} - \sqrt{x_0 + \sqrt{x_0 + \sqrt{x_0}}}}{x - x_0} = \\ &= \frac{1}{2f_1^3(x_0)} + \frac{1}{2f_1^2(x_0)} + \frac{1}{2f_1^1(x_0)} \quad (\text{cifrele indice superior reprezintă numărul} \\ &\text{radicalilor}) \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} \bullet \quad \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_2(x) - f_2(x_0)}{x - x_0} &= \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\frac{1}{\cos^n x} - \frac{1}{\cos^n x_0}}{x - x_0} = \frac{1}{\cos^n x_0} \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\cos^n x_0 - \cos^n x}{\cos^n x (x - x_0)} = \\ &= \frac{n \sin x_0}{\cos^n x_0} \cdot \cos^{n-1} x_0 = n \cdot \operatorname{tg} x_0 \end{aligned}$$

$$\text{Deci } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} = \left( \frac{1}{2} \sum_{k=1}^3 \frac{1}{f_1^k(x_0)}, n \cdot \frac{\operatorname{tg} x_0}{\cos^n x_0} \right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow F'(x_0) = \left( \frac{1}{2} \sum_{k=1}^3 \frac{1}{f_1^k(x_0)}, n \cdot \frac{\operatorname{tg} x_0}{\cos^n x_0} \right).$$

Cum  $x_0$  a fost ales arbitrar în domeniul de definiție rezultă că

$$F'(x) = \left( \frac{1}{2} \sum_{k=1}^3 \frac{1}{f_1^k(x)}, \frac{n \operatorname{tg} x}{\cos^n x} \right).$$

**Observație.** Se poate generaliza luând  $f_1^n(x) = \sqrt{x + \sqrt{x + \dots + \sqrt{x}}}$   $n$  radicali și atunci  $F'(x) = \left( \frac{1}{2} \sum_{k=1}^n \frac{1}{f_1^k(x)}, \frac{n \operatorname{tg} x}{\cos^n x} \right)$

b)  $F(x) = (f_1(x), f_2(x))$  unde  $f_1(x) = \arccos \frac{x}{\sqrt{1+x^2}}$ ,  $f_2(x) = \operatorname{arctg} \frac{x}{1+x}$

$F: D = \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}^2$ .

Fie  $x_0 \in \mathbb{R}_+$ . Atunci  $\frac{x_0}{\sqrt{1+x_0^2}} \in [0,1)$  și  $\frac{x_0}{1+x_0} \in [0,1)$

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \left( \frac{f_1(x) - f_1(x_0)}{x - x_0}, \frac{f_2(x) - f_2(x_0)}{x - x_0} \right)$$

- $$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1(x) - f_1(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\arccos \frac{x}{\sqrt{1+x^2}} - \arccos \frac{x_0}{\sqrt{1+x_0^2}}}{x - x_0}$$

Se știe că  $\arccos \alpha - \arccos \beta = \arcsin(\beta - \sqrt{1-\alpha^2} - \alpha\sqrt{1-\beta^2})$   
 $(\forall) \alpha, \beta \in [0,1)$ .

Deci 
$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_1(x) - f_1(x_0)}{x - x_0} = - \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\arcsin \frac{x - x_0}{\sqrt{(1+x_0^2)(1+x^2)}}}{x - x_0} = - \frac{1}{1+x_0^2}$$

- $$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_2(x) - f_2(x_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\operatorname{arctg} \frac{x}{1+x} - \operatorname{arctg} \frac{x_0}{1+x_0}}{x - x_0}$$

Se știe că  $\operatorname{arctg} \alpha - \operatorname{arctg} \beta = \operatorname{arctg} \frac{\alpha - \beta}{1 + \alpha \cdot \beta}$   $(\forall) \alpha, \beta > 0$ .

Deci 
$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f_2(x) - f_2(x_0)}{x - x_0} = - \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\operatorname{arctg} \frac{x - x_0}{xx_0 + (1+x)(1+x_0)}}{x - x_0} = - \frac{1}{1+2x_0+2x_0^2}$$

Deci

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{F(x) - F(x_0)}{x - x_0} = \left( -\frac{1}{1+x_0^2}, \frac{1}{1+2x_0+2x_0^2} \right) \Rightarrow$$

$$F'(x_0) = \left( \frac{-1}{1+x_0^2}, \frac{1}{1+2x_0+2x_0^2} \right)$$

Cum  $x_0$  a fost ales arbitrar în domeniul de definiție rezultă că

$$F'(x) = \left( \frac{-1}{1+x^2}, \frac{1}{1+2x+2x^2} \right)$$

**Exercițiul 7.4.2.** Fie  $f_k : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$   $k = \overline{0, m}$  funcții continue pe  $[a, b]$  și derivabile pe  $(a, b)$  și  $a \leq x_1 < x_2 < \dots < x_m \leq b$ . Să se arate că există  $\xi \in (x_k, x_{k+1})$

$$k = \overline{1, m-1} \text{ a.î. } \begin{vmatrix} f'_0(\xi) & f'_1(\xi) & \dots & f'_m(\xi) \\ f_0(x_1) & f_1(x_1) & \dots & f_m(x_1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_0(x_m) & f_1(x_m) & \dots & f_m(x_m) \end{vmatrix} = 0$$

**Rezolvare:**

Se consideră funcția

$$F(x) = \begin{vmatrix} f_0(x) & f_1(x) & \dots & f_m(x) \\ f_0(x_1) & f_1(x_1) & \dots & f_m(x_1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_0(x_m) & f_1(x_m) & \dots & f_m(x_m) \end{vmatrix}$$

Se observă că  $F(x)$  este o funcție Rolle pe intervalul  $[x_k, x_{k+1}]$   $(\forall) k = \overline{1, m-1}$ . Deci există  $\xi \in (x_k, x_{k+1})$  a.î.  $F'(\xi) = 0$ .

Dar dacă  $D(x) = \begin{vmatrix} f_{ij}(x) \end{vmatrix}_{\substack{0 \leq i \leq n \\ 0 \leq j \leq n}}$  unde  $f_{ij}(x)$  sunt derivabile, atunci  $D(x)$  este o funcție derivabilă. Se notează  $D_{L_i}(x)$  funcția ce se obține din  $D(x)$  prin derivarea liniei  $i$ . Atunci  $D'(x) = \sum_{i=1}^n D_{L_i}(x)$ . Ținând cont de acest rezultat, rezultă că  $F'(x)$

$$\text{este } F'(x) = \begin{vmatrix} f'_0(x) & f'_1(x) & \dots & f'_m(x) \\ f_0(x_1) & f_1(x_1) & \dots & f_m(x_1) \\ \vdots & \vdots & & \vdots \\ f_0(x_m) & f_1(x_m) & \dots & f_m(x_m) \end{vmatrix} \text{ și exercițiul este rezolvat.}$$

**Exercițiul 7.4.3.** Fie  $F : \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$   $F(x) = (\cos(ax \pm b), \sin(ax \pm b))$ . Să se arate că  $F(x)$  este indefinit derivabilă și să se calculeze  $F^{(n)}(x)$ .

**Rezolvare:**

Dacă  $F(x) = (f_1(x), f_2(x))$  este indefinit derivabilă dacă funcțiile  $f_1(x)$  și  $f_2(x)$  sunt indefinit derivabile și  $F^{(n)}(x) = (f_1^{(n)}(x), f_2^{(n)}(x))$   $(\forall) n \geq 1; n \in \mathbb{N}$ .

$f_i : \mathbb{R} \rightarrow [-1, 1]$ ,  $i = \overline{1, 2}$  unde  $f_1(x) = \cos(ax \pm b)$  și  $f_2(x) = \sin(ax \pm b)$  sunt indefinit derivabile, deci  $F(x) = (\cos(ax \pm b), \sin(ax \pm b))$  este indefinit derivabilă.

$$f_1(x) = \cos(ax \pm b); f_1'(x) = -a \sin(ax \pm b) = -a \cos(ax \pm b + \frac{\pi}{2})$$

$$f_1''(x) = a^2 \sin(ax \pm b + \frac{\pi}{2}) = a^2 \cos(ax \pm b + \frac{2\pi}{2}).$$

Se observă că  $f_1^{(n)}(x) = a^n \cos(ax \pm b + \frac{n\pi}{2})$ . Se presupune această lege adevărată și se demonstrează că  $f_1^{(n+1)}(x) = a^{n+1} \cos(ax \pm b + \frac{n+1}{2} \cdot \pi)$ .

$$\begin{aligned} f_1^{(n+1)}(x) &= (f_1^{(n)}(x))' = \left[ a^n \cdot \cos(ax \pm b + \frac{n\pi}{2}) \right]' = -a^{n+1} \cdot \sin(ax \pm b + \frac{n\pi}{2}) = \\ &= a^{n+1} \cdot \cos(ax \pm b + \frac{(n+1)\pi}{2}). \end{aligned}$$

Deci conform inducției rezultă că  $f_1^{(n)}(x) = a^n \cos(ax \pm b + \frac{n\pi}{2})$  ( $\forall n \in \mathbb{N}$ ).

Analog se procedează cu  $f_2(x)$  și se obține  $f_2^{(n)}(x) = a^n \sin(ax \pm b + \frac{n\pi}{2})$ .

$$\text{Deci } F(x) = \left( a^n \cdot \cos(ax \pm b + \frac{n\pi}{2}), a^n \cdot \sin(ax \pm b + \frac{n\pi}{2}) \right).$$

**Exercițiul 7.4.4.** Fie  $D = \{x \in \mathbb{R} \mid ax \pm b > 0\}$  și  $F: D \rightarrow \mathbb{R}^2$  unde  $F(x) = \left( \frac{1}{ax \pm b}, \ln(ax \pm b) \right)$ .

Să se arate că  $F(x)$  este indefinit derivabilă și să se calculeze  $F^{(n)}(x)$ .

**Rezolvare:**

Funcțiile  $f_1(x) = \frac{1}{ax \pm b}$  și  $f_2(x) = \ln(ax \pm b)$  sunt indefinit derivabile, deci funcția  $F(x)$  este indefinit derivabilă și  $F^{(n)}(x) = (f_1^{(n)}(x), f_2^{(n)}(x))$ .

$$f_1'(x) = \frac{-a}{(ax \pm b)^2}; f_1''(x) = \frac{1 \cdot 2a^2}{(ax \pm b)^3}; f_1'''(x) = \frac{-1 \cdot 2 \cdot 3a^3}{(ax \pm b)^4}, \dots$$

Se presupune că  $f_1^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n \cdot n! a^n}{(ax \pm b)^{n+1}}$  este adevărată și se demonstrează că  $f_1^{(n+1)}(x) = \frac{(-1)^{n+1} \cdot (n+1)! a^{n+1}}{(ax \pm b)^{n+2}}$ .

Într-adevăr:

$$f_1^{(n+1)}(x) = (f_1^{(n)}(x))' = \left( \frac{(-1)^n \cdot n! a^n}{(ax \pm b)^{n+1}} \right)' = \frac{(-1)^{n+1} \cdot (n+1)! a^{n+1}}{(ax \pm b)^{n+2}}. \text{ Atunci conform cu}$$

principiul inducției  $f_1^{(n)}(x) = \frac{(-1)^n \cdot n! a^n}{(ax \pm b)^{n+1}}$

$$f_2'(x) = \frac{a}{ax \pm b}; f_2''(x) = \frac{-a^2}{(ax \pm b)^2}; f_2'''(x) = \frac{1 \cdot 2 \cdot 3a^3}{(ax \pm b)^3}, \dots,$$

Se presupune că  $f_2^{(n)}(x) = \frac{(-1)^{n+1} \cdot (n-1)! a^n}{(ax \pm b)^n}$  este adevărată și se demonstrează că  $f_2^{(n+1)}(x) = \frac{(-1)^{n+2} \cdot n! a^{n+1}}{(ax \pm b)^{n+1}}$ .

Într-adevăr:

$f_2^{(n+1)}(x) = (f_2^{(n)}(x))' = \left( \frac{(-1)^{n+1} \cdot (n-1)! a^n}{(ax \pm b)^n} \right)' = \frac{(-1)^{n+2} \cdot n! a^{n+1}}{(ax \pm b)^{n+1}}$ . Așadar conform cu principiul inducției  $f_2^{(n)}(x) = \frac{(-1)^{n+1} \cdot (n-1)! a^n}{(ax \pm b)^n}$  ( $\forall n \in \mathbb{N}$ ).

$$\text{Atunci } F^{(n)}(x) = \left( \frac{(-1)^n \cdot n! a^n}{(ax \pm b)^{n+1}}, \frac{(-1)^{n+1} \cdot (n-1)! a^n}{(ax \pm b)^n} \right).$$

**Exercițiul 7.4.5.** Fie  $f(x, y, z)$  o funcție omogenă de ordinul  $n$ , ce admite derivate parțiale de ordinul doi continue.

Să se arate că:

$$x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + z^2 \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} + 2xy \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + 2xz \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z} + 2yz \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} = n(n-1) \cdot f(x, y, z).$$

(Relația Euler de ordin doi pentru funcții de două variabile).

**Rezolvare:**

Conform relației lui Euler se obține:

$$(n-1) \cdot x \frac{\partial f}{\partial x} + (n-1) \cdot y \frac{\partial f}{\partial y} + (n-1) \cdot z \frac{\partial f}{\partial z} = n(n-1) \cdot f(x, y, z).$$

(1)

Funcțiile  $\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}, \frac{\partial f}{\partial z}$  sunt omogene de ordinul  $(n-1)$ . Deoarece  $f(x, y, z)$  este omogenă de ordin  $n$  are loc egalitatea  $f(tx, yt, tz) = t^n \cdot f(x, y, z)$ . Se derivează egalitatea în raport cu  $x$  și se obține:  $f'_x(tx, yt, tz) = t^n \cdot f'_x(x, y, z) \Rightarrow f'_x(tx, ty, tz) = t^{n-1} \cdot f'_x(x, y, z)$ . De aici rezultă că  $\frac{\partial f}{\partial x}$  este omogenă de ordin  $(n-1)$ .

Analog se arată că  $\frac{\partial f}{\partial y}$  și  $\frac{\partial f}{\partial z}$  sunt omogene de ordinul  $(n-1)$ . Așadar funcțiile

$\frac{\partial f}{\partial x}, \frac{\partial f}{\partial y}$  și  $\frac{\partial f}{\partial z}$  verifică relația lui Euler și se obține:

$$x \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + y \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + z \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z} = (n-1) \cdot f'_x(x, y, z)$$

(2)

$$x \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} + y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + z \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} = (n-1) \cdot f'_y(x, y, z)$$

(3)

$$x \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial x} + y \frac{\partial^2 f}{\partial z \partial y} + z \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = (n-1) \cdot f'_z(x, y, z)$$

(4)

Înmulțind relația (2) cu  $x$ , relația (3) cu  $y$ , relația (4) cu  $z$ , adunând relațiile obținute și ținând cont de relația (1) se obține

$$x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} + y^2 \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} + z^2 \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} + 2xy \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} + 2xz \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z} + 2yz \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} = n(n-1) \cdot f(x, y, z).$$

**Observație.** Dacă funcția  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  este omogenă de ordin  $n$  și admite derivate parțiale mixte de ordinul doi continue atunci

$$\sum_{k=1}^n x_k^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x_k^2} + 2 \sum_{k \neq j} x_k x_j \frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_j} = n(n-1) \cdot f(x_1, x_2, \dots, x_n).$$

**Exercițiul 7.4.6.** Fie  $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{1}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}}$ . Să se calculeze:

$$\sum_{k=1}^n x_k^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x_k^2} + 2 \sum_{k \neq j} x_k x_j \frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_j}$$

**Rezolvare:**

Se observă că funcția este omogenă de ordin  $n = -1$ . Conform cu exercițiul 7.4.5,  $\sum_{k=1}^n x_k^2 \frac{\partial^2 f}{\partial x_k^2} + 2 \sum_{k \neq j} x_k x_j \frac{\partial^2 f}{\partial x_k \partial x_j} = \frac{2}{\sqrt{x_1^2 + x_2^2 + \dots + x_n^2}}$ .

**Exercițiul 7.4.7.** Fie  $f(x, y) = \arcsin \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}$ . Să se arate, folosind definiția derivatelor parțiale că  $f(x, y)$  este derivabilă parțial în raport cu  $x$  și  $n$  în raport cu  $y$  în orice punct  $(x_0, y_0) \in \mathbb{R}^{*2}$  și să se calculeze  $\frac{\partial f(x, y)}{\partial x}$  și  $\frac{\partial f(x, y)}{\partial y}$ .

**Rezolvare:**

•  $f(x, y)$  este derivabilă în raport cu  $x$  în punctul  $(x_0, y_0)$  dacă  $\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0}$  există și este finită și această limită este chiar  $\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x}$ .

$$\lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\arcsin \frac{x}{\sqrt{x^2 + y_0^2}} - \arcsin \frac{x_0}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2}}}{x - x_0}. \quad \text{Se știe că}$$

$\arcsin \alpha - \arcsin \beta = \arcsin(\alpha \sqrt{1 - \beta^2} - \beta \sqrt{1 - \alpha^2}) \quad (\forall) \alpha, \beta \in (0, 1)$ . Se observă că

$$(\forall) (x_0, y_0) \in \mathbb{R}^{*2} \quad \frac{x_0}{\sqrt{x_0^2 + y_0^2}} \in (0, 1).$$



$$\text{Deci } \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{f(x, y_0) - f(x_0, y_0)}{x - x_0} = \lim_{x \rightarrow x_0} \frac{\arcsin(x - x_0) \cdot \frac{y_0}{\sqrt{(x^2 + y_0^2)(x_0^2 + y_0^2)}}}{x - x_0} = \frac{x_0^2 + y_0^2}{y_0}$$

Deci această limită există și este finită, ceea ce arată că funcția  $f(x, y) = \arcsin \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}$  este derivabilă parțial în raport cu  $x$  în  $(x_0, y_0) \neq (0, 0)$  și

$$\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial x} = \frac{x_0^2 + y_0^2}{y_0}. \text{ Cum } (x_0, y_0) \text{ a fost ales arbitrar se obține:}$$

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial x} = \frac{x^2 + y^2}{y}.$$

$$\bullet \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{f(x_0, y) - f(x_0, y_0)}{y - y_0} = \lim_{y \rightarrow y_0} \frac{\arcsin(y_0 - y) \cdot x \frac{y_0}{\sqrt{(x_0^2 + y_0^2)(x_0^2 + y^2)}}}{y - y_0} = \frac{x_0^2 + y_0^2}{x_0}.$$

Cum  $(x_0, y_0) \neq (0, 0)$  limita există și este finită, ceea ce arată că funcția  $f(x, y) = \arcsin \frac{x^2}{\sqrt{x^2 + y^2}}$  este derivabilă parțial în raport cu  $y$  și

$$\frac{\partial f(x_0, y_0)}{\partial y} = -\frac{x_0^2 + y_0^2}{x_0}. \text{ Cum } (x_0, y_0) \neq (0, 0) \text{ a fost ales arbitrar rezultă că}$$

$$\frac{\partial f(x, y)}{\partial y} = -\frac{x^2 + y^2}{x}.$$

**Exercițiul 7.4.8.** Să se calculeze derivatele parțiale indicate pentru fiecare funcție în parte:

$$a) \frac{\partial^n f(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_i^n}; f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \cos\left(\sum_{k=1}^n a_k x_k\right)$$

$$b) \frac{\partial^n f(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_i^n}; f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \sin\left(\sum_{k=1}^n a_k x_k\right)$$

$$c) \frac{\partial^n f(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_i^n}; f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{1}{\sum_{k=1}^n a_k x_k}$$

$$d) \frac{\partial^n f(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_i^n}; f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \ln\left(\sum_{k=1}^n a_k x_k\right)$$

Pentru aceleași funcții să se calculeze derivata  $\frac{\partial^{n+m} f(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_i^n \partial x_j^m}$ .

**Rezolvare:**

Se notează  $\bar{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ .

$$a) \frac{\partial f(\bar{x})}{\partial x_i} = -a_i \sin\left(\sum_{k=1}^n a_k x_k\right) = +a_i \cos\left(\sum_{k=1}^n a_k x_k + \frac{\pi}{2}\right)$$

$$\frac{\partial^2 f(\bar{x})}{\partial x_i^2} = -a_i^2 \sin\left(\sum_{k=1}^n a_k x_k + \frac{\pi}{2}\right) = a_i^2 \cos\left(\sum_{k=1}^n a_k x_k + 2 \cdot \frac{\pi}{2}\right)$$

Se consideră  $\frac{\partial^n f(\bar{x})}{\partial x_i^n} = a_i^n \cos\left(\sum_{k=1}^n a_k x_k + n \cdot \frac{\pi}{2}\right)$  și se demonstrează că

$$\frac{\partial^{n+1} f(\bar{x})}{\partial x_i^{n+1}} = a_i^{n+1} \cos\left(\sum_{k=1}^n a_k x_k + (n+1) \frac{\pi}{2}\right).$$

Într-adevăr

$$\frac{\partial^{n+1} f(\bar{x})}{\partial x_i^{n+1}} = \frac{\partial}{\partial x_i} \left( \frac{\partial^n f(\bar{x})}{\partial x_i^n} \right) = -a_i^{n+1} \sin\left(\sum_{k=1}^n a_k x_k + n \frac{\pi}{2}\right) = a_i^{n+1} \cos\left(\sum_{k=1}^n a_k x_k + (n+1) \frac{\pi}{2}\right).$$

Atunci conform principiului inducției  $\frac{\partial^n f(\bar{x})}{\partial x_i^n} = a_i^n \cos\left(\sum_{k=1}^n a_k x_k + n \cdot \frac{\pi}{2}\right)$

( $\forall$ )  $n \in \mathbb{N}^*$ .

b) Se raționează analog ca la punctul a) și se obține:

$$\frac{\partial^n f(\bar{x})}{\partial x_i^n} = a_i^n \sin\left(\sum_{k=1}^n a_k x_k + n \cdot \frac{\pi}{2}\right) \quad (\forall) \quad n \in \mathbb{N}^*$$

$$c) \frac{\partial f(\bar{x})}{\partial x_i} = \frac{-a_i}{\left(\sum_{k=1}^n a_k x_k\right)^2}; \quad \frac{\partial^2 f(\bar{x})}{\partial x_i^2} = \frac{1 \cdot 2a_i^2}{\left(\sum_{k=1}^n a_k x_k\right)^3}; \quad \frac{\partial^3 f(\bar{x})}{\partial x_i^3} = \frac{-1 \cdot 2 \cdot 3a_i^3}{\left(\sum_{k=1}^n a_k x_k\right)^4}$$

Se presupune că  $\frac{\partial^n f(\bar{x})}{\partial x_i^n} = \frac{(-1)^n \cdot n! a_i^n}{\left(\sum_{k=1}^n a_k x_k\right)^{n+1}}$  este adevărată și se

demonstrează că  $\frac{\partial^{n+1} f(\bar{x})}{\partial x_i^{n+1}} = \frac{(-1)^{n+1} \cdot (n+1)! a_i^{n+1}}{\left(\sum_{k=1}^n a_k x_k\right)^{n+2}}$ .

Într-adevăr:

$$\frac{\partial^{n+1} f(\bar{x})}{\partial x_i^{n+1}} = \frac{\partial}{\partial x_i} \left( \frac{\partial^n f(\bar{x})}{\partial x_i^n} \right) = \left( \frac{(-1)^n \cdot n! a_i^n}{\left(\sum_{k=1}^n a_k x_k\right)^{n+1}} \right)_{x_i} = \frac{(-1)^{n+1} \cdot (n+1)! a_i^{n+1}}{\left(\sum_{k=1}^n a_k x_k\right)^{n+2}}.$$

Atunci conform principiului inducției  $\frac{\partial^n f(\bar{x})}{\partial x_i^n} = \frac{(-1)^n \cdot n! a_i^n}{\left(\sum_{k=1}^n a_k x_k\right)^{n+1}} \quad (\forall) \quad n \in \mathbb{N}^*$ .

$$d) \frac{\partial f(\bar{x})}{\partial x_i} = \frac{a_i}{\sum_{k=1}^n a_k x_k}; \quad \frac{\partial^2 f(\bar{x})}{\partial x_i^2} = \frac{-a_i^2}{\left(\sum_{k=1}^n a_k x_k\right)^2}; \quad \frac{\partial^3 f(\bar{x})}{\partial x_i^3} = \frac{1 \cdot 2a_i^3}{\left(\sum_{k=1}^n a_k x_k\right)^3}$$

Se presupune că  $\frac{\partial^n f(\bar{x})}{\partial x_i^n} = \frac{(-1)^{n+1} \cdot (n-1)! a_i^n}{\left(\sum_{k=1}^n a_k x_k\right)^n}$  este adevărată și se

demonstrează că  $\frac{\partial^{n+1} f(\bar{x})}{\partial x_i^{n+1}} = \frac{(-1)^{n+2} \cdot n! a_i^{n+1}}{\left(\sum_{k=1}^n a_k x_k\right)^{n+1}}$ .

Într-adevăr:

$$\frac{\partial^{n+1} f(\bar{x})}{\partial x_i^{n+1}} = \frac{\partial}{\partial x_i} \left( \frac{\partial^n f(\bar{x})}{\partial x_i^n} \right) = \left( \frac{(-1)^{n+1} \cdot (n-1)! a_i^n}{\left(\sum_{k=1}^n a_k x_k\right)^n} \right)_{x_i} = \frac{(-1)^{n+2} \cdot n! a_i^{n+1}}{\left(\sum_{k=1}^n a_k x_k\right)^{n+1}}.$$

Atunci conform principiului inducției  $\frac{\partial^n f(\bar{x})}{\partial x_i^n} = \frac{(-1)^{n+1} \cdot (n-1)! a_i^n}{\left(\sum_{k=1}^n a_k x_k\right)^n}$

$(\forall) n \in \mathbb{N}^*$ .

Ținând cont de faptul că  $\frac{\partial^{n+m} f(\bar{x})}{\partial x_i^n \partial x_j^m} = \frac{\partial^m}{\partial x_j^m} \left( \frac{\partial^n f(\bar{x})}{\partial x_i^n} \right)$  se raționează în mod asemănător cum s-a raționat la punctele anterioare și se obține:

$$a) \frac{\partial^{n+m} f(\bar{x})}{\partial x_i^n \partial x_j^m} = a_i^n \cdot a_j^m \cdot \cos\left(\sum_{k=1}^n a_k x_k + (n+m)\frac{\pi}{2}\right) \quad (\forall) n, m \in \mathbb{N}^*$$

$$b) \frac{\partial^{n+m} f(\bar{x})}{\partial x_i^n \partial x_j^m} = a_i^n \cdot a_j^m \cdot \sin\left(\sum_{k=1}^n a_k x_k + (n+m)\frac{\pi}{2}\right) \quad (\forall) n, m \in \mathbb{N}^*$$

$$c) \frac{\partial^{n+m} f(\bar{x})}{\partial x_i^n \cdot \partial x_j^m} = \frac{(-1)^{n+m} \cdot (n+m)! a_i^n \cdot a_j^m}{\left(\sum_{k=1}^n a_k x_k\right)^{n+m+2}} \quad (\forall) n, m \in \mathbb{N}^*$$

$$d) \frac{\partial^{n+m} f(\bar{x})}{\partial x_i^n \cdot \partial x_j^m} = \frac{(-1)^{n+m+2} \cdot (n+m-1)! a_i^n \cdot a_j^m}{\left(\sum_{k=1}^n a_k x_k\right)^{n+m}} \quad (\forall) n, m \in \mathbb{N}^*$$

**Exercițiul 7.4.9** Să se calculeze derivatele parțiale indicate pentru fiecare funcție în parte:

- a)  $\frac{\partial^n f(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_i^n}$ ;  $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \left( \sum_{k=1}^n a_k x_k^3 \right) \cdot e^{\sum_{k=1}^n a_k x_k}$
- b)  $\frac{\partial^n f(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_i^n}$ ;  $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \left( \sum_{k=1}^n a_k x_k^3 \right) \cdot \ln \left( \sum_{k=1}^n a_k x_k \right)$
- c)  $\frac{\partial^n f(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_i^n}$ ;  $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \frac{\sum_{k=1}^n a_k x_k}{\sum_{k=1}^n b_k x_k}$
- d)  $\frac{\partial^n f(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_i^n}$ ;  $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = \left( \sum_{k=1}^n a_k x_k^3 \right) \cdot \sin \left( \sum_{k=1}^n a_k x_k \right)$

**Rezolvare:**

Se notează  $\bar{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$  și  $f(\bar{x}) = u(\bar{x}) \cdot v(\bar{x})$

Conform cu formula lui Leibniz pentru derivata de ordinul  $n$  a produsului

$$f(\bar{x}) = u(\bar{x}) \cdot v(\bar{x}) \text{ se obține } \frac{\partial^n f(\bar{x})}{\partial x_i^n} = \sum_{\ell=0}^n C_n^\ell \frac{\partial^\ell u(\bar{x})}{\partial x_i^\ell} \cdot \frac{\partial^{n-\ell} v(\bar{x})}{\partial x_i^{n-\ell}}.$$

a) Se observă că  $f(\bar{x}) = u(\bar{x}) \cdot v(\bar{x})$  unde  $u(\bar{x}) = \sum_{k=1}^n a_k x_k^3$  și  $v(\bar{x}) = e^{\sum_{k=1}^n a_k x_k}$ .

$$\begin{aligned} \frac{\partial^n f(\bar{x})}{\partial x_i^n} &= C_n^0 u(\bar{x}) \cdot \frac{\partial^n v(\bar{x})}{\partial x_i^n} + C_n^1 \frac{\partial u(\bar{x})}{\partial x_i} \cdot \frac{\partial^{n-1} v(\bar{x})}{\partial x_i^{n-1}} + C_n^2 \frac{\partial^2 u(\bar{x})}{\partial x_i^2} \cdot \frac{\partial^{n-2} v(\bar{x})}{\partial x_i^{n-2}} + C_n^3 \frac{\partial^3 u(\bar{x})}{\partial x_i^3} \cdot \frac{\partial^{n-3} v(\bar{x})}{\partial x_i^{n-3}} = \\ &= C_n^0 \cdot \sum_{k=1}^n a_k \cdot x_k^3 \cdot a_i^n \cdot e^{\sum_{k=1}^n a_k x_k} + C_n^1 3a_i \cdot x_i^3 \cdot a_i^{n-1} \cdot e^{\sum_{k=1}^n a_k x_k} + C_n^2 6a_i \cdot x_i \cdot a_i^{n-2} \cdot e^{\sum_{k=1}^n a_k x_k} + \\ &+ C_n^3 6a_i \cdot a_i^{n-3} \cdot e^{\sum_{k=1}^n a_k x_k} = a_i^{n-2} \cdot e^{\sum_{k=1}^n a_k x_k} \left( a_i^2 \sum_{k=1}^n a_k \cdot x_k^3 + 3a_i^2 \cdot C_n^1 \cdot x_i^2 + 6a_i \cdot C_n^2 \cdot x_i + 6C_n^3 \right) \end{aligned}$$

( Derivatele de ordinul 4, 5, ... ale lui  $u(\bar{x})$  sunt zero )

b) Ținând cont de exercițiul 7.4.8 d,  $\frac{\partial^n v(\bar{x})}{\partial x_i^n} = \frac{(-1)^{n+1} \cdot (n-1)! a_i^n}{\left( \sum_{k=1}^n a_k \cdot x_k \right)^n}$ . Se

observă că  $f(\bar{x}) = u(\bar{x}) \cdot v(\bar{x})$  unde  $u(\bar{x}) = \sum_{k=1}^n a_k x_k^3$  și  $v(\bar{x}) = \ln \left( \sum_{k=1}^n a_k x_k \right)$ .

Conform cu formula lui Leibniz se obține:

$$\begin{aligned} \frac{\partial^n f(\bar{x})}{\partial x_i^n} &= C_n^0 u(\bar{x}) \cdot \frac{\partial^n v(\bar{x})}{\partial x_i^n} + C_n^1 \frac{\partial u(\bar{x})}{\partial x_i} \cdot \frac{\partial^{n-1} v(\bar{x})}{\partial x_i^{n-1}} + C_n^2 \frac{\partial^2 u(\bar{x})}{\partial x_i^2} \cdot \frac{\partial^{n-2} v(\bar{x})}{\partial x_i^{n-2}} + \\ C_n^3 \frac{\partial^3 u(\bar{x})}{\partial x_i^3} \cdot \frac{\partial^{n-3} v(\bar{x})}{\partial x_i^{n-3}} &= C_n^0 \cdot \sum_{k=1}^n a_k x_k^3 \cdot \frac{(-1)^{n+1} \cdot (n-1)! a_i^n}{\left( \sum_{k=1}^n a_k \cdot x_k \right)^n} + \end{aligned}$$

$$\begin{aligned}
& + C_n^1 3a_i x_i^2 \cdot \frac{(-1)^n \cdot (n-2)! a_i^{n-1}}{\left(\sum_{k=1}^n a_k \cdot x_k\right)^{n-1}} + C_n^2 6a_i x_i \cdot \frac{(-1)^{n-1} \cdot (n-3)! a_i^{n-2}}{\left(\sum_{k=1}^n a_k \cdot x_k\right)^{n-2}} + \\
& C_n^3 6a_i \cdot \frac{(-1)^{n-2} \cdot (n-4)! a_i^{n-3}}{\left(\sum_{k=1}^n a_k \cdot x_k\right)^{n-3}} = \\
& = \frac{(-1)^{n-2} \cdot (n-4)! a_i^{n-2}}{\left(\sum_{k=1}^n a_k \cdot x_k\right)^{n-3}} \\
& \cdot \left[ -a_i^2 (n-1)(n-2)(n-3) \cdot \frac{\sum_{k=1}^n a_k \cdot x_k^3}{\left(\sum_{k=1}^n a_k \cdot x_k\right)^3} + 3a_i^2 (n-2)(n-3) C_n^1 \cdot \frac{x_i^2}{\left(\sum_{k=1}^n a_k x_k\right)^2} - \right. \\
& \left. - 6a_i (n-3) \cdot C_n^2 \cdot \frac{x_i}{\sum_{k=1}^n a_k x_k} + 6 \cdot C_n^3 \right]
\end{aligned}$$

( Derivatele de ordinul 4, 5, ... ale lui  $u(\bar{x})$  sunt zero )

c) Se observă că  $f(\bar{x}) = u(\bar{x}) \cdot v(\bar{x})$  unde  $u(\bar{x}) = \sum_{k=1}^n a_k x_k$  și  $v(\bar{x}) = \frac{1}{\sum_{k=1}^n b_k x_k}$ .

Ținând cont de exercițiul 7.4.8 c), 
$$\frac{\partial^n v(\bar{x})}{\partial x_i^n} = \frac{(-1)^n \cdot n! b_i^n}{\left(\sum_{k=1}^n b_k \cdot x_k\right)^{n+1}}.$$

Conform cu formula lui Leibniz se obține: 
$$\frac{\partial^n f(\bar{x})}{\partial x_i^n} = C_n^0 u(\bar{x}) \cdot \frac{\partial^n v(\bar{x})}{\partial x_i^n} + C_n^1 \cdot \frac{\partial u(\bar{x})}{\partial x_i} \cdot \frac{\partial^{n-1} v(\bar{x})}{\partial x_i^{n-1}} = \left(\sum_{k=1}^n a_k x_k\right) \cdot \frac{(-1)^n \cdot n! b_i^n}{\left(\sum_{k=1}^n b_k \cdot x_k\right)^{n+1}} + C_n^1 a_i \cdot \frac{(-1)^{n-1} \cdot (n-1)! b_i^{n-1}}{\left(\sum_{k=1}^n b_k \cdot x_k\right)^n} =$$

$$= \frac{(-1)^{n-1} \cdot (n-1)! b_i^{n-1}}{\left(\sum_{k=1}^n b_k \cdot x_k\right)^n} \left[ -n \cdot b_i \cdot \sum_{k=1}^n a_k \cdot x_k + a_i C_n^1 \right].$$

( Derivatele de ordinul 4, 5, ... ale lui  $u(\bar{x})$  sunt zero )

d) Se observă că  $f(\bar{x}) = u(\bar{x}) \cdot v(\bar{x})$  unde  $u(\bar{x}) = \sum_{k=1}^n a_k x_k^3$  și  $v(\bar{x}) = \sin\left(\sum_{k=1}^n a_k x_k\right)$ . Ținând cont de exercițiul 7.4.8 b,

$$\frac{\partial^n v(\bar{x})}{\partial x_i^n} = a_i^n \sin\left(\sum_{k=1}^n a_k \cdot x_k + n \cdot \frac{\pi}{2}\right).$$

Conform cu formula lui Leibniz se obține:  $\frac{\partial^n f(\bar{x})}{\partial x_i^n} = C_n^0 u(\bar{x}) \cdot \frac{\partial^n v(\bar{x})}{\partial x_i^n} + C_n^1 \cdot \frac{\partial u(\bar{x})}{\partial x_i} \cdot \frac{\partial^{n-1} v(\bar{x})}{\partial x_i^{n-1}} + C_n^2 \cdot \frac{\partial^2 u(\bar{x})}{\partial x_i^2} \cdot \frac{\partial^{n-2} v(\bar{x})}{\partial x_i^{n-2}} + C_n^3 \cdot \frac{\partial^3 u(\bar{x})}{\partial x_i^3} \cdot \frac{\partial^{n-3} v(\bar{x})}{\partial x_i^{n-3}}$ .

( Derivatele de ordinul 4, 5, ... ale lui  $u(\bar{x})$  sunt zero )

**Exercițiul 7.4.10.** Presupunând că  $\varphi$  și  $\psi$  sunt derivabile de două ori să se arate că:

a)  $x \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \alpha \cdot y \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \beta \cdot z \cdot \frac{\partial u}{\partial z} = n \cdot x \cdot u(x, y, z); \quad u(x, y, z) = e^{nx} \cdot \varphi\left(\frac{y}{x^\alpha}, \frac{z}{x^\beta}\right)$

b)  $x \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + y \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + z \cdot \frac{\partial u}{\partial z} = 0; \quad u(x, y, z) = \varphi\left(\frac{y}{x}, \frac{y}{z}\right)$

c)  $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}; \quad u = \varphi(x - at) + \psi(x + at)$

d)  $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0;$   
 $u = x \cdot \varphi(x + y) + y \cdot \psi(x + y)$

e)  $x^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2xy \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} + y^2 \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = n(n-1) \cdot u(x, y, z);$   
 $u = x^n \cdot \varphi\left(\frac{y}{x}\right) + y^n \cdot \psi\left(\frac{y}{x}\right)$

**Rezolvare:**

Fie  $F(x_1, x_2, \dots, x_n) = f(u_1(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, u_m(x_1, x_2, \dots, x_n))$ , atunci

$$\frac{\partial F(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_l} = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f}{\partial u_i} \cdot \frac{\partial u_i(x_1, x_2, \dots, x_n)}{\partial x_l}$$

a) Fie  $v_1(x, y, z) = \frac{y}{x^\alpha}; \quad v_2(x, y, z) = \frac{z}{x^\beta}$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = n \cdot e^{nx} \cdot \varphi + e^{nx} \left( \frac{\partial \varphi}{\partial v_1} \cdot \frac{\partial v_1}{\partial x} + \frac{\partial \varphi}{\partial v_2} \cdot \frac{\partial v_2}{\partial x} \right) = n \cdot e^{nx} \cdot \varphi - \alpha \cdot e^{nx} \cdot \frac{y}{x^{\alpha+1}} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial v_1} - \beta \cdot e^{nx} \cdot \frac{z}{x^{\beta+1}} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial v_2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = e^{nx} \left( \frac{\partial \varphi}{\partial v_1} \cdot \frac{\partial v_1}{\partial y} + \frac{\partial \varphi}{\partial v_2} \cdot \frac{\partial v_2}{\partial y} \right) = e^{nx} \cdot \frac{1}{x^\alpha} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial v_1}$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = e^{nx} \left( \frac{\partial \varphi}{\partial v_1} \cdot \frac{\partial v_1}{\partial z} + \frac{\partial \varphi}{\partial v_2} \cdot \frac{\partial v_2}{\partial z} \right) = e^{nx} \cdot \frac{1}{x^\beta} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial v_2}$$

Înmulțind aceste egalități cu  $x, \alpha y$  respectiv  $\beta z$  și adunându-le se obține:

$$x \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \alpha y \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \beta z \cdot \frac{\partial u}{\partial z} = nx \cdot e^{nx} \cdot \varphi - \alpha \cdot e^{nx} \cdot \frac{y}{x^\alpha} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial v_1} - \beta \cdot e^{nx} \cdot \frac{z}{x^\beta} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial v_2} + \alpha \cdot e^{nx} \cdot \frac{y}{x^\alpha} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial v_1} + \alpha \cdot e^{nx} \cdot \frac{y}{x^\alpha} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial v_1} + \beta \cdot e^{nx} \cdot \frac{z}{x^\beta} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial v_2} = n \cdot x \cdot e^{nx} \cdot \varphi$$

$$\text{Deci } x \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \alpha y \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \beta z \cdot \frac{\partial u}{\partial z} = n \cdot x \cdot u(x, y, z)$$

$$\text{b) Fie } v_1(x, y, z) = \frac{y}{x}; \quad v_2(x, y, z) = \frac{y}{z}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\partial \varphi}{\partial v_1} \cdot \frac{\partial v_1}{\partial x} + \frac{\partial \varphi}{\partial v_2} \cdot \frac{\partial v_2}{\partial x} = -\frac{y}{x^2} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial v_1}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial \varphi}{\partial v_1} \cdot \frac{\partial v_1}{\partial y} + \frac{\partial \varphi}{\partial v_2} \cdot \frac{\partial v_2}{\partial y} = \frac{1}{x} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial v_1} + \frac{1}{z} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial v_2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{\partial \varphi}{\partial v_1} \cdot \frac{\partial v_1}{\partial z} + \frac{\partial \varphi}{\partial v_2} \cdot \frac{\partial v_2}{\partial z} = -\frac{y}{z^2} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial v_2}$$

Înmulțind cu  $x, y$  respectiv  $z$  aceste egalități și adunându-le se obține:

$$x \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + y \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + z \cdot \frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{y}{x} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial v_1} + \frac{y}{x} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial v_1} + \frac{y}{z} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial v_2} - \frac{y}{z} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial v_2} = 0$$

$$\text{Deci } x \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + y \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + z \cdot \frac{\partial u}{\partial z} = 0$$

**Observație.** Din  $u(x, y, z) = \varphi\left(\frac{y}{x}, \frac{y}{z}\right) \Rightarrow u(tx, ty, tz) = t^0 \cdot u(x, y, z)$ . Deci

$u(x, y, z)$  este omogenă de grad zero. Conform relației lui Euler

$$x \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + y \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + z \cdot \frac{\partial u}{\partial z} = 0.$$

$$\text{c) Fie } v_1(x, t) = x - at; \quad v_2(x, t) = x + at$$

$$\frac{\partial u}{\partial t} = \varphi' \cdot \frac{\partial v_1}{\partial t} + \psi' \cdot \frac{\partial v_2}{\partial t} = -a \cdot \varphi' + a \cdot \psi'$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = -a \cdot \varphi'' \cdot \frac{\partial v_1}{\partial t} + a \cdot \psi'' \cdot \frac{\partial v_2}{\partial t} = +a^2(\varphi'' + \psi'')$$

$$\text{Deci } \frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2(\varphi'' + \psi'')$$

(1)

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \varphi' \cdot \frac{\partial v_1}{\partial x} + \psi' \cdot \frac{\partial v_2}{\partial x} = \varphi' + \psi'$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \varphi'' \cdot \frac{\partial v_1}{\partial x} + \psi'' \cdot \frac{\partial v_2}{\partial x} = \varphi'' + \psi''$$

Deci  $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \varphi'' + \psi''$

(2)

Din (1) și (2) se obține  $\frac{\partial^2 u}{\partial t^2} = a^2 \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}$  (ecuația coardei vibrante).

d) Fie  $v(x, y) = x + y$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \varphi + x \cdot \varphi' \frac{\partial v}{\partial x} + y \cdot \psi' \frac{\partial v}{\partial x} = \varphi + x \cdot \varphi' + y \cdot \psi'$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = x \cdot \varphi' \frac{\partial v}{\partial y} + \psi + y \cdot \psi' \frac{\partial v}{\partial y} = x \cdot \varphi' + \psi + y \cdot \psi'$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = \varphi' \cdot \frac{\partial v}{\partial x} + \varphi' + x \cdot \varphi'' \cdot \frac{\partial v}{\partial x} + y \cdot \psi'' \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = 2\varphi' + x \cdot \varphi'' + y \cdot \psi''$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = x \cdot \varphi'' \cdot \frac{\partial v}{\partial y} + \psi' \cdot \frac{\partial v}{\partial y} + \psi' + y \cdot \psi'' \cdot \frac{\partial v}{\partial y} = x \cdot \varphi'' + 2\psi' + y \cdot \psi''$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \varphi' \cdot \frac{\partial v}{\partial y} + x \cdot \varphi'' \cdot \frac{\partial v}{\partial y} + \psi' + y \cdot \psi'' \cdot \frac{\partial v}{\partial y} = \varphi' + \psi' + x\varphi'' + y\psi''$$

Ținând cont de acestea se obține:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial u}{\partial y^2} = 2\varphi' + x\varphi'' + y\psi'' - 2\varphi' - 2\psi' - 2x\varphi'' - 2y\psi'' + x\varphi'' + 2\psi' + y\psi'' = 0$$

Deci  $\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} - 2 \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + \frac{\partial u}{\partial y^2} = 0$

e) Fie  $v(x, y) = \frac{y}{x}$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = n \cdot x^{n-1} \cdot \varphi + x^n \cdot \varphi' \cdot \frac{\partial v}{\partial x} + y^n \cdot \psi' \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = n \cdot x^{n-1} \cdot \varphi - x^{n-2} \cdot y \cdot \varphi' - \frac{y^{n+1}}{x^2} \cdot \psi'$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} = n(n-1) \cdot x^{n-2} \cdot \varphi + n \cdot x^{n-1} \cdot \varphi' \cdot \frac{\partial v}{\partial x} - (n-2) \cdot x^{n-3} \cdot y \cdot \varphi' - x^{n-2} \cdot \varphi'' \cdot \frac{\partial v}{\partial x} + \frac{2y^{n+1}}{x^3} \cdot \psi' - \frac{y^{n+1}}{x^2} \cdot \psi'' \cdot \frac{\partial v}{\partial x} =$$

$$= n(n-1) \cdot x^{n-2} \cdot \varphi - n \cdot x^{n-3} \cdot y \cdot \varphi' - (n-2) \cdot x^{n-3} \cdot y \cdot \varphi' + x^{n-4} \cdot y^2 \cdot \varphi'' + 2 \cdot \frac{y^{n+1}}{x^3} \cdot \psi' + \frac{y^{n+2}}{x^4} \cdot \psi'' =$$

$$= n(n-1) \cdot x^{n-2} \cdot \varphi - 2(n-1) \cdot x^{n-3} \cdot y \cdot \varphi' + 2 \cdot \frac{y^{n+1}}{x^3} \cdot \psi' + x^{n-4} \cdot y^2 \cdot \varphi'' + \frac{y^{n+2}}{x^4} \cdot \psi''.$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = x^n \cdot \varphi' \cdot \frac{\partial v}{\partial y} + n \cdot y^{n-1} \cdot \psi + y^n \cdot \psi' \cdot \frac{\partial v}{\partial y} = x^{n-1} \cdot \varphi' + n \cdot y^{n-1} \cdot \psi + \frac{y^n}{x} \cdot \psi'$$

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = x^{n-1} \cdot \varphi'' \cdot \frac{\partial v}{\partial y} + n(n-1) \cdot y^{n-2} \cdot \psi + n \cdot y^{n-1} \cdot \psi' \cdot \frac{\partial v}{\partial y} + n \cdot \frac{y^{n-1}}{x^3} \cdot \psi' + \frac{y^n}{x} \cdot \psi'' \cdot \frac{\partial v}{\partial y} =$$



$$= x^{n-2} \cdot \varphi'' + n(n-1) \cdot \frac{y^{n-2}}{x} \cdot \psi' + n \cdot \frac{y^{n-1}}{x} \cdot \psi'' + n \cdot \frac{y^{n-1}}{x} \cdot \psi' + \frac{y^n}{x^2} \cdot \psi''$$

$$\text{Deci } \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = x^{n-2} \cdot \varphi'' + n(n-1) \cdot \frac{y^{n-2}}{x} \cdot \psi' + 2n \cdot \frac{y^{n-1}}{x} \cdot \psi'' + \frac{y^n}{x^2} \cdot \psi''$$

$$\begin{aligned} \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} &= n \cdot x^{n-1} \cdot \varphi' \cdot \frac{\partial \psi}{\partial y} - x^{n-2} \cdot \varphi' - x^{n-2} \cdot \varphi'' \cdot \frac{\partial \psi}{\partial y} - (n+1) \cdot \frac{y^n}{x^2} \cdot \psi' - \frac{y^{n+1}}{x^2} \cdot \psi'' \cdot \frac{\partial \psi}{\partial y} = \\ &= n \cdot x^{n-2} \cdot \varphi' - x^{n-2} \cdot \varphi' - x^{n-3} \cdot y \cdot \varphi'' - (n+1) \cdot \frac{y^n}{x^2} \cdot \psi' - \frac{y^{n+1}}{x^3} \cdot \psi'' \end{aligned}$$

Ținând cont de aceste egalități se obține:

$$\begin{aligned} x^2 \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2xy \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} + y^2 \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} &= n(n-1) \cdot x^n \cdot \varphi - 2(n-1) \cdot x^{n-1} \cdot y \cdot \varphi' + 2 \cdot \frac{y^{n+1}}{x} \cdot \psi' + x^{n-2} \cdot y^2 \cdot \varphi'' + \\ &+ \frac{y^{n+2}}{x^2} \cdot \psi'' + 2n \cdot x^{n-1} \cdot y \cdot \varphi' - 2x^{n-1} \cdot y \cdot \varphi' - 2(n+1) \cdot \frac{y^{n+1}}{x} \cdot \psi' - 2 \frac{y^{n+2}}{x^2} \cdot \psi'' + x^{n-2} \cdot y^2 \cdot \varphi'' + n(n-1) \cdot \frac{y^n}{x} \cdot \psi + \\ &+ 2n \cdot \frac{y^{n+1}}{x} \cdot \psi' + \frac{y^{n+2}}{x} \cdot \psi'' = n(n-1) \cdot [x^n \cdot \varphi + y^n \cdot \psi] = n(n-1) \cdot u(x, y). \end{aligned}$$

**Observație.** Ținând cont de exercițiul 7.4.5. egalitatea este evidentă deoarece din  $u(x, y) = x^n \cdot \varphi\left(\frac{y}{x}\right) + y^n \cdot \psi\left(\frac{y}{x}\right)$  se obține

$$u(tx, ty) = t^n \left[ x^n \cdot \varphi\left(\frac{y}{x}\right) + y^n \cdot \psi\left(\frac{y}{x}\right) \right] = t^n \cdot u(x, y). \text{ Deci } u(x, y) \text{ este omogenă de ordin } n.$$

**Exercițiul 7.4.11.** Să se calculeze diferențialele indicate pentru fiecare funcție în parte:

a)  $f(x, y) = (ax + by) \cdot e^{ax+by}; df; d^2f; d^n f$

b)  $f(x, y) = (ax + by) \cos(ax + by); df; d^2f; d^n f$

c)  $f(x, y, z) = e^{ax+by+cz}; df; d^2f; d^3f$

d)  $f(x, y, z) = \cos(ax + by + cz); df; d^2f; d^n f$

**Rezolvare:**

Se știe că dacă  $f(x, y)$  este diferențiabilă de  $n$  ori în domeniul său de definiție, atunci  $df(x, y) = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy; d^2f(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} dx + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} dy + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dx dy$

$$d^n f(x, y) = \sum_{k=0}^n C_n^k \frac{\partial^n f}{\partial x^k \partial y^{n-k}} dx^k \cdot dy^{n-k}$$

Se știe că dacă  $f(x, y, z)$  este diferențiabilă de 3 ori în domeniul de definiție atunci:

$$df(x, y, z) = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz$$

$$d^2f(x, y, z) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} dx^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} dy^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} dz^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dx dy + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z} dx dz + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} dy dz$$

$$d^3f(x, y, z) = \frac{\partial^3 f}{\partial x^3} dx^3 + \frac{\partial^3 f}{\partial y^3} dy^3 + \frac{\partial^3 f}{\partial z^3} dz^3 + 3 \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y} dx^2 dy + 3 \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2} dx dy^2 +$$

$$+ 3 \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial z} dx^2 dz + 3 \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial z^2} dx dz^2 + 3 \frac{\partial^3 f}{\partial y^2 \partial z} dy^2 dz + 3 \frac{\partial^3 f}{\partial y \partial z^2} dy dz^2 + 6 \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y \partial z} dx dy dz$$

a)  $df(x, y) = (ax + by + 1) \cdot e^{ax+by} (adx + bdy)$

$$d^2f(x, y) = (ax + by + 2)e^{ax+by} (a^2 dx^2 + 2abdxdy + b^2 dy^2) = (ax + by + 2) \cdot e^{ax+by} (adx + bdy)^2$$

$$d^n f(x, y) = \sum_{k=0}^n C_n^k \frac{\partial^n f}{\partial x^k \partial y^{n-k}} dx^k \cdot dy^{n-k}$$

Folosind formula lui Leibniz pentru derivata de ordin  $n$  a produsului

$$f(x, y) = (ax + by) \cdot e^{ax+by} \text{ se obține } \frac{\partial^n f(x, y)}{\partial x^k \partial y^{n-k}} = a^k \cdot b^{n-k} (ax + by + n) \cdot e^{ax+by}.$$

Deci se obține:

$$d^n f(x, y) = \sum_{k=0}^n C_n^k \cdot a^k \cdot b^{n-k} \cdot (ax + by + n) \cdot e^{ax+by} \cdot dx^k dy^{n-k} = (ax + by + n) \cdot e^{ax+by} (adx + bdy)^n$$

Deci  $d^n f(x, y) = (ax + by + n) \cdot e^{ax+by} (adx + bdy)^n$ .

b) Se procedează analog ca la punctul a) și se obține:

$$df = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy = [a \cos(ax + by) + a(ax + by) \cdot \cos(ax + by + \frac{\pi}{2})] dx +$$

$$+ [b \cos(ax + by) + b(ax + by) \cdot \cos(ax + by + \frac{\pi}{2})] dy =$$

$$= \cos(ax + by)(adx + bdy) + (ax + by) \cdot \cos(ax + by + \frac{\pi}{2})(adx + bdy) =$$

$$= [\cos(ax + by) + (ax + by) \cos(ax + by + \frac{\pi}{2})](adx + bdy)$$

Deci  $df(x, y) = [\cos(ax + by) + (ax + by) \cos(ax + by + \frac{\pi}{2})](adx + bdy)$

$$d^2f(x, y) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} dx^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dx dy + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} dy^2 = [2a^2 \cos(ax + by + \frac{\pi}{2}) +$$

$$a^2(ax + by) \cdot \cos(ax + by + 2 \cdot \frac{\pi}{2})] dx^2 + [4ab \cdot \cos(ax + by + \frac{\pi}{2}) + 2ab(ax + by) \cdot$$

$$\cdot \cos(ax + by + 2 \cdot \frac{\pi}{2})] dx dy + [2b^2 \cos(ax + by + \frac{\pi}{2}) + b^2(ax + by) \cdot \cos(ax + by + 2 \cdot \frac{\pi}{2})] dy^2 =$$

$$= 2 \cos(ax + by + \frac{\pi}{2})(adx + bdy)^2 + (ax + by) \cdot \cos(ax + by + 2 \frac{\pi}{2})(adx + bdy)^2 =$$

$$= [2 \cos(ax + by + \frac{\pi}{2}) + (ax + by) \cdot \cos(ax + by + 2 \cdot \frac{\pi}{2})](adx + bdy)^2$$

Deci

$$d^2 f(x, y) = [2 \cos(ax + by + \frac{\pi}{2}) + (ax + by) \cdot \cos(ax + by + 2 \cdot \frac{\pi}{2})](adx + bdy)^2$$

$$d^n f(x, y) = \sum_{k=0}^n C_n^k \frac{\partial^n f}{\partial x^k \partial y^{n-k}} dx^k \cdot dy^{n-k}$$

Folosind formula lui Leibniz pentru derivata de ordin  $n$  a produsului  $(ax + by) \cos(ax + by) = f(x, y)$

$$\frac{\partial^n f(x, y)}{\partial x^k \partial y^{n-k}} = a^k \cdot b^{n-k} [(ax + by) \cdot \cos(ax + by + n \frac{\pi}{2}) + n \cos(ax + by + (n-1) \frac{\pi}{2})]$$

$$\text{Deci } d^n f(x, y) = [(ax + by) \cdot \cos(ax + by + \frac{n\pi}{2}) + n \cos(ax + by + (n-1) \frac{\pi}{2})]$$

$$\cdot \sum_{k=0}^n C_n^k a^k b^{n-k} \cdot dx^k \cdot dy^{n-k} .$$

$$d^n f(x, y) = [(ax + by) \cdot \cos(ax + by + \frac{n\pi}{2}) + n \cos(ax + by + (n-1) \frac{\pi}{2})](adx + bdy)^n$$

$$c) df(x, y, z) = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz =$$

$$= e^{ax+by+cz} \cdot adx + e^{ax+by+cz} \cdot bdy + e^{ax+by+cz} \cdot cdz =$$

$$= e^{ax+by+cz} \cdot (adx + bdy + cdz)$$

$$df(x, y, z) = e^{ax+by+cz} \cdot (adx + bdy + cdz)$$

$$d^2 f(x, y, z) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} dx^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} dy^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} dz^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dx dy + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z} dx dz + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} dy dz =$$

$$= e^{ax+by+cz} (a^2 dx^2 + b^2 dy^2 + c^2 dz^2 + 2abdxdy + 2acdxdz + 2bcdydz) =$$

$$= e^{ax+by+cz} (adx + bdy + cdz)^2$$

$$d^3 f(x, y, z) = e^{ax+by+cz} (a^3 dx^3 + b^3 dy^3 + c^3 dz^3 + 3a^2 bdx^2 dy + 3ab^2 dx dy^2 + 3a^2 cdx^2 dz +$$

$$+ 3ac^2 dx dz^2 + 3b^2 cdy^2 dz + 3bc^2 dy dz^2 + 6abcdxdydz)$$

$$\text{Deci } d^3 f(x, y, z) = e^{ax+by+cz} \cdot (adx + bdy + cdz)^3$$

**Observație.**  $d^n f(x, y, z) = e^{ax+by+cz} \cdot (adx + bdy + cdz)^n$  - această egalitate se poate demonstra prin inducție.

d)

$$df(x, y, z) = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz = \cos(ax + by + cz + \frac{\pi}{2})(adx + bdy + cdz)$$

$$d^2f(x, y, z) = \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} dx^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} dy^2 + \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} dz^2 + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} dx dy + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z} dx dz + 2 \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} dy dz =$$

$$= \cos(ax + by + cz + 2 \frac{\pi}{2})(a^2 dx^2 + b^2 dy^2 + c^2 dz^2 + 2abdxdy + 2acdxdz + 2bcdydz) =$$

$$= \cos(ax + by + cz + 2 \frac{\pi}{2})(adx + bdy + cdz)^2 .$$

$$d^3f(x, y, z) = \frac{\partial^3 f}{\partial x^3} dx^3 + \frac{\partial^3 f}{\partial y^3} dy^3 + \frac{\partial^3 f}{\partial z^3} dz^3 + 3 \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial y} dx^2 dy + 3 \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y^2} dx dy^2 +$$

$$+ 3 \frac{\partial^3 f}{\partial x^2 \partial z} dx^2 dz + 3 \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial z^2} dx dz^2 + 3 \frac{\partial^3 f}{\partial y^2 \partial z} dy^2 dz + 3 \frac{\partial^3 f}{\partial y \partial z^2} dy dz^2 + 6 \frac{\partial^3 f}{\partial x \partial y \partial z} dx dy dz =$$

$$= \cos(ax + by + cz + \frac{3\pi}{2})(adx + bdy + cdz)^3 .$$

$$\text{Deci } d^3f(x, y, z) = \cos(ax + by + cz + \frac{3\pi}{2})(adx + bdy + cdz)^3$$

### Observație

a)  $d^n f(x, y, z) = \cos(ax + by + cz + \frac{n\pi}{2})(adx + bdy + cdz)^n$  - această egalitate se poate demonstra prin inducție.

b) Dacă se analizează exercițiul 7.4.11 c), d) se poate face următoarea generalizare.

Dacă  $f(x_1, x_2, \dots, x_n) = f\left(\sum_{k=1}^n a_k \cdot x_k\right)$  este diferențiabilă de  $n$  ori, atunci

$$d^n f(x_1, x_2, \dots, x_n) = f^{(n)}\left(\sum_{k=1}^n a_k \cdot x_k\right) \cdot (a_1 dx_1 + a_2 dx_2 + \dots + a_n dx_n)^n .$$

**Exercițiul 7.4.12.** Să se calculeze diferențialele de ordinul specificat pentru funcțiile următoare:

a)  $F(x, y) = f\left(x^2, \frac{x}{y}\right); dF; d^2F$

b)  $G(x, y) = g(x^y, y^x); dG$

c)  $H(x, y, z) = h(x + y + z, x \cdot y \cdot z); dH; d^2H$

### Rezolvare:

a)  $dF = \frac{\partial F}{\partial x} dx + \frac{\partial F}{\partial y} dy$

Se notează  $u(x, y) = x^2; v(x, y) = \frac{x}{y}$

$$\frac{\partial F}{\partial x} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = 2x \frac{\partial f}{\partial u} + \frac{1}{y} \cdot \frac{\partial f}{\partial v}$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = \frac{\partial f}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} = -\frac{x}{y^2} \cdot \frac{\partial f}{\partial v}$$

$$d^2F = \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} dx^2 + \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} dy^2 + 2 \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} dx dy$$

$$dF = \left( 2x \frac{\partial f}{\partial u} + \frac{1}{y} \cdot \frac{\partial f}{\partial v} \right) dx - \frac{x}{y^2} \cdot \frac{\partial f}{\partial v} dy$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial x^2} = \left( 2x \cdot \frac{\partial f}{\partial u} + \frac{1}{y} \cdot \frac{\partial f}{\partial v} \right)_x = 2 \frac{\partial f}{\partial u} + 2x \left( \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \right) + \frac{1}{y} \left( \frac{\partial^2 f}{\partial v \partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \right) =$$

$$= 2 \frac{\partial f}{\partial u} + 2x \left( \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} \cdot 2x + \frac{1}{y} \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} \right) + \frac{1}{y} \left( 2x \frac{\partial^2 f}{\partial v \partial u} + \frac{1}{y} \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \right) = 2 \frac{\partial f}{\partial u} + 4x^2 \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + 4 \cdot \frac{x}{y} \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + \frac{1}{y^2} \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial v^2}$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial y^2} = \left( -\frac{x}{y^2} \cdot \frac{\partial f}{\partial v} \right)_y = \frac{2x}{y^3} \cdot \frac{\partial f}{\partial v} - \frac{x}{y^2} \left( \frac{\partial^2 f}{\partial v \partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \right) = \frac{2x}{y^3} \cdot \frac{\partial f}{\partial v} + \frac{x^2}{y^4} \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial v^2}$$

$$\frac{\partial^2 F}{\partial y \partial x} = \left( -\frac{x}{y^2} \cdot \frac{\partial f}{\partial v} \right)_x = -\frac{1}{y^2} \cdot \frac{\partial f}{\partial v} - \frac{x}{y^2} \left( \frac{\partial^2 f}{\partial v \partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \right) = -\frac{1}{y^2} \cdot \frac{\partial f}{\partial v} - \frac{2x^2}{y^2} \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} - \frac{x}{y^3} \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial v^2}$$

Deci

$$d^2F = \left( 2 \frac{f}{\partial u} + 4x^2 \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial u^2} + 4 \cdot \frac{x}{y} \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} + \frac{1}{y^2} \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \right) dx^2 + \left( \frac{2x}{y^3} \cdot \frac{\partial f}{\partial v} + \frac{x^2}{y^4} \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \right) dy^2 +$$

$$\left( -\frac{1}{y^2} \cdot \frac{\partial f}{\partial v} - 2 \cdot \frac{x^2}{y^2} \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial u \partial v} - \frac{x}{y^3} \cdot \frac{\partial^2 f}{\partial v^2} \right) dx dy.$$

$$b) dG(x, y) = \frac{\partial G}{\partial x} dx + \frac{\partial G}{\partial y} dy$$

$$u = x^y; v = y^x \text{ sau } u = e^{y \ln x}; v = e^{x \ln y}$$

$$\frac{\partial G}{\partial x} = \frac{\partial g}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial g}{\partial u} \cdot \frac{y}{x} \cdot x^y + \frac{\partial g}{\partial v} \cdot y^x \cdot \ln y$$

$$\frac{\partial G}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial g}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial g}{\partial u} \cdot x^y \cdot \ln x + \frac{\partial g}{\partial v} \cdot \frac{x}{y} \cdot y^x$$

Deci

$$dG(x, y) = \left( \frac{\partial g}{\partial u} \cdot \frac{y}{x} \cdot x^y + \frac{\partial g}{\partial v} \cdot y^x \cdot \ln y \right) dx + \left( \frac{\partial g}{\partial u} \cdot x^y \cdot \ln x + \frac{\partial g}{\partial v} \cdot \frac{x}{y} \cdot y^x \right) dy$$

$$c) dH(x, y, z) = \frac{\partial H}{\partial x} dx + \frac{\partial H}{\partial y} dy + \frac{\partial H}{\partial z} dz$$

Se notează  $u = x + y + z$ ;  $v = x \cdot y \cdot z$

$$\frac{\partial H}{\partial x} = \frac{\partial h}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial h}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial h}{\partial u} + yz \cdot \frac{\partial h}{\partial v}$$

$$\frac{\partial H}{\partial y} = \frac{\partial h}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial h}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\partial h}{\partial u} + xz \cdot \frac{\partial h}{\partial v}$$



$$d^2H = \frac{\partial^2 h}{\partial u^2} (dx + dy + dz) + \frac{\partial^2 h}{\partial u \partial v} [2yzdx^2 + 2xzdy^2 + 2xydz^2 + (xz + yz)dxdy + (xy + yz)dxdz + (xy + xz)dydz] + \frac{\partial^2 h}{\partial v^2} [y^2z^2dx^2 + x^2z^2dy^2 + x^2y^2dz^2 + xyz(zdxdy + ydxdz + xdydz)] + \frac{\partial h}{\partial v} (zdxdy + ydxdz + xdydz)$$

**Exercițiul 7.4.13.** Să se calculeze punctele de extrem ale funcțiilor:

a)  $f(x, y) = xy \cdot \ln(x^2 + y^2)$ ;  $(x, y) \neq (0, 0)$

b)  $f(x, y) = \sin x + \cos y + \cos(x - y)$ ;  $(x, y) \in [0, \frac{\pi}{2}] \times [0, \frac{\pi}{2}]$

c)  $f(x, y, z) = xy^2z^3(a - x - 2y - 3z)$ ;  $a > 0$

**Rezolvare:**

a) Se determină punctele staționare ale funcției  $f(x, y)$  rezolvând sistemul:

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y \cdot \ln(x^2 + y^2) + \frac{2x^2y}{x^2 + y^2} = 0 \\ x \cdot \ln(x^2 + y^2) + \frac{2xy^2}{x^2 + y^2} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y \left[ \ln(x^2 + y^2) + \frac{2x^2}{x^2 + y^2} \right] = 0 \\ x \left[ \ln(x^2 + y^2) + \frac{2y^2}{x^2 + y^2} \right] = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = 0 \\ y = 0 \end{cases}$$

$$\text{sau } \begin{cases} x = 0 \\ \ln y^2 = 0 \end{cases} \text{ sau } \begin{cases} y = 0 \\ \ln x^2 = 0 \end{cases} \text{ sau } \begin{cases} \ln(x^2 + y^2) + \frac{2x^2}{x^2 + y^2} = 0 \\ \ln(x^2 + y^2) + \frac{2y^2}{x^2 + y^2} = 0 \end{cases}$$

$A_1(0,0)$  nu convine,  $A_2(0,1)$ ;  $A_3(0,-1)$ ;  $A_4(1,0)$ ;  $A_5(1,0)$  ultimul sistem este

echivalent cu sistemele  $\begin{cases} x = y \\ \ln 2x = -1 \end{cases}$  sau  $\begin{cases} x = -y \\ \ln 2x = -1 \end{cases}$ . De aici se obțin  $A_6\left(\frac{1}{2e}, \frac{1}{2e}\right)$ ;

$$A_7\left(\frac{1}{2e}, -\frac{1}{2e}\right); A_8\left(-\frac{1}{2e}, \frac{1}{2e}\right).$$

Se cercetează care din aceste opt puncte staționare sunt puncte de extrem. Cercetarea se face pentru fiecare punct în parte. În continuare se

cercetează  $A_7\left(\frac{1}{2e}, -\frac{1}{2e}\right)$ .

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = \frac{2xy(x^2 + 3y^2)}{(x^2 + y^2)^2} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = \frac{2xy(3x^2 + y^2)}{(x^2 + y^2)^2} \\ \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial x} = \ln(x^2 + y^2) + \frac{2x(x^4 + y^4)}{(x^2 + y^2)^2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_{11} = -2 \\ a_{22} = -2 \\ a_{12} = a_{21} = -1 - \ln 2 \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -2 & -1-\ln 2 \\ -1-\ln 2 & -2 \end{vmatrix} = 4 - (1+\ln 2)^2 > 0 \text{ deoarece } 1+\ln 2 < 2.$$

Conform cu Propoziția 7.3.3 (teorema Sylvester) punctul  $A_7\left(\frac{1}{2e}, -\frac{1}{2e}\right)$

este un punct de maxim local al funcției  $f(x, y)$ .

Analog se cercetează celelalte puncte.

b) Se determină punctele staționare ale funcției  $f(x, y)$  rezolvând sistemul:

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \cos x - \sin(x-y) = 0 \\ -\sin y + \sin(x-y) = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \cos x = \sin y \\ \cos x = \sin(x-y) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \cos x = \cos\left(\frac{\pi}{2} - y\right) \\ \cos x = \sin(x-y) \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \begin{cases} y = -x + \frac{\pi}{2} + 2k\pi \\ \cos x = -\cos 2x \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y = -x + \frac{\pi}{2} + 2k\pi \\ \cos x = -1 \end{cases} \text{ sau}$$

$$\begin{cases} y = -x + \frac{\pi}{2} + 2k\pi \\ \cos x = \frac{1}{2} \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} x = -\pi + 2k\pi \\ y = -\frac{\pi}{2} + 2k\pi \end{cases} \text{ sau } \begin{cases} x = \frac{\pi}{3} + 2k\pi \\ y = \frac{\pi}{6} + 2k\pi \end{cases} \text{ sau } \begin{cases} x = \frac{5\pi}{3} + 2k\pi \\ y = -\frac{\pi}{3} + 2k\pi \end{cases}$$

Singurul punct staționar care satisface condițiile inițiale adică este din  $[0, \frac{\pi}{2}] \times [0, \frac{\pi}{2}]$  este  $A\left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{6}\right)$ .

Se cercetează dacă este sau nu punct de extrem

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -\sin x - \cos(x-y) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = -\cos y - \cos(x-y) \\ \frac{\partial f}{\partial x \partial y} = \cos(x-y) \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} a_{11} = -\frac{1+\sqrt{3}}{2} \\ a_{22} = -1 \\ a_{12} = a_{21} = \frac{1}{2} \end{cases}$$

$$\begin{vmatrix} -\frac{1+\sqrt{3}}{2} & \frac{1}{2} \\ \frac{1}{2} & -1 \end{vmatrix} = \frac{1+\sqrt{3}}{2} - \frac{1}{4} = \frac{\sqrt{3}-1}{4} > 0$$

Conform cu Propoziția 7.3.3 (teorema Sylvester) punctul  $A\left(\frac{\pi}{3}, \frac{\pi}{6}\right)$  este un

punct de maxim local.

c) Se determina punctele staționare ale funcției  $f(x, y)$  rezolvând sistemul:



$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial y} = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial z} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y^2 z^3 (a - x - 2y - 3z) - xy^2 z^3 = 0 \\ 2xyz^3 (a - x - 2y - 3z) - 2xy^2 z^3 = 0 \\ 3xy^2 z^2 (a - x - 2y - 3z) - 3xy^2 z^3 = 0 \end{cases}$$

Din fiecare ecuație a sistemului rezultă câte două ecuații. Cu aceste ecuații se pot forma mai multe sisteme. În continuare se consideră sistemul

$$\begin{cases} 2x + 2y + 3z = a \\ x + 3y + 3z = a \\ x + 2y + 4z = a \end{cases}$$

$$\Delta = \begin{vmatrix} 2 & 2 & 3 \\ 1 & 3 & 3 \\ 1 & 2 & 4 \end{vmatrix} = 7; \Delta_x = \begin{vmatrix} a & 2 & 3 \\ a & 3 & 3 \\ a & 2 & 4 \end{vmatrix} = a; \Delta_y = \begin{vmatrix} 2 & a & 3 \\ 1 & a & 3 \\ 1 & a & 4 \end{vmatrix} = a; \Delta_z = \begin{vmatrix} 2 & 2 & a \\ 1 & 3 & a \\ 1 & 2 & a \end{vmatrix} = a$$

$$\text{Deci } x = \frac{a}{7}; y = \frac{a}{7}; z = \frac{a}{7}.$$

Se cercetează dacă punctul staționar  $A\left(\frac{a}{7}, \frac{a}{7}, \frac{a}{7}\right)$  este sau nu punct de extrem.

$$\begin{cases} \frac{\partial^2 f}{\partial x^2} = -2y^2 z^3 & ; & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial y} = 2yz^3 (a - 2x - 3y - 3z) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial y^2} = 2xz^3 (a - x - 6y - 3z) & ; & \frac{\partial^2 f}{\partial x \partial z} = 3y^2 z^2 (a - 2x - 2y - 4z) \\ \frac{\partial^2 f}{\partial z^2} = 6xy^2 z (a - x - 2y - 6z) & ; & \frac{\partial^2 f}{\partial y \partial z} = 6xyz^2 (a - x - 3y - 4z) \end{cases}$$

$$a_{11} = -\frac{2a^5}{7^5}; a_{22} = -\frac{6a^5}{7^5}; a_{33} = -\frac{12a^5}{7^5}; a_{12} = a_{21} = -\frac{2a^5}{7^5}$$

$$a_{13} = a_{31} = -\frac{3a^5}{7^5}; a_{23} = a_{32} = -\frac{2a^5}{7^5}$$

$$a_{11} = -\frac{2a^5}{7^5}; \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -\frac{2a^5}{7^5} & -\frac{2a^5}{7^5} \\ -\frac{2a^5}{7^5} & -\frac{6a^5}{7^5} \end{vmatrix} = \frac{4a^{10}}{7^{10}} \begin{vmatrix} 1 & 1 \\ 1 & 3 \end{vmatrix} = \frac{8a^{10}}{7^{10}} > 0$$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & a_{13} \\ a_{21} & a_{22} & a_{23} \\ a_{31} & a_{32} & a_{33} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -\frac{2a^5}{7^5} & -\frac{2a^5}{7^5} & -\frac{3a^5}{7^5} \\ \frac{2a^5}{7^5} & \frac{6a^5}{7^5} & \frac{6a^5}{7^5} \\ \frac{3a^5}{7^5} & \frac{6a^5}{7^5} & \frac{12a^5}{7^5} \end{vmatrix} = -\frac{6a^{15}}{7^{15}} \begin{vmatrix} 2 & 1 & 1 \\ 2 & 3 & 2 \\ 3 & 3 & 4 \end{vmatrix} = -\frac{42a^{15}}{7^{15}} < 0 \quad (a > 0)$$

Ținând cont de Propoziția 7.3.4 (2°),  $A\left(\frac{a}{7}, \frac{a}{7}, \frac{a}{7}\right)$  este punct de maxim local.

**Exercițiul 7.4.14.** Să se găsească extremele ce verifică legăturile specificate pentru fiecare funcție:

a)  $f(x, y, z) = xy^2z^3$ ;  $x + 2y + 3z = a$ ;  $x > 0, y > 0, z > 0, a > 0$

b)  $f(x, y) = xy$ ;  $x + y = a$

c)  $f(x, y) = \cos^2 x + \cos^2 y$ ;  $x - y = \frac{\pi}{4}$

**Rezolvare:**

Se construiește funcția lui Lagrange:

$$\phi(x, y, z, \lambda) = xy^2z^3 + \lambda(x + 2y + 3z - a)$$

Se află punctele staționare ale funcției lui Lagrange rezolvând sistemul:

$$\begin{cases} \frac{\partial \phi}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial \phi}{\partial y} = 0 \\ \frac{\partial \phi}{\partial z} = 0 \\ \frac{\partial \phi}{\partial \lambda} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y^2z^3 + \lambda = 0 \\ 2xyz^3 + 2\lambda = 0 \\ 3xy^2z^2 + 3\lambda = 0 \\ x + 2y + 3z - a = 0 \end{cases}$$

Rezolvând acest sistem ținând cont de faptul că  $x > 0, y > 0, z > 0, a > 0$  se obține  $x = \frac{a}{6}$ ;  $y = \frac{a}{6}$ ;  $z = \frac{a}{6}$ ;  $\lambda = \frac{a^5}{6^5}$ .

Se calculează diferențiala de ordinul doi a funcției

$$\phi(x, y, z, \lambda) = xy^2z^3 - \frac{a^5}{6^5}(x + 2y + 3z - a) \text{ în punctul } A\left(\frac{a}{6}, \frac{a}{6}, \frac{a}{6}\right) \text{ și se obține:}$$

$$d^2\phi = 2\frac{a^4}{6}dy^2 + 6\frac{a^4}{6^4}dz^2 + 4\frac{a^4}{6^4}dxdy + 12\frac{a^4}{6^4}dydz + 3\frac{a^4}{6^4}dzdx$$

Diferențiind legătura se obține  $dx = -2dy - 3dz$ .

Se înlocuiește aceasta în  $d^2\phi$  și se obține următoarea formă pătratică:

$$d^2\phi = \frac{a^4}{6^4}(-6dy^2 - 3dz^2 - 6dydz).$$

De aici rezultă  $a_{11} = -6$ ;  $a_{22} = -3$ ;  $a_{12} = a_{21} = -3$

$$\begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} -6 & -3 \\ -3 & -3 \end{vmatrix} = 18 - 9 = 9 > 0$$

Conform cu teorema lui Sylvester, forma pătratică este negativ definită deci  $A\left(\frac{a}{6}, \frac{a}{6}, \frac{a}{6}\right)$  este un punct de maxim.

b) Se construiește funcția lui Lagrange  $\phi(x, y, \lambda) = xy + \lambda(x + y - a)$

Se află punctele staționare ale funcției lui Lagrange rezolvând sistemul:

$$\begin{cases} \frac{\partial \phi}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial \phi}{\partial y} = 0 \\ \frac{\partial \phi}{\partial \lambda} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} y + \lambda = 0 \\ x + \lambda = 0 \\ x + y = a \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} \lambda = -x \\ x = y \\ x = \frac{a}{2} \end{cases}$$

Deci funcția are ca punct staționar punctul  $A\left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}, -\frac{a}{2}\right)$ .

Se calculează diferențiala de ordinul doi a funcției  $\phi(x, y) = xy - \frac{a}{2}(x + y - a)$  în punctul  $A\left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right)$  și se obține  $d^2\phi = 2dxdy$ .

Se diferențiază legătura și se obține  $dx = -dy$ . Înlocuind în diferențiala de ordinul doi se obține următoarea formă pătratică  $d^2\phi = -2(dy)^2$  care evident este negativ definită.

Deci punctul  $A\left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right)$  este punct de maxim al funcției  $f(x, y)$  ce verifică legătura  $x + y = a$ .

**Observație.** Din legătură se poate explicita  $y = a - x$  și se obține funcția de o singură variabilă  $f(x) = ax - x^2$ . Aceasta este o parabolă care admite un maxim în punctul  $x = \frac{a}{2}$ .

Deci  $A\left(\frac{a}{2}, \frac{a}{2}\right)$  este un punct de maxim pentru funcția  $f(x, y)$  ce satisface legătura  $x + y = a$ .

c) Se construiește funcția lui Lagrange

$$\phi(x, y, \lambda) = \cos^2 x + \cos^2 y + \lambda\left(x - y - \frac{\pi}{4}\right).$$

Se află punctele staționare ale funcției lui Lagrange rezolvând sistemul:

$$\begin{cases} \frac{\partial \phi}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial \phi}{\partial y} = 0 \\ \frac{\partial \phi}{\partial \lambda} = 0 \end{cases} \Rightarrow \begin{cases} -2 \sin x \cos x + \lambda = 0 \\ -2 \sin y \cos y - \lambda = 0 \\ x - y - \frac{\pi}{4} = 0 \end{cases}$$

$$\begin{cases} \lambda = \sin 2x \\ \sin 2x + \sin 2y = 0 \Rightarrow A_k \left( k \cdot \frac{\pi}{2}, (2k-1) \cdot \frac{\pi}{4}, 0 \right) \\ x - y = \frac{\pi}{4} \end{cases}$$

Se determină diferențiala de ordinul doi a funcției  $\phi(x, y) = \cos^2 x + \cos^2 y$  în punctul  $\left( k \frac{\pi}{2}, (2k-1) \cdot \frac{\pi}{4} \right)$ . Se deosebesc două situații:  $k$  par și  $k$  impar.

Pentru  $k$  par se obține  $d^2\phi = -2dx^2$ . Deci în acest caz punctele sunt de maxim.

Pentru  $k$  impar se obține  $d^2\phi = 2dx^2$ . Deci în acest caz punctele sunt de minim.

# CAPITOLUL VIII

## FUNCȚII IMPLICITE. DEPENDENȚĂ FUNCȚIONALĂ. SCHIMBĂRI DE VARIABILĂ

### 1. Funcții implicite

Fie  $F : D \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$ . După cum se știe graficul acestei funcții reprezintă o suprafață având ecuația:

$$z = F(x, y), (x, y) \in D$$

(1)

Intersectând graficul cu planul  $xOy$  se obține o mulțime de puncte, soluții ale ecuației:

$$F(x, y) = 0, (x, y) \in D$$

(2)

Este firesc să ne întrebăm dacă această mulțime de puncte din plan reprezintă graficul unei funcții de o variabilă. După cum se știe, pentru aceasta este necesar și suficient ca orice paralelă la  $Oy$  să intersecteze mulțimea cel mult într-un punct.

Într-adevăr dacă această condiție este îndeplinită, notând cu  $D_0$  mulțimea punctelor  $x_0 \in \mathbb{R}$  pentru care paralela la  $Oy$  intersectează efectiv mulțimea într-un punct, iar prin  $\varphi : D_0 \rightarrow \mathbb{R}$  funcția definită prin  $\varphi(x) = y$ ,  $x_0 \in D_0$ , unde  $y$  este ordonata punctului de intersecție, atunci graficul funcției  $\varphi$  coincide cu mulțimea soluțiilor ecuației (2).

$$\{(x, \varphi(x)) \mid x \in D_0\} \equiv \{(x, y) \mid F(x, y) = 0, (x, y) \in D\}$$

În acest caz spunem că ecuația (2) definește o funcție implicită, adică funcția  $\varphi$  este definită implicit prin ecuația (2).

#### Observația 8.1.1.

1<sup>0</sup> Este posibil ca o funcție  $F$  să nu definească o funcție implicită, dar să admită restricții care definească o funcție implicită.

2<sup>0</sup> Mai mult ne-ar interesa următorul aspect: dacă fixăm o soluție (2)  $(x_0, y_0) = 0$  este posibil să punem în evidență o vecinătate convenabilă a punctului astfel încât mulțimea soluțiilor ecuației (2) din această vecinătate să reprezinte graficul unei funcții de o variabilă?

Răspunsul la această întrebare este dat de următoarea propoziție.

**Propoziția 8.1.1. (TEOREMA DE EXISTENȚĂ ȘI UNICITATE A FUNCȚIILOR DEFINITE IMPLICIT)**

Fie  $F: \Delta \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  unde  $\Delta$  este un dreptunghi cu centrul într-un punct  $P_0(x_0, y_0)$  cu laturile paralele cu axele de coordonate. Dacă:


1.  $F(x_0, y_0) = 0$
2.  $F$  este continuă pe  $\Delta$
3. Pentru fiecare  $x$  fixat (din intervalul de pe axa  $Ox$  corespunzător lui  $\Delta$  paralele cu  $Ox$ ) funcția  $y \rightarrow F(x, y)$  este strict crescătoare (sau strict descrescătoare), atunci există un interval  $I \subset \mathbb{R}$  cu  $x_0$  în interior și o funcție  $\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}$  cu următoarele proprietăți:

- I.  $\varphi(x_0) = y_0$
- II.  $F(x, \varphi(x)) = 0$  pentru orice  $x \in I$
- III.  $\varphi$  este continuă pe  $I$
- IV. dacă  $(x, y) \in \Delta$  și  $F(x, y) = 0$  cu  $x \in I$  atunci  $y = \varphi(x)$ .

Funcția  $\varphi$  este unica funcție cu proprietățile (I-IV) pe  $I$ .

*Demonstrație:*

Fie conform enunțului un dreptunghi cu centrul în  $P_0(x_0, y_0)$  și cu laturile paralele cu axele de coordonate ca în figură



și prin  $P_0$  o paralelă la  $Oy$  și se cercetează comportarea funcției  $F$  în punctele acestei paralele, adică valorile funcției  $y = F(x_0, y)$  când  $y \in J$ .

Deoarece  $F(x_0, y_0) = 0$  rezultă:

$$F(x_0, y_0) < 0 \text{ pentru } y < y_0$$

și

$$F(x_0, y_0) > 0 \text{ pentru } y > y_0$$

De aici rezultă  $F(L_0) < 0$ . Cum  $F$  este continuă conform ipotezei 2 rezultă că există  $I_1$  pe latura inferioară a dreptunghiului cu centrul în  $L_0$  pe care  $F$  este negativă. În mod analog există  $I_2$  pe latura superioară a dreptunghiului cu centrul în  $M_0$  pe care  $F$  este pozitivă.

Proiectăm aceste intervale pe axa  $Ox$  și notăm cu  $I = \min\{I_1, I_2\}$ . Fie  $x \in I$  un punct arbitrar, paralela după acest punct la  $Oy$  intersectează laturile dreptunghiului în punctele  $L$  respectiv  $M$  și  $F(L) < 0$  și  $F(M) > 0$ .

Restricția lui  $F$  la această paralelă este tocmai funcția de o variabilă  $u \rightarrow F(x, y)$ ,  $u \in J$ , funcție continuă deoarece  $F$  este o funcție continuă pe  $\Delta$ .

Din proprietatea lui Cauchy rezultă că există  $y \in J$  astfel încât  $F(x, y) = 0$ ; acest punct  $y \in J$  este unic determinat de  $x \in I$ , deoarece în caz contrar am ajunge la o contradicție cu condiția 3 de strictă monotonie.

Definim funcția  $\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}$  prin  $\varphi(x) = y$  unde  $y$  este deci un punct unic din  $J$  astfel încât  $F(x, y) = 0$ , deci proprietățile II și IV sunt îndeplinite.

Dacă  $x = x_0$  atunci  $y = y_0$  deoarece  $F(x_0, y_0) = 0$ , înseamnă că  $\varphi(x_0) = y_0$  deci are loc proprietatea I.

Să observăm că  $\varphi$  este continuă în  $x_0$ , deoarece pentru orice  $\varepsilon > 0$  există  $(x_0 - \delta, x_0 + \delta)$  cu  $\delta > 0$  astfel încât oricare ar fi  $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$  ecuația  $F(x, y) = 0$  să aibă o soluție unică  $y \in (\varphi(x_0) - \varepsilon, \varphi(x_0) + \varepsilon)$  pentru orice  $x \in (x_0 - \delta, x_0 + \delta)$ .

Cu alte cuvinte  $|x - x_0| < \delta$  deci  $|\varphi(x) - \varphi(x_0)| < \varepsilon$ .

**Observația 8.1.2.** condiția 2 din Propoziția 8.1.1 se poate înlocui cu condiția mai slabă ca  $F$  să fie continuă separat cu fiecare variabilă.

**Propoziția 8.1.2. (TEOREMA DE EXISTENȚĂ, DERIVABILITATE ȘI UNICITATE)**

Fie  $F: \Delta \rightarrow \mathbb{R}$  unde  $\Delta$  este un dreptunghi cu laturile paralele cu axele de coordonate având centrul în  $P_0(x_0, y_0)$  cu următoarele proprietăți:

1.  $F(x_0, y_0) = 0$
2.  $F$  are derivate parțiale continue pe  $\Delta$
3.  $\frac{\partial F}{\partial y}(x, y) \neq 0$  pe  $\Delta$  atunci există un interval  $I$  cu centrul în  $x_0$  și o funcție

$\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}$  având următoarele proprietăți:

- I.  $\varphi(x_0) = y_0$
- II.  $F(x, \varphi(x)) = 0$  pentru orice  $x \in I$
- III. dacă  $(x, y) \in \Delta$  și  $F(x, y) = 0$  cu  $x \in I$  atunci  $y = \varphi(x)$ .
- IV.  $\varphi$  este derivabilă pe  $I$  și:

$$\varphi'(x) = - \frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x, \varphi(x))}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, \varphi(x))}$$

(3)

Funcția  $\varphi$  este unică cu proprietățile (I-IV) pe  $I$ .

**Demonstrație:**

Observăm în primul rând că sunt asigurate condițiile din ipoteza teoremei precedente după cum urmează:

- prima condiție este aceeași în ambele teoreme;
- întrucât prin 2 din Propoziția 8.1.2,  $F$  are derivate parțiale continue pe  $\Delta$ , din criteriul de diferențiabilitate rezultă că  $F$  este diferențiabilă pe  $\Delta$ , deci cu atât mai mult este continuă pe  $\Delta$ , așa că este îndeplinită condiția 2 din Propoziția 8.1.1.

- din condiția 3 a Propoziției 8.1.2 rezultă  $\frac{\partial F}{\partial y}(x, y) \neq 0$ . Se presupune

fără a restrânge generalitatea că  $\frac{\partial F}{\partial y}(x, y) > 0$ . Prin urmare pentru fiecare  $x$  fixat, funcția  $y \rightarrow F(x, y)$  este strict crescătoare, deci toate ipotezele Propoziției 8.1.1 sunt îndeplinite, există  $I \subset \mathbb{R}$  cu centrul în  $x_0$  și  $\varphi: I \rightarrow \mathbb{R}$  cu proprietățile (I-IV) din Propoziția 8.1.1, deci funcția  $\varphi$  are și proprietățile I, II și III din Propoziția 8.1.2. Conform criteriului de diferențiabilitate  $F$  este diferențiabilă pe  $\Delta$ , în particular este diferențiabilă în  $(x_0, y_0)$ , deci există  $\alpha: \Delta \rightarrow \mathbb{R}, \beta: \Delta \rightarrow \mathbb{R}$  continue în  $(x_0, y_0)$  cu  $\alpha(x_0, y_0) = \beta(x_0, y_0) = 0$  astfel încât pentru orice  $(x, y) \in \Delta$  are loc relația:

$$F(x, y) - F(x_0, y_0) = \frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0)(y - y_0) + \alpha(x, y)(x - x_0) + \beta(x, y)(y - y_0)$$

Luând  $x \in I$ ,  $y = \varphi(x)$  avem  $F(x, \varphi(x)) = 0$  deci relația precedentă devine:

$$\frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0)(x - x_0) + \frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0)(\varphi(x) - \varphi(x_0)) + \alpha(x, y)(x - x_0) + \beta(x, y)(\varphi(x) - \varphi(x_0)) = 0$$

Împărțind cu  $x - x_0$  obținem:

$$\frac{\varphi(x) - \varphi(x_0)}{x - x_0} = - \frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0) + \alpha(x, y)}{\frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) + \beta(x, y)}$$

Dacă  $x \rightarrow x_0$  rezultă  $\varphi(x) \rightarrow \varphi(x_0)$  deoarece  $\varphi$  este continuă în  $x_0$ .

**Observația 8.1.4.**



Aplicând regula de derivare a unui cât și regula de derivare a funcțiilor compuse din relația (3) avem:

$$\varphi''(x) = - \frac{\left[ \frac{\partial^2 F}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} \cdot \frac{dy}{dx} \right] \frac{\partial F}{\partial y} - \frac{\partial F}{\partial x} \left[ \frac{\partial^2 F}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 F}{\partial y^2} \cdot \frac{dy}{dx} \right]}{\left( \frac{\partial F}{\partial y} \right)^2}$$

Se generalizează Propoziția 8.1.2 la funcțiile definite implicit de  $n$  ori variabile, astfel:

### Propoziția 8.1.3.

Fie  $D \subset \mathbb{R}^n$  o mulțime convexă deschisă și  $F : D \times I_k \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $I_k = [y_0 - k, y_0 + k]$ ,  $k > 0$  unde  $F \in C^1_{D \times I_k}$ .

Dacă:

1) Există  $(\bar{x}_0, y_0) \in \overbrace{D \times I_k}^0$  astfel încât  $F(\bar{x}_0, y_0) = 0$

2)  $F$  este derivabilă în raport cu  $y$  pe  $\overbrace{D \times I_k}^0$  și  $F'_y(\bar{x}, y) \neq 0$

Atunci există  $h_i > 0$  astfel încât  $\prod_{i=1}^n [x_{0i} - h_i, x_{0i} + h_i] \times [y_0 - k, y_0 + k] \subset D \times I_k$

și există  $f : \prod_{i=1}^n [x_{0i} - h_i, x_{0i} + h_i] \rightarrow I_k$  cu proprietățile:

a)  $f(\bar{x}_0) = y_0$

b)  $F(\bar{x}, f(\bar{x})) = 0 \quad (\forall) \bar{x} \in \prod_{i=1}^n [x_{0i} - h_i, x_{0i} + h_i]$

c)  $f \in C^1_D$  și  $f'_{x_i} = - \frac{F'_{x_i}(\bar{x}, y)}{F'_y(\bar{x}, y)}$ ;  $f$  este unică cu aceste proprietăți.

### Aplicația geometrică

Fie curba dată implicit.

$$F(x, y) = 0$$

(5)

Graficul acestei curbe este mulțimea punctelor  $(x, y)$  din plan care verifică ecuația (5). Dacă sunt îndeplinite, în vecinătatea unui punct  $(x_0, y_0)$  de pe curbă, condițiile din Propoziția 8.1.1 rezultă că pe o vecinătate a acestui punct graficul coincide cu graficul funcției  $y = \varphi(x)$ , mai mult, dacă  $\varphi$  este derivabilă în  $x_0$

atunci, după cum se știe, curba admite tangentă în punctul  $(x_0, y_0)$  a cărei pantă este  $\varphi'(x)$ . Prin urmare ecuația

$$y - y_0 = \varphi'(x_0)(x - x_0)$$

în care ținând seama de relația (3) avem:

$$(x - x_0) \frac{\partial F}{\partial x}(x_0, y_0) + (y - y_0) \frac{\partial F}{\partial y}(x_0, y_0) = 0$$

### Exemple:

1) Să se calculeze  $\frac{dy}{dx}$  și  $\frac{d^2y}{dx^2}$  pentru  $y$  definit de  $F(\sin x + y, \cos y + x) = 0$  cu  $F \in C^2(D)$ ,  $D \subset \mathbb{R}^2$ .

#### Rezolvare:

Se notează cu:  $u = \sin x + y$  și  $v = \cos y + x$  de unde rezultă  $F(u, v) = 0$ . Se derivează funcție de  $x$  (ținând cont că  $u$  și  $v$  sunt funcții de  $x$  și  $y$ , iar  $y$  este funcție de  $x$ )

$$\frac{\partial F}{\partial u} \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial v} \frac{\partial v}{\partial x} = 0$$

sau

$$\frac{\partial F}{\partial u} \left[ \cos x + \frac{dy}{dx} \right] + \frac{\partial F}{\partial v} \left[ 1 - \sin y \cdot \frac{dy}{dx} \right] = 0$$

(\*)

de unde

$$\frac{dy}{dx} = - \frac{\cos x \cdot \frac{\partial F}{\partial u} + \frac{\partial F}{\partial v}}{\frac{\partial F}{\partial u} - \sin y \cdot \frac{\partial F}{\partial v}}$$

Dacă se derivează încă o dată relația (\*) în raport cu  $x$  se obține:

$$\begin{aligned} \frac{\partial F}{\partial u} \cdot \left[ -\sin x + \frac{d^2y}{dx^2} \right] + \frac{\partial^2 F}{\partial u^2} \cdot \left( \cos x + \frac{dy}{dx} \right)^2 + 2 \cdot \frac{\partial^2 F}{\partial u \partial v} \left( \cos x + \frac{dy}{dx} \right) \left( 1 - \sin y \cdot \frac{dy}{dx} \right) + \\ + \frac{\partial^2 F}{\partial v^2} \left( 1 - \sin y \cdot \frac{dy}{dx} \right)^2 + \frac{\partial F}{\partial v} \left[ 0 - \sin y \cdot \frac{d^2y}{dx^2} - \cos y \left( \frac{dy}{dx} \right)^2 \right] = 0 . \end{aligned}$$

2) Să se arate că funcția  $z = z(x, y)$  definită implicit de ecuația  $F(x - az, y - bz) = 0$  unde  $a, b \in \mathbb{R}$ ,  $F \in C^{(1)}(D)$  verifică ecuația  $a \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + b \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = 1$ .

Rezolvare:

Se notează cu  $u = x - az$  și  $v = y - bz$  rezultă:

$$\left(1 - a \cdot \frac{\partial z}{\partial x}\right) \cdot \frac{\partial F}{\partial u} - b \cdot \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial F}{\partial v} = 0$$
$$-a \cdot \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial F}{\partial u} + \left(1 - b \cdot \frac{\partial z}{\partial y}\right) \cdot \frac{\partial F}{\partial v} = 0$$

deci

$$\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{a \cdot \frac{\partial F}{\partial u} + b \cdot \frac{\partial F}{\partial v}} \cdot \frac{\partial F}{\partial u}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1}{a \cdot \frac{\partial F}{\partial u} + b \cdot \frac{\partial F}{\partial v}} \cdot \frac{\partial F}{\partial v}$$

Așadar,  $a \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + b \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = 1$ .

3) Să se calculeze  $\frac{dy}{dx}$  și  $\frac{d^2y}{dx^2}$  dacă  $y = y(x)$  este definită implicit de ecuația  $(x^2 + y^2)^3 - 3(x^2 + y^2) + 1 = 0$ .

Rezolvare:

Se notează  $F(x, y) = (x^2 + y^2)^3 - 3(x^2 + y^2) + 1$

$$\frac{\partial F}{\partial x} = 3(x^2 + y^2)^2 \cdot 2x - 3 \cdot 2x = 6x \left[ (x^2 + y^2)^2 - 1 \right]$$

$$\frac{\partial F}{\partial y} = 3(x^2 + y^2)^2 \cdot 2y - 3 \cdot 2y = 6y \left[ (x^2 + y^2)^2 - 1 \right]$$

Ținând cont de aceste derivate se obține:

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}(x, y)}{\frac{\partial F}{\partial y}(x, y)} = -\frac{x}{y}$$

de unde

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left( -\frac{x}{y} \right) = -\frac{1 \cdot y - x \cdot \frac{dy}{dx}}{y^2} = \frac{-y - x \left( -\frac{x}{y} \right)}{y^2} = -\frac{x^2 + y^2}{y^2}. \quad (\text{s-a ținut cont}$$

că  $y = y(x)$ )

4) Funcția  $y = y(x)$  este definită prin ecuația  $\ln\sqrt{x^2 + y^2} = a \cdot \operatorname{arctg} \frac{y}{x}$   
 ( $a \neq 0$ ). Calculați  $\frac{dy}{dx}$  și  $\frac{d^2y}{dx^2}$ .

Rezolvare:

Se derivează ecuația ținând cont că  $y = y(x)$  și se obține:

$$\frac{2x + 2y \frac{dy}{dx}}{2\sqrt{x^2 + y^2} \cdot \sqrt{x^2 + y^2}} = a \cdot \frac{\frac{dy}{dx} - y}{1 + \frac{y^2}{x^2}}$$

Se rezolvă această ecuație în raport cu  $\frac{dy}{dx}$ .

5) Să se arate că ecuația  $F(x, y) = 0$ , definește implicit pe  $y = f(x)$  și să se calculeze  $f'(x)$ , unde  $F(x, y) = x^2 + 2y + x \cdot (\ln x - \ln y) - 3$ .

Rezolvare:

Se observă că pentru  $(1; 1)$  se obține:

$$1. F(1, 1) = 1 + 2 + 1 \cdot (\ln 1 - \ln 1) - 3 = 3 - 3 = 0$$

$$2. \frac{\partial F}{\partial y} = 2 - \frac{x}{y} \Rightarrow \frac{\partial F}{\partial y}(1, 1) = 2 - 1 = 1 \neq 0$$

De asemenea, există  $\frac{\partial F}{\partial x}$  și  $\frac{\partial F}{\partial y}$  continue în  $D((1, 1); r)$ ,  $r \in (0, 1)$ .

Deci fiind satisfăcute condițiile din Propoziția 8.1.3 atunci  
 $(\exists) I = [1 - h, 1 - k]$ ;  $J = [1 + h, 1 + k]$  și  $f: I \rightarrow J$ ,  $I \times J \subset D$  unică cu proprietățile:

a)  $f(1) = 1$ ;

b)  $F(x, f(x)) = 0$

c)  $f \in C_1^1$  și  $f'(x) = -\frac{y(2x + \ln x - \ln y + 1)}{2y - x}$

O altă problemă care se pune în legătură cu funcțiile definite implicit este determinarea diferențialelor (de diverse ordine) ale acestora.

Pentru a găsi diferențiala de ordinul întâi, doi, ... pentru funcția  $y = f(\bar{x})$  definită implicit de ecuația  $F(\bar{x}, y) = 0$  trebuie calculate derivatele de ordinul întâi, doi, ... ale funcției  $y = f(\bar{x})$ . Se știe că

$$df(\bar{x}) = \sum_{i=1}^n \frac{\partial f(\bar{x})}{\partial x_i} dx_i = -\sum_{i=1}^n \frac{F'_{x_i}(\bar{x}, y)}{F'_y(\bar{x}, y)} dx_i.$$

$$\text{Deci } df(\bar{x}) = -\frac{1}{F'_y(\bar{x}, y)} \cdot \sum_{i=1}^n F'_{x_i}(\bar{x}, y) dx_i.$$

Se dă în continuare un algoritm pentru determinarea punctelor de extrem ale funcției  $y = f(\bar{x})$  definită implicit de ecuația:

$$F(\bar{x}, y) = 0.$$

Acest algoritm are următorii pași:

1. se află punctele staționare ale funcției  $y = f(\bar{x})$  care satisfac condiția  $F'_y(\bar{x}, y) \neq 0$ .

Pentru aceasta se rezolvă sistemul

$$\begin{cases} F(\bar{x}, y) = 0 \\ F'_{x_1}(\bar{x}, y) = 0 \\ \vdots \\ F'_{x_n}(\bar{x}, y) = 0 \end{cases}$$

2. Fie  $(\bar{x}_0, y_0)$  o soluție a sistemului anterior.

Se calculează  $a_{ij} = \frac{\partial^2 f(\bar{x}_0)}{\partial x_i \partial x_j}$ .

3. Se calculează determinanții

$$\Delta_k = \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} & \dots & a_{1k} \\ a_{21} & a_{22} & \dots & a_{2k} \\ \dots & \dots & \dots & \dots \\ a_{k1} & a_{k2} & \dots & a_{kk} \end{vmatrix}, \quad k = \overline{1, n}$$

Și se aplică teorema lui Sylvester [vezi cap 7, paragraful 3.8].

### Exemplu:

Să se afle extremele funcției  $z(x, y)$  definite implicit de ecuația:

$$x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 7 = 0$$

Rezolvare:

Fie  $F(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 7$ .

Se rezolvă sistemul 
$$\begin{cases} F(x, y, z) = 0 \\ F'_x(x, y, z) = 0 \\ F'_y(x, y, z) = 0 \end{cases}$$
 și se obțin soluțiile  $(1, 1, 3)$  și

$(1, 1, -3)$ . Pentru  $(1, 1, 3)$  se obține  $a_{11} = -\frac{1}{3}$ ;  $a_{22} = -\frac{1}{3}$ ;  $a_{12} = a_{21} = 0$ ;

$\Delta_1 = -\frac{1}{3} < 0$ ;  $\Delta_2 = \frac{1}{5} > 0$ . Deci  $(1, 1, 3)$  este punct de maxim.

Analog se cercetează cel de-al doilea punct staționar.

## 2. Sisteme de funcții implicite

### Definiția 8.2.1.

I. Un sistem de  $m$  ecuații:

$$\begin{cases} F_1(x_1, x_2, \dots, x_n; y_1, y_2, \dots, y_m) = 0 \\ F_2(x_1, x_2, \dots, x_n; y_1, y_2, \dots, y_m) = 0 \\ \vdots \\ F_m(x_1, x_2, \dots, x_n; y_1, y_2, \dots, y_m) = 0 \end{cases} \quad (1)$$

unde  $F_k(x_1, x_2, \dots, x_n; y_1, y_2, \dots, y_m) = 0$ ,  $k = \overline{1, m}$  sunt  $m$  funcții de  $(n + m)$  variabile definite pe  $X \times Y$  cu  $X \subset \mathbb{R}^n$ ,  $Y \subset \mathbb{R}^m$  se numește sistem de  $m$  funcții implicite.

II. Un sistem de  $m$  funcții

$$\begin{cases} y_1 = f_1(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ y_2 = f_2(x_1, x_2, \dots, x_n) \\ \vdots \\ y_m = f_m(x_1, x_2, \dots, x_n) \end{cases} \quad (2)$$

de  $n$  variabile definite pe  $A \subset X \subset \mathbb{R}^n$  este o soluție a sistemului (1) în raport cu variabilele  $y_1, y_2, \dots, y_m$  pe mulțimea  $A$  dacă înlocuind pe  $y_i$  ( $i = \overline{1, m}$ ) în sistem îl verifică identic.

$$\begin{cases} F_1(x_1, x_2, \dots, x_n; f_1(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, x_2, \dots, x_n)) = 0 \\ \vdots \\ F_m(x_1, x_2, \dots, x_n; f_1(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, x_2, \dots, x_n)) = 0 \end{cases}$$

**Observația 8.2.1.** În cazul în care sistemul (1) are pe mulțimea  $A$  o singură soluție (2) se spune că funcțiile  $f_1, f_2, \dots, f_m$  sunt definite implicit de sistemul de ecuații (1) sau că sistemul de funcții (2) s-a obținut din sistemul de ecuații (1) prin rezolvare în raport cu variabilele  $y_1, y_2, \dots, y_m$ .

**Definiția 8.2.2.** Dacă  $F_i = F_i(y_1, y_2, \dots, y_m)$ ,  $i = \overline{1, m}$  au derivate parțiale în raport cu variabilele  $y_1, y_2, \dots, y_m$  pe mulțimea  $E$  atunci determinantul de funcții

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial F_1}{\partial y_1} & \frac{\partial F_1}{\partial y_2} & \cdots & \frac{\partial F_1}{\partial y_m} \\ \frac{\partial F_2}{\partial y_1} & \frac{\partial F_2}{\partial y_2} & \cdots & \frac{\partial F_2}{\partial y_m} \\ \vdots & \vdots & \cdots & \vdots \\ \frac{\partial F_m}{\partial y_1} & \frac{\partial F_m}{\partial y_2} & \cdots & \frac{\partial F_m}{\partial y_m} \end{vmatrix}$$

se numește determinantul funcțional al funcțiilor  $F_1, F_2, \dots, F_m$  în raport cu variabilele  $y_1, y_2, \dots, y_m$  și se notează cu:

$$\frac{D(F_1, F_2, \dots, F_m)}{D(y_1, y_2, \dots, y_m)}$$

sau iacobian și se notează cu  $J$ .

### Propoziția 8.2.1. (Teorema de existență)

Fie  $E \subset \mathbb{R}^{n+m}$  și  $(\bar{x}_0, \bar{y}_0) = (x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0; y_1^0, y_2^0, \dots, y_m^0) \in \text{int} E$  și funcția vectorială  $\bar{F} = (F_1, F_2, \dots, F_m): E \rightarrow \mathbb{R}^m$ .

Dacă:

1.  $\bar{F}(\bar{x}_0, \bar{y}_0) = 0$

2. funcțiile reale  $F_i$ , ( $i = \overline{1, m}$ ) au derivate parțiale continue  $\frac{\partial F_i}{\partial x_j}$  ( $1 \leq j \leq n$ ),

$\frac{\partial F_i}{\partial y_k}$  ( $1 \leq k \leq m$ ) într-o vecinătate  $U \times V$  a punctului  $(\bar{x}_0, \bar{y}_0)$ .

3. iacobianul  $\frac{D(F_1, F_2, \dots, F_m)}{D(y_1, y_2, \dots, y_m)} = \frac{D(\bar{F})}{D(\bar{y})}$  este diferit de 0 în punctul  $(\bar{x}_0, \bar{y}_0)$

atunci:

I. există o vecinătate  $U_0 \times V_0$  a lui  $(\bar{x}_0, \bar{y}_0)$  cu  $U_0 \subset \mathbb{R}^n$ ,  $V_0 \subset \mathbb{R}^m$  și o funcție vectorială unică  $\bar{f}(\bar{x}) = (f_1(\bar{x}), f_2(\bar{x}), \dots, f_m(\bar{x})): U_0 \rightarrow V_0$  astfel încât  $\bar{y}_0 = \bar{f}(\bar{x}_0)$  și  $\bar{F}(\bar{x}, \bar{f}(\bar{x})) = 0$  pentru orice  $\bar{x} \in U_0$ .

II. funcțiile reale  $f_1(\bar{x}), f_2(\bar{x}), \dots, f_m(\bar{x})$  au derivate parțiale

$$\frac{\partial f_1}{\partial x_i} = - \frac{\frac{D(F_1, F_2, \dots, F_m)}{D(x_i, y_2, \dots, y_m)}}{\frac{D(F_1, F_2, \dots, F_m)}{D(y_1, y_2, \dots, y_m)}}, \dots$$

continue pe  $U_0$  și

$$\dots$$
$$\frac{\partial f_m}{\partial x_i} = - \frac{\frac{D(F_1, F_2, \dots, F_m)}{D(y_1, y_2, \dots, y_{m-1}, x_i)}}{\frac{D(F_1, F_2, \dots, F_m)}{D(y_1, y_2, \dots, y_m)}}, \dots$$

III. dacă funcțiile  $F_1, F_2, \dots, F_m$  au derivate parțiale de ordinul  $k$  pe  $U \times V$  atunci funcțiile  $f_1, f_2, \dots, f_m$  au derivate parțiale de ordinul  $k$  continue pe  $U_0$ .

*Demonstrație:*

Se face prin inducție după  $m$ .

Pentru  $m=1$  (un sistem format dintr-o singură ecuație care definește o singură funcție reală implicită) Propoziția 8.1.1.

### 3. Dependență funcțională

**Definiția 8.3.1.** Dacă:

$y_1 = f_1(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ,  $y_2 = f_2(x_1, x_2, \dots, x_n)$ , ...,  $y_m = f_m(x_1, x_2, \dots, x_n)$  sunt  $m$  funcții reale definite pe o mulțime  $X \subset \mathbb{R}^n$ , funcția reală  $F = F(x_1, x_2, \dots, x_n): X \rightarrow \mathbb{R}$  depinde de funcțiile  $f_1, f_2, \dots, f_m$  pe mulțimea  $X$  dacă există o funcție reală de  $m$  variabile  $\Phi = \Phi(y_1, y_2, \dots, y_m): Y \subset \mathbb{R}^m \rightarrow \mathbb{R}$  astfel încât pentru orice  $\bar{x} \in X$  să avem identitatea:

$$F(x_1, x_2, \dots, x_n) \equiv \Phi[f_1(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, x_2, \dots, x_n)]$$

**Exemplu:**

Fie funcțiile

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x, y) = x - y$$

$$g: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, g(x, y) = xy$$

$$h: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, h(x, y) = x^2 + y^2$$

Să se cerceteze dacă funcțiile sunt în dependență funcțională.

Rezolvare:

Deoarece  $(x - y)^2 = x^2 + y^2 - 2xy \Rightarrow h = f^2 + 2g$  deci  $h$  depinde de  $f$  și  $g$  pe  $\mathbb{R}^2$ .

**Definiția 8.3.2.** Funcțiile reale  $y_1 = f_1(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ,  $y_2 = f_2(x_1, x_2, \dots, x_n)$ , ...,  $y_m = f_m(x_1, x_2, \dots, x_n)$  definite pe  $X \subset \mathbb{R}^n$  sunt în dependență funcțională pe o mulțime  $A \subset X$  dacă cel puțin una din ele depinde de celelalte pe mulțimea  $A$ .



**Propoziția 8.3.1.** Condiția necesară și suficientă pentru ca  $n$  funcții de  $n$  variabile independente:

$y_1 = f_1(x_1, x_2, \dots, x_n)$ ,  $y_2 = f_2(x_1, x_2, \dots, x_n)$ , ...,  $y_n = f_n(x_1, x_2, \dots, x_n)$  definite pe o mulțime  $X \subset \mathbb{R}^n$  cu derivate parțiale continue pe  $X$  să fie în dependență funcțională pe mulțimea  $A \subset X$  este ca iacobianul

$$\frac{D(y_1, y_2, \dots, y_n)}{D(x_1, x_2, \dots, x_n)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \frac{\partial f_n}{\partial x_1} & \frac{\partial f_n}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_n}{\partial x_n} \end{vmatrix}$$

să fie identic nul pe  $A$ .

*Demonstrație:*

Necesitatea. Pentru  $n = 3$ .

$$\text{Fie } \begin{cases} y_1 = f_1(x_1, x_2, x_3) \\ y_2 = f_2(x_1, x_2, x_3) \\ y_3 = f_3(x_1, x_2, x_3) \end{cases}$$

(3)

și să presupunem că între funcțiile  $y_1, y_2, y_3$  avem relația

$$\Phi(y_1, y_2, y_3) = 0$$

(4)

Diferențiind în (4) se obține:

$$\frac{\partial \Phi}{\partial y_1} dy_1 + \frac{\partial \Phi}{\partial y_2} dy_2 + \frac{\partial \Phi}{\partial y_3} dy_3 = 0$$

(5)

însă din (3) se obține evident:

$$dy_1 = \frac{\partial f_1}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial f_1}{\partial x_2} dx_2 + \frac{\partial f_1}{\partial x_3} dx_3$$

$$dy_2 = \frac{\partial f_2}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial f_2}{\partial x_2} dx_2 + \frac{\partial f_2}{\partial x_3} dx_3$$

$$dy_3 = \frac{\partial f_3}{\partial x_1} dx_1 + \frac{\partial f_3}{\partial x_2} dx_2 + \frac{\partial f_3}{\partial x_3} dx_3$$

care înlocuite în (5) și regrupate după  $dx_1, dx_2, dx_3$  dau egalitatea:

$$\left( \frac{\partial \Phi}{\partial y_1} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} + \frac{\partial \Phi}{\partial y_2} \frac{\partial f_2}{\partial x_1} + \frac{\partial \Phi}{\partial y_3} \frac{\partial f_3}{\partial x_1} \right) dx_1 + \left( \frac{\partial \Phi}{\partial y_1} \frac{\partial f_1}{\partial x_2} + \frac{\partial \Phi}{\partial y_2} \frac{\partial f_2}{\partial x_2} + \frac{\partial \Phi}{\partial y_3} \frac{\partial f_3}{\partial x_2} \right) dx_2 +$$

$$+ \left( \frac{\partial \Phi}{\partial y_1} \frac{\partial f_1}{\partial x_3} + \frac{\partial \Phi}{\partial y_2} \frac{\partial f_2}{\partial x_3} + \frac{\partial \Phi}{\partial y_3} \frac{\partial f_3}{\partial x_3} \right) dx_3 = 0$$

relație care trebuie să fie adevărată oricare ar fi  $dx_1$ ,  $dx_2$ ,  $dx_3$  și care conduce la sistemul omogen:

$$\begin{cases} \frac{\partial \Phi}{\partial y_1} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} + \frac{\partial \Phi}{\partial y_2} \frac{\partial f_2}{\partial x_1} + \frac{\partial \Phi}{\partial y_3} \frac{\partial f_3}{\partial x_1} = 0 \\ \frac{\partial \Phi}{\partial y_1} \frac{\partial f_1}{\partial x_2} + \frac{\partial \Phi}{\partial y_2} \frac{\partial f_2}{\partial x_2} + \frac{\partial \Phi}{\partial y_3} \frac{\partial f_3}{\partial x_2} = 0 \\ \frac{\partial \Phi}{\partial y_1} \frac{\partial f_1}{\partial x_3} + \frac{\partial \Phi}{\partial y_2} \frac{\partial f_2}{\partial x_3} + \frac{\partial \Phi}{\partial y_3} \frac{\partial f_3}{\partial x_3} = 0 \end{cases}$$

în care necunoscutele sunt  $\frac{\partial \Phi}{\partial y_1}$ ,  $\frac{\partial \Phi}{\partial y_2}$ ,  $\frac{\partial \Phi}{\partial y_3}$ .

Asupra relației  $\Phi(y_1, y_2, y_3) = 0$  am făcut ipoteza că nu este identic nulă în  $y_1, y_2, y_3$ , deci  $\frac{\partial \Phi}{\partial y_1}$ ,  $\frac{\partial \Phi}{\partial y_2}$ ,  $\frac{\partial \Phi}{\partial y_3}$  nu trebuie să fie simultan nule, ceea ce conform teoremei lui ROUCHE conduce la

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \frac{\partial f_1}{\partial x_3} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \frac{\partial f_2}{\partial x_3} \\ \frac{\partial f_3}{\partial x_1} & \frac{\partial f_3}{\partial x_2} & \frac{\partial f_3}{\partial x_3} \end{vmatrix} = 0$$

pentru orice  $(x_1, x_2, x_3) \in A$ .

Reciproc (**suficiența**).

Dacă  $\frac{D(y_1, y_2, y_3)}{D(x_1, x_2, x_3)} = 0$  pe  $A$  există cel puțin o legătură între  $y_1, y_2, y_3$  pe

$A$ .

Această propoziție se poate generaliza la un sistem de  $n$  funcții cu  $m$  variabile astfel:

**Propoziția 8.3.2.** Fie sistemul de funcții  $f_1(\bar{x}), f_2(\bar{x}), \dots, f_n(\bar{x})$ ,  $\bar{x} = (x_1, x_2, \dots, x_m)$ . Dacă există un minor  $r$  al matricii iacobiene al acestui sistem de funcții, diferit de zero în  $\bar{x}_0 \in D$  și toți minorii de ordin  $r+1$  sunt nuli în vecinătatea  $V$  a lui  $\bar{x}_0$ , atunci cele  $r$  funcții ce apar în minorul de ordinul  $r$  sunt independente în  $V$ , celelalte  $n-r$  funcții depind de aceste  $r$  funcții.

**Definiția 8.3.3.**

Funcțiile  $f_1(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, f_n(x_1, x_2, \dots, x_n)$  definite pe o mulțime  $X \subset \mathbb{R}^n$  se spune că sunt independente într-un punct  $(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0) \in X$  dacă nici una din funcții nu depinde de celelalte într-o vecinătate a lui  $(x_1^0, x_2^0, \dots, x_n^0)$ .

Funcțiile  $f_1, f_2, \dots, f_n$  sunt independente pe  $X$  dacă sunt independente în orice punct interior al lui  $X$ .

**Propoziția 8.3.2.** Fie funcțiile  $f_1(x_1, x_2, \dots, x_n), \dots, f_m(x_1, x_2, \dots, x_n)$  definite pe o mulțime  $X \subset \mathbb{R}^n$ . Dacă funcțiile  $f_i$  au derivate parțiale  $\frac{\partial f_i}{\partial x_j}$  continue pe  $X$  și dacă rangul matricii

$$M = \begin{vmatrix} \frac{\partial f_1}{\partial x_1} & \frac{\partial f_1}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_1}{\partial x_n} \\ \frac{\partial f_2}{\partial x_1} & \frac{\partial f_2}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_2}{\partial x_n} \\ \vdots & \vdots & \dots & \vdots \\ \frac{\partial f_m}{\partial x_1} & \frac{\partial f_m}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial f_m}{\partial x_n} \end{vmatrix}$$

este  $s \leq m$  pe  $X$ , atunci din cele  $m$  funcții date, există  $s$  dintre ele independente pe  $X$ , iar celelalte  $m - s$  rămase sunt dependente de acestea.

**Exemple:**

1) Sistemul 
$$\begin{cases} x^3 + y^3 + z^3 + u^3 = 1 \\ xy^2 + yz^2 + zu^2 = 2 \\ \ln(x^2 + y^2) + e^{z^2 + u^2} = 3 \end{cases}$$
 definește  $y, z$  și  $u$  ca funcții de  $x$  în

$D \in \mathbb{R}^3$ . Să se calculeze  $\frac{dy}{dx}, \frac{dz}{dx}, \frac{du}{dx}$ .

Rezolvare:

Derivând în raport cu  $x$  ecuațiile sistemului, ținând seama că  $y, z$  și  $u$  sunt funcții de  $x$  obținem:

$$\begin{cases} 3x^2 + 3y^2 + 3z^2 \frac{dz}{dx} + 2u \frac{du}{dx} = 0 \\ y^2 + 2xy \frac{dy}{dx} + 2yz \frac{dz}{dx} + u^2 \frac{dz}{dx} + 2zu \frac{du}{dx} = 0 \\ \frac{2x}{x^2 + y^2} + \frac{2y}{x^2 + y^2} + 2ze^{z^2 + u^2} \frac{dz}{dx} + 2ue^{z^2 + u^2} \frac{du}{dx} = 0 \end{cases}$$

Sistemul are o unică soluție dacă:

$$\Delta = \begin{vmatrix} 3y^2 & 3z^2 & 2u \\ 2xy + z^2 & 2yz + u^2 & 2zu \\ \frac{2y}{x^2 + y^2} & 2ze^{z^2+u^2} & 2ue^{z^2+u^2} \end{vmatrix} \neq 0$$

$$\frac{dy}{dx} = \frac{\Delta_1}{\Delta}; \Delta_1 = \begin{vmatrix} -3y^2 & 3z^2 & 2u \\ -y^2 & 2yz + u^2 & 2zu \\ \frac{2y}{x^2 + y^2} & 2ze^{z^2+u^2} & 2ue^{z^2+u^2} \end{vmatrix}$$

$$\frac{dz}{dx} = \frac{\Delta_2}{\Delta}; \Delta_2 = \begin{vmatrix} 3y^2 & -3z^2 & 2u \\ 2xy + z^2 & -y^2 & 2zu \\ \frac{2y}{x^2 + y^2} & -\frac{2x}{x^2 + y^2} & 2ue^{z^2+u^2} \end{vmatrix}$$

$$\frac{du}{dx} = \frac{\Delta_3}{\Delta}; \Delta_3 = \begin{vmatrix} 3y^2 & 3z^2 & -3x^2 \\ 2xy + z^2 & 2yz + u^2 & -y^2 \\ \frac{2y}{x^2 + y^2} & 2ze^{z^2+u^2} & -\frac{2x}{x^2 + y^2} \end{vmatrix}$$

2) Se dau funcțiile:  $u = f\left(\frac{x-y}{y-z}\right), v = g\left(\frac{y-z}{z-x}\right), w = h\left(\frac{z-x}{x-y}\right)$  cu

$f, g, h \in C^1(D), D \subseteq R^3$ . Se cere:

1. să se arate că sunt în dependență funcțională;
2. să se găsească legătura dintre ele.

Rezolvare:

$$1. \text{ Trebuie să arătăm că: } \frac{D(u, v, w)}{D(x, y, z)} = \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial u}{\partial z} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} & \frac{\partial v}{\partial z} \\ \frac{\partial w}{\partial x} & \frac{\partial w}{\partial y} & \frac{\partial w}{\partial z} \end{vmatrix} = 0.$$

Notând  $\alpha = \frac{x-y}{y-z}, \beta = \frac{y-z}{z-x}, \gamma = \frac{z-x}{x-y}$  obținem:

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{df}{d\alpha} \frac{\partial \alpha}{\partial x} = \frac{df}{d\alpha} \frac{1}{y-z}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{df}{d\alpha} \frac{\partial \alpha}{\partial y} = \frac{df}{d\alpha} \frac{z-x}{(y-z)^2}$$

$$\frac{\partial u}{\partial z} = \frac{df}{d\alpha} \frac{\partial \alpha}{\partial z} = \frac{df}{d\alpha} \frac{x-y}{(y-z)^2}$$

.....  
de unde rezultă:

$$\frac{D(u,v,w)}{D(x,y,z)} = f' \cdot g' \cdot h' \begin{vmatrix} y-z & z-x & x-y \\ y-z & z-x & x-y \\ y-z & z-x & x-y \end{vmatrix} \cdot \frac{1}{(y-z)^2 (z-x)^2 (x-y)^2} = 0$$

2. Pe  $D' \subset D$  funcțiile  $f, g, h$  fiind monotone avem:

$$\frac{x-y}{y-z} = f^{-1}(u), \frac{y-z}{z-x} = g^{-1}(v), \frac{z-x}{x-y} = h^{-1}(w)$$

deci

$$f^{-1}(u) \cdot g^{-1}(v) \cdot h^{-1}(w) = 1.$$

3) Să se determine  $\alpha$  astfel încât funcțiile:

$$u = f(\alpha x + 2y - z), v = g(-x - y + 2z), w = h(x + 3y - 2z)$$

(unde  $f, g, h$  sunt funcții derivabile în raport cu argumentul lor într-un domeniu  $V \in \mathbb{R}^3$ ) să fie în dependență funcțională în  $V$ .

Rezolvare:

$$\frac{D(u,v,w)}{D(x,y,z)} = f' \cdot g' \cdot h' \begin{vmatrix} \alpha & 2 & -1 \\ -1 & -1 & 2 \\ 1 & 3 & -2 \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow \alpha = 2$$

Să se găsească legătura. Pentru  $\alpha = \frac{5}{4}$  avem:

$$\begin{cases} \frac{5}{4}x + 2y - z = f^{-1}(u) \\ -x - y + 2z = g^{-1}(v) \\ x + 3y - 2z = h^{-1}(w) \end{cases}$$

de unde:

$$\begin{vmatrix} 2 & -1 \\ -1 & 2 \end{vmatrix} = 4 - 1 = 3 \neq 0$$

Pentru ca sistemul să fie compatibil trebuie ca

$$\Delta_{car} = \begin{vmatrix} f^{-1}(u) & 2 & -1 \\ g^{-1}(v) & -1 & 2 \\ h^{-1}(w) & 3 & -2 \end{vmatrix}$$

## 4. Extreme condiționate

În capitolul VII paragraful 3 este dat algoritmul de determinare a punctelor de extrem condiționate. În continuare se prezintă pe larg extremele condiționate.

Fie  $f : E \subset \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(\bar{x}) = f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  și fie  $A \subset E$ .

**Definiția 8.4.1.** Se spune că funcția  $f$  are în punctul  $a \in A$  un extrem relativ la mulțimea  $A$ , dacă restricția funcției  $f$  la mulțimea  $A$  are în punctul  $a \in A$  un extrem obișnuit.

**Definiția 8.4.2.** Extremele funcției  $f$  relative la o submulțime  $A \subset E$  se numesc extreme condiționate.

**Observația 8.4.1.** Vom considera un sistem de  $k < n$  funcții reale  $F_1(\bar{x}), F_2(\bar{x}), \dots, F_k(\bar{x})$  definite pe  $E$ , iar mulțimea  $A$  va fi definită ca mulțimea soluțiilor sistemului:

$$\begin{cases} F_1(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ F_2(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ F_k(x_1, x_2, \dots, x_n) = 0 \end{cases}$$

(1)

Așadar  $A = \{\bar{x} \mid \bar{x} \in E, F_1(\bar{x}) = 0, F_2(\bar{x}) = 0, \dots, F_k(\bar{x}) = 0\}$ , în acest caz extremele funcției  $f$  relative la mulțimea  $A$  se mai numesc extreme condiționate de sistemul (1).

Următoarea propoziție dă condiții necesare de existență a punctului de extrem condiționat.

**Propoziția 8.4.1.** Fie  $\bar{a}$  un punct care verifică sistemul (1). Să presupunem că funcția  $f$  și funcțiile  $F_1(\bar{x}), F_2(\bar{x}), \dots, F_k(\bar{x})$  au derivate parțiale

continue într-o vecinătate  $V$  a lui  $\bar{a}$  și că matricea funcțională  $\mathcal{M} = \left( \frac{\partial F_i}{\partial x_j} \right)$  are în

punctul  $\bar{a}$  rangul  $k$  (egal cu numărul relațiilor sistemului (1)). Dacă  $\bar{a}$  este punctul extrem al funcției  $f$ , condiționat de sistemul (1) atunci există  $k$  numere  $\lambda_i$  astfel încât să avem:

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x_1}(\bar{a}) + \lambda_1 \frac{\partial F_1}{\partial x_1}(\bar{a}) + \lambda_2 \frac{\partial F_2}{\partial x_1}(\bar{a}) + \dots + \lambda_k \frac{\partial F_k}{\partial x_1}(\bar{a}) = 0 \\ \frac{\partial f}{\partial x_2}(\bar{a}) + \lambda_1 \frac{\partial F_1}{\partial x_2}(\bar{a}) + \lambda_2 \frac{\partial F_2}{\partial x_2}(\bar{a}) + \dots + \lambda_k \frac{\partial F_k}{\partial x_2}(\bar{a}) = 0 \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n}(\bar{a}) + \lambda_1 \frac{\partial F_1}{\partial x_n}(\bar{a}) + \lambda_2 \frac{\partial F_2}{\partial x_n}(\bar{a}) + \dots + \lambda_k \frac{\partial F_k}{\partial x_n}(\bar{a}) = 0 \end{cases}$$

(2)

*Demonstrație:*

Deoarece matricea funcțională  $\mathcal{M} = \left( \frac{\partial F_i}{\partial x_j} \right)$  are în punctul  $a$  rangul  $k$ ; există un determinant de ordinul  $k$  al acestei matrici diferit de 0 în punctul  $a$ .

Pentru a face o alegere presupunem că:  $\frac{D(F_1, F_2, \dots, F_k)}{D(x_1, x_2, \dots, x_k)} \neq 0$  în punctul  $a$ .

Sistemul (1) se poate rezolva în raport cu variabilele  $x_1, x_2, \dots, x_k$  în jurul punctului  $\bar{a} = (a_1, a_2, \dots, a_k, a_{k+1}, \dots, a_n)$  deoarece:

- prin ipoteză  $F_1(\bar{a}) = 0, F_2(\bar{a}) = 0, \dots, F_n(\bar{a}) = 0$ ;
- funcțiile  $F_1(\bar{x}), F_2(\bar{x}), \dots, F_k(\bar{x})$  au derivate parțiale continue într-o vecinătate a lui  $\bar{a}$ ;
- iacobianul acestor funcții în raport cu variabilele  $x_1, x_2, \dots, x_k$  este diferit de zero.

Conform propoziției relative la sisteme de funcții implicite există  $V^k \subset A$  a punctului  $(a_1, a_2, \dots, a_k)$  în spațiul  $\mathbb{R}^k$  și o vecinătate  $V^{n-k}$  a punctului  $(a_{k+1}, a_{k+2}, \dots, a_n)$  în spațiul  $\mathbb{R}^{n-k}$  astfel încât pentru orice punct  $(x_{k+1}, x_{k+2}, \dots, x_n) \in V^{n-k}$  sistemul (1) să aibă o soluție unică  $x_1, x_2, \dots, x_k$  în  $V^k$ :

$$\begin{cases} x_1 = \varphi_1(x_{k+1}, \dots, x_n) \\ x_2 = \varphi_2(x_{k+1}, \dots, x_n) \\ \vdots \\ x_k = \varphi_k(x_{k+1}, \dots, x_n) \end{cases}$$

(3)

Avem  $a_1 = \varphi_1(a_{k+1}, \dots, a_n), \dots, a_k = \varphi_k(a_{k+1}, \dots, a_n)$ .

Funcțiile  $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k$  au derivate parțiale continue pe mulțimea  $V^{n-k}$ . Să scriem că sistemul (3) este o soluție a sistemului (1), pentru orice  $(x_{k+1}, x_{k+2}, \dots, x_n) \in V^{n-k}$ . Avem:

$$\begin{cases} F_1(\varphi_1(x_{k+1}, \dots, x_n), \dots, \varphi_k(x_{k+1}, \dots, x_n); x_{k+1}, \dots, x_n) = 0 \\ \vdots \\ F_k(\varphi_1(x_{k+1}, \dots, x_n), \dots, \varphi_k(x_{k+1}, \dots, x_n); x_{k+1}, \dots, x_n) = 0 \end{cases}$$

(4)

Diferențialele acestor funcții sunt nule pe  $V^{n-k}$  (în particular și în punctul  $(a_{k+1}, a_{k+2}, \dots, a_n)$ ).

$$\begin{cases} \frac{\partial F_1}{\partial x_1} d\varphi_1 + \frac{\partial F_1}{\partial x_2} d\varphi_2, \dots, \frac{\partial F_1}{\partial x_k} d\varphi_k + \frac{\partial F_1}{\partial x_{k+1}} dx_{k+1} + \dots + \frac{\partial F_1}{\partial x_n} dx_n = 0 \\ \frac{\partial F_2}{\partial x_1} d\varphi_1 + \frac{\partial F_2}{\partial x_2} d\varphi_2, \dots, \frac{\partial F_2}{\partial x_k} d\varphi_k + \frac{\partial F_2}{\partial x_{k+1}} dx_{k+1} + \dots + \frac{\partial F_2}{\partial x_n} dx_n = 0 \\ \vdots \\ \frac{\partial F_k}{\partial x_1} d\varphi_1 + \frac{\partial F_k}{\partial x_2} d\varphi_2, \dots, \frac{\partial F_k}{\partial x_k} d\varphi_k + \frac{\partial F_k}{\partial x_{k+1}} dx_{k+1} + \dots + \frac{\partial F_k}{\partial x_n} dx_n = 0 \end{cases}$$

(5)

În sistemul (5)  $d\varphi_1, d\varphi_2, \dots, d\varphi_k$  reprezintă diferențialele funcțiilor  $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k$  calculate în punctul  $(a_{k+1}, a_{k+2}, \dots, a_n)$ , iar  $dx_{k+1}, \dots, dx_n$  sunt variabile independente.

Să considerăm funcția compusă

$$\bar{F}(x_{k+1}, x_{k+2}, \dots, x_n) = f(\varphi_1(x_{k+1}, x_{k+2}, \dots, x_n), \dots, \varphi_k(x_{k+1}, x_{k+2}, \dots, x_n); (x_{k+1}, x_{k+2}, \dots, x_n))$$

(6)

definită pentru  $(x_{k+1}, x_{k+2}, \dots, x_n) \in V^{n-k}$ .

Deoarece funcția  $f(x_1, x_2, \dots, x_n)$  are în punctul  $\bar{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$  un extrem condiționat de sistemul (1), funcția  $F(x_{k+1}, x_{k+2}, \dots, x_n)$  are în punctul  $(a_{k+1}, a_{k+2}, \dots, a_n)$  un extrem obișnuit (lucru evident). În acest caz diferențiala acestei funcții în punctul  $(a_{k+1}, a_{k+2}, \dots, a_n)$  este nulă:

$$dF = \frac{\partial f}{\partial x_1} d\varphi_1 + \frac{\partial f}{\partial x_2} d\varphi_2 + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_k} d\varphi_k + \frac{\partial f}{\partial x_{k+1}} dx_{k+1} + \dots + \frac{\partial f}{\partial x_n} dx_n = 0$$

(7)

și aici  $d\varphi_1, d\varphi_2, \dots, d\varphi_k$  sunt diferențialele funcțiilor  $\varphi_1, \varphi_2, \dots, \varphi_k$  în punctul  $(a_{k+1}, a_{k+2}, \dots, a_n)$  iar  $dx_{k+1}, \dots, dx_n$  sunt variabile independente.

Ținând seama de (5) și (7) pentru orice sistem de numere  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$  avem:



$$\left(\frac{\partial f}{\partial x_1} + \sum_{i=1}^k \lambda_i \frac{\partial F_1}{\partial x_1}\right) d\varphi_1 + \left(\frac{\partial f}{\partial x_2} + \sum_{i=1}^k \lambda_i \frac{\partial F_1}{\partial x_2}\right) d\varphi_2 + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_k} + \sum_{i=1}^k \lambda_i \frac{\partial F_1}{\partial x_k}\right) d\varphi_k +$$

$$+ \left(\frac{\partial f}{\partial x_{k+1}} + \sum_{i=1}^k \lambda_i \frac{\partial F_1}{\partial x_{k+1}}\right) d\varphi_{k+1} + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n} + \sum_{i=1}^k \lambda_i \frac{\partial F_1}{\partial x_n}\right) d\varphi_n = 0$$

(8)

Vom alege un număr  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$  astfel încât coeficienții diferențialelor  $d\varphi_1, d\varphi_2, \dots, d\varphi_k$  să se anuleze.

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x_1} + \lambda_1 \frac{\partial F_1}{\partial x_1} + \dots + \lambda_k \frac{\partial F_1}{\partial x_1} = 0 \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_k} + \lambda_1 \frac{\partial F_1}{\partial x_k} + \dots + \lambda_k \frac{\partial F_1}{\partial x_k} = 0 \end{cases}$$

(\*)

derivatele fiind calculate în  $\bar{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$ . Acest lucru este posibil deoarece determinantul coeficienților lui  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$  din (\*) este  $\frac{D(F_1, F_2, \dots, F_k)}{D(x_1, x_2, \dots, x_k)} \neq 0$  calculat în  $(a_1, a_2, \dots, a_n)$ .

Cu aceste valori obținute pentru  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$  egalitatea (8) se scrie:

$$\left(\frac{\partial f}{\partial x_{k+1}} + \sum_{i=1}^k \lambda_i \frac{\partial F_1}{\partial x_{k+1}}\right) d\varphi_{k+1} + \dots + \left(\frac{\partial f}{\partial x_n} + \sum_{i=1}^k \lambda_i \frac{\partial F_1}{\partial x_n}\right) d\varphi_n = 0$$

Pentru ca această egalitate să aibă loc pentru orice valori ale variabilelor independente  $dx_{k+1}, \dots, dx_n$  este necesar și suficient să se anuleze coeficienții acestor variabile, adică:

$$\begin{cases} \frac{\partial f}{\partial x_{k+1}} + \lambda_1 \frac{\partial F_1}{\partial x_{k+1}} + \dots + \lambda_k \frac{\partial F_1}{\partial x_{k+1}} = 0 \\ \vdots \\ \frac{\partial f}{\partial x_n} + \lambda_1 \frac{\partial F_1}{\partial x_n} + \dots + \lambda_k \frac{\partial F_1}{\partial x_n} = 0 \end{cases} \quad (**)$$

Egalitățile (\*) și (\*\*) formează sistemul doi de egalități (q.e.d.).

**Observația 8.4.2.** Orice punct  $\bar{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$  care verifică sistemul (1) în care matricea  $\mathcal{M} = \left(\frac{\partial F_i}{\partial x_j}\right)$  are rangul  $k$  și care verifică sistemul (2) pentru anumite valori  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$  se numește punct staționar al funcției  $f$  condiționat de sistemul (1); coeficienții  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$  se numesc **multiplicatorii lui LAGRANGE**.

**Observația 8.4.3.** Se observă că în sistemul (2) apar derivatele parțiale ale funcției  $f(\bar{x}) + \lambda_1 F_1(\bar{x}) + \dots + \lambda_k F_k(\bar{x})$  definită pentru  $\bar{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n) \in R$ .

**Observația 8.4.4.** Din cele de mai sus rezultă că pentru o funcție  $f$  cu derivate parțiale continue pe o mulțime deschisă  $E \subset \mathbb{R}^n$  calea de urmat pentru aflarea punctelor staționare condiționate de sistemul (1) în care funcțiile  $F_1, F_2, \dots, F_k$  au derivate parțiale continue pe  $E$ , este:

1. se formează funcția ajutătoare:

$\Phi(x_1, x_2, \dots, x_n; \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k) = f(\bar{x}) + \lambda_1 F_1(\bar{x}) + \dots + \lambda_k F_k(\bar{x})$  cu coeficienții  $\lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$  nedeterminați;

2. se formează sistemul de  $n + k$  ecuații

$$\begin{cases} \frac{\partial \Phi}{\partial x_1}(x_1, x_2, \dots, x_n; \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k) = 0 \\ \frac{\partial \Phi}{\partial x_2}(x_1, x_2, \dots, x_n; \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k) = 0 \\ \vdots \\ \frac{\partial \Phi}{\partial x_n}(x_1, x_2, \dots, x_n; \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k) = 0 \\ F_1 = 0 \\ F_2 = 0 \\ \vdots \\ F_k = 0 \end{cases}$$

cu  $n + k$  necunoscute:  $x_1, x_2, \dots, x_n; \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$  și se caută soluții ale acestui sistem;

3. dacă  $x_1, x_2, \dots, x_n; \lambda_1, \lambda_2, \dots, \lambda_k$  este o soluție a acestui sistem atunci punctul  $x_1, x_2, \dots, x_n$  este punct staționar condiționat al funcției  $f$ .

Fie  $\bar{a} = (a_1, a_2, \dots, a_n)$  un punct staționar al funcției  $f$  condiționat de (1).

Pentru a vedea dacă  $\bar{a}$  este sau nu un punct de extrem condiționat va trebui să studiem semnul diferenței:

$$f(\bar{x}) - f(\bar{a}) = f(x_1, x_2, \dots, x_n) - f(a_1, a_2, \dots, a_n)$$

pentru punctele  $\bar{x} = (x_1, x_2, \dots, x_n)$  care verifică sistemul (1), deci pentru care  $F_1(\bar{x}) = 0, F_2(\bar{x}) = 0, \dots, F_k(\bar{x}) = 0$ .

Se observă că pentru asemenea puncte  $\bar{x}$  avem  $\Phi(\bar{x}) = f(\bar{x})$  și deci  $f(\bar{x}) - f(\bar{a}) = \Phi(\bar{x}) - \Phi(\bar{a})$ . Pe de altă parte, funcția  $\Phi(\bar{x})$  are derivate parțiale de ordinul doi continue într-o vecinătate a lui  $\bar{a}$ , deci putem scrie formula lui TAYLOR de ordinul doi:

$$\Phi(\bar{x}) - \Phi(\bar{a}) = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^n \frac{\partial^2 \Phi(\bar{a})}{\partial x_i \partial x_j} dx_i dx_j + \frac{1}{2} \omega(x) \rho^2$$

unde:

$$\lim_{x \rightarrow \bar{a}} \omega(\bar{a}) = 0$$

$$\rho = \sqrt{(x_1 - a_1)^2 + \dots + (x_n - a_n)^2}.$$

Dacă diferențiem relațiile sistemului (1) obținem  $k$  relații liniare în  $dx_1, \dots, dx_n$ :

$$\begin{cases} \frac{\partial F_1}{\partial x_1} dx_1 + \dots + \frac{\partial F_1}{\partial x_n} dx_n = 0 \\ \vdots \\ \frac{\partial F_k}{\partial x_1} dx_1 + \dots + \frac{\partial F_k}{\partial x_n} dx_n = 0 \end{cases}$$

Deoarece matricea acestui sistem linear este matricea funcțională  $\mathcal{M} = \left( \frac{\partial F_i}{\partial x_j} \right)$  care are rangul  $k$ , se pot exprima ca diferențiale în funcție de celelalte  $n - k$ ; introducând în formula lui TAYLOR de mai sus obținem în membrul drept o formă pătratică definită sau nu  $(\sum A_{ij} dx_i dx_j)$ .

În cazul când  $\sum A_{ij} dx_i dx_j$  este definită pozitiv avem minim condiționat, iar când este definită negativ avem un maxim condiționat.

### Exemple:

1) Să se găsească extremele funcției  $f(x, y, z) = xy + xz + yz$  condiționate de  $xyz = 1$  în domeniul  $x > 0; y > 0; z > 0$ .

Rezolvare:

$$\Phi(x, y, z) = f(x, y, z) + \lambda(xyz - 1)$$

$$\text{Din } \begin{cases} \frac{\partial \Phi}{\partial x} = 0 \\ \frac{\partial \Phi}{\partial y} = 0 \\ \frac{\partial \Phi}{\partial z} = 0 \\ F(x, y, z) = xyz - 1 = 0 \end{cases}$$

Rezultă  $x = 1, z = 1, y = 1, \lambda = -2, A(1,1,1)$ .

De aici rezultă:

$$\Phi(x, y, z) = xy + xz + yz - 2xyz + 2$$

$$d^2 \Phi|_A = -(dxdy + dydz + dxdz)$$

Diferențiind  $xzy = 1$  rezultă în  $A$   $dx + dy + dz = 0$  deci  $d^2\Phi|_A = dx^2 + dx dy + dy^2$  este definită pozitiv de unde rezultă  $A$  este minim condiționat.

2) Să se studieze extremele funcției  $f(x, y, z) = xy + yz + zx$  unde  $(x, y, z) \in R^3$  cu legăturile:  $-x + y + z = 1$  și  $x - z = 0$ .

Rezolvare:

Vom folosi metoda multiplicatorilor lui LAGRANGE; se consideră funcția atașată

$$F(x, y, z); \lambda, \mu = xy + yz + zx + \lambda(-x + y + z) + \mu(x - z)$$

Dacă există, extremele se găsesc printre punctele staționare, soluții ale sistemului:

$$\begin{cases} \frac{\partial F}{\partial x} = y + z - \lambda + \mu = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial y} = x + z + \lambda = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial z} = x + y + \lambda - \mu = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial \lambda} = -x + y + z - 1 = 0 \\ \frac{\partial F}{\partial \mu} = x - z = 0 \end{cases}$$

de unde  $x = -1, y = 1, z = -1, \lambda = 2, \mu = 2$ .

Avem  $d^2F|_A = 2(dx \cdot dy + dx \cdot dz + dy \cdot dz)$ . Diferențiind legăturile în punctul  $(-1, 1, 1)$  avem

$$\begin{cases} -dz + dy + dz = 0 \\ dx = dz \end{cases}$$

înlocuindu-le se obține  $d^2F|_A = 2dx^2 > 0$  rezultă  $(-1, 1, 1)$  punct de minim.

## 5. Schimbări de variabilă și funcții

Rezolvarea multor probleme se simplifică prin schimbarea variabilelor independente sau a funcțiilor care intervin în aceste probleme.

### A. Schimbarea variabilelor independente la funcțiile de o variabilă

**Propoziția 8.5.1.** Fie  $y = f(x)$ ,  $x \in X \subset \mathbb{R} \rightarrow y \in Y \subseteq \mathbb{R}$  și funcția  $x = \varphi(t)$ ;  $t \in T$ ;  $f, \varphi \in C^{(n)}$ ,  $n = 1, 2, \dots$ . Atunci  $\frac{dy}{dx} = \frac{1}{\varphi'(t)} \cdot \frac{dy}{dt}$ .

*Demonstrație:*

Funcția compusă  $y = f(\varphi(t))$ ,  $t \in T$ , realizează o aplicație a mulțimii  $T$  în mulțimea  $Y$ .

Aplicând regula de derivare a unei funcții compuse obținem:

$$\frac{dy}{dt} = \frac{df}{dx} \cdot \frac{d\varphi}{dt} \Rightarrow \frac{dy}{dt} = \frac{dy}{dx} \cdot \frac{d\varphi}{dt} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\varphi'(t)} \cdot \frac{dy}{dt}$$

relație care exprimă pe  $\frac{dy}{dx}$  prin derivata  $\frac{dy}{dt}$ .

**Observația 8.5.1.**

a) Deci operatorul este:

$$\frac{d\bullet}{dx} = \frac{1}{\varphi'(t)} \cdot \frac{d\bullet}{dt}$$

(1)

Ținând cont de regula (1) se obține:

$$\begin{aligned} \frac{d^2y}{dx^2} &= \frac{1}{\varphi'(t)} \cdot \frac{d}{dt} \left( \frac{1}{\varphi'(t)} \cdot \frac{dy}{dt} \right) = \frac{1}{\varphi'(t)} \left( -\frac{\varphi''}{\varphi'^2} \cdot \frac{dy}{dt} + \frac{1}{\varphi'} \cdot \frac{d^2y}{dt^2} \right) \Rightarrow \\ &\Rightarrow \frac{d^2\bullet}{dx^2} = \frac{1}{[\varphi'(t)]^2} \left[ -\frac{\varphi''(t)}{\varphi'(t)} \cdot \frac{d\bullet}{dt} + \frac{d^2\bullet}{dt^2} \right], \text{ etc.} \end{aligned}$$

**Exemplu:**

Fie ecuația  $(1-x^2) \cdot y'' + xy' = 0$ . Ce devine ecuația dacă se face schimbarea  $x = \cos t$ ?

Rezolvare:

Deci  $\varphi(t) = \cos t$

$$\frac{dy}{dx} = -\frac{1}{\sin t} \cdot \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{\varphi'(t)} \left( -\frac{\varphi''}{\varphi'^2} \cdot \frac{dy}{dt} + \frac{1}{\varphi'} \cdot \frac{d^2y}{dt^2} \right) = -\frac{1}{\sin t} \left( -\frac{\cos t}{\sin^2 t} \cdot \frac{dy}{dt} + \frac{1}{\sin t} \cdot \frac{d^2y}{dt^2} \right) =$$

$$= \frac{1}{\sin^2 t} \left( \frac{d^2y}{dt^2} + \operatorname{ctgt} \cdot \frac{dy}{dt} \right). \text{ Așadar, prin înlocuire în ecuația dată se obține:}$$

$$(1 - \cos^2 t) \cdot \frac{1}{\sin^2 t} \left( \frac{d^2y}{dt^2} + \operatorname{ctgt} \cdot \frac{dy}{dt} \right) + \cos t \cdot \frac{-1}{\sin t} \cdot \frac{dy}{dt} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{d^2y}{dt^2} - 2\operatorname{ctgt} \cdot \frac{dy}{dt} = 0$$

## B. Schimbarea variabilelor independente la funcțiile de două variabile

**Propoziția 8.5.2.** Fie funcția  $z = f(x, y) : X \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  și funcțiile  $x = \varphi(u, v)$ ;  $y = \psi(u, v)$ ;  $\varphi, \psi : V \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$  a.î.  $(x, y) \in X$ ;  $f, \varphi, \psi$  au derivate parțiale de ordinul doi continue pe domeniul de definiție. Atunci  $\frac{df}{dx} = \frac{1}{D} \left( \frac{\partial \psi}{\partial v} \cdot \frac{dz}{du} - \frac{\partial \varphi}{\partial u} \cdot \frac{dz}{dv} \right)$ , unde  $D = \frac{D(\varphi, \psi)}{D(u, v)}$ .

*Demonstrație:*

Din compunerea funcțiilor  $f, \varphi$  și  $\psi$  rezultă:  $z(u, v) = f(\varphi(u, v), \psi(u, v))$ .

Aplicând regula de derivare a funcțiilor compuse se obține:

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial u} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial \psi}{\partial u} \\ \frac{\partial z}{\partial v} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot \frac{\partial \varphi}{\partial v} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{\partial \psi}{\partial v} \end{cases}$$

Deci  $\frac{\partial f}{\partial x} = \frac{\partial \psi}{\partial v} \cdot \frac{1}{D} \cdot \frac{\partial z}{\partial u} - \frac{\partial \varphi}{\partial u} \cdot \frac{1}{D} \cdot \frac{\partial z}{\partial v} \Rightarrow$

$$\Rightarrow \frac{\partial f}{\partial x} = \frac{1}{D} \cdot \left( \frac{\partial \psi}{\partial v} \cdot \frac{\partial z}{\partial u} - \frac{\partial \varphi}{\partial u} \cdot \frac{\partial z}{\partial v} \right)$$

$$\frac{\partial f}{\partial y} = \frac{1}{D} \cdot \left( \frac{\partial \varphi}{\partial u} \cdot \frac{\partial z}{\partial v} - \frac{\partial \psi}{\partial v} \cdot \frac{\partial z}{\partial u} \right)$$

**Observația 8.5.2.** Pentru calculul derivatelor de ordinul 2 se folosesc operatorii:

$$\frac{\partial \bullet}{\partial x} = \frac{1}{D} \cdot \left( \frac{\partial \psi}{\partial v} \cdot \frac{\partial \bullet}{\partial u} - \frac{\partial \varphi}{\partial u} \cdot \frac{\partial \bullet}{\partial v} \right)$$

$$\frac{\partial \bullet}{\partial y} = \frac{1}{D} \cdot \left( \frac{\partial \varphi}{\partial u} \cdot \frac{\partial \bullet}{\partial v} - \frac{\partial \psi}{\partial v} \cdot \frac{\partial \bullet}{\partial u} \right)$$

aplicați unul altuia sau aplicați în mod repetat.

## C. Transformarea punctuală a curbelor plane

Problema se pune astfel:

Fie o transformare regulată

$$T: \begin{cases} u = f(x, y) \\ v = g(x, y) \end{cases} \quad f, g: A \subset \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}$$

și  $(C): y = y(x)$  o curbă plană. Dacă curbei plane  $(C)$  i se aplică transformarea  $(T)$  se obține  $T(C) = (\Gamma): v = v(u)$ . Pentru studiul curbei  $(\Gamma)$  trebuie exprimate derivatele  $\frac{dv}{du}, \frac{d^2v}{du^2}, \dots$  în funcție de derivatele  $\frac{dy}{dx}, \frac{d^2y}{dx^2}, \dots$

Problema este rezolvată de următoarea propoziție:

**Propoziția 8.5.3.** Dacă există derivatele  $\frac{d^n y}{dx^n}$  și  $\frac{d^n v}{du^n}$ ,  $n = 1, 2, \dots$  atunci

$$\frac{dv}{du} = \frac{\frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dx}}{\frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \frac{dy}{dx}}$$

*Demonstrație:*

Deoarece  $u = f(x, y)$  și  $v = g(x, y) \Rightarrow$

$$\begin{cases} du = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy \\ dv = \frac{\partial g}{\partial x} dx + \frac{\partial g}{\partial y} dy \end{cases} \Rightarrow \frac{dv}{du} = \frac{\frac{\partial g}{\partial x} dx + \frac{\partial g}{\partial y} dy}{\frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy} \Rightarrow \frac{dv}{du} = \frac{g'_x + g'_y \cdot \frac{dy}{dx}}{f'_x + f'_y \cdot \frac{dy}{dx}}$$

**Observația 8.5.3.** Din Propoziția 8.4.3 se obține operatorul  $\frac{d \cdot}{du} = \frac{1}{u'_x} \cdot \frac{d \cdot}{dx}$ .

Pentru calculul derivatelor de ordin superior ale lui  $v = v(u)$  se aplică în mod repetat acest operator.

$$\text{Deci } \frac{d^2v}{du^2} = \frac{1}{u'_x} \cdot \frac{d}{dx} \left( \frac{g'_x + g'_y \cdot \frac{dy}{dx}}{f'_x + f'_y \cdot \frac{dy}{dx}} \right), \dots$$

**Exemplu:**

Să se transforme ecuația diferențială  $y'' + x \cdot y' = 0$  unde  $y = y(x)$ .

Pentru schimbarea de variabilă:

$$\begin{cases} x = \rho \cdot \cos t \\ y = \rho \cdot \sin t \end{cases} \text{ în noua funcție } \rho = \rho(t).$$

Rezolvare:

$$\begin{cases} dy = (\rho' \sin t + \rho \cos t) dt \\ dx = (\rho' \cos t - \rho \sin t) dt \end{cases} \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{dx}{dy} = \frac{\rho' \sin t + \rho \cos t}{\rho' \cos t - \rho \sin t}$$

(1)

$$\text{Deci, } \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{x'_t} \cdot \frac{d}{dt} \left( \frac{dy}{dx} \right) \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{\rho'(\cos t - \rho \sin t)} \cdot \left( \frac{\rho' \sin t + \rho \cos t}{\rho' \cos t - \rho \sin t} \right)'_t \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{2\rho'^2 - \rho\rho'' + \rho^2}{(\rho' \cos t - \rho \sin t)^3}$$

(2)

Ținând cont de (1) și (2) ecuația diferențială devine:

$$\rho \cdot \rho'' - 2\rho'^2 - \rho \cos t (\rho' \sin t + \rho \cos t)^3 - \rho^2 = 0.$$

#### D. Transformarea punctuală a suprafețelor

Problema se pune în felul următor:

Fiind dată suprafața (S) se ecuație  $z = z(x, y)$  și transformarea punctuală regulată:

$$T: \begin{cases} u = f(x, y, z) \\ v = g(x, y, z) \\ w = h(x, y, z) \end{cases} \quad f, g, h: A \subset \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$$

Atunci dacă suprafeței (S) i se aplică transformarea T se obține suprafața  $\Sigma = T(S): w = w(u, v)$ .

Pentru a studia suprafața ( $\Sigma$ ) trebuie exprimate derivatele  $\frac{\partial w}{\partial u}, \frac{\partial w}{\partial v}, \frac{\partial^2 w}{\partial u^2}, \frac{\partial^2 w}{\partial v^2}, \frac{\partial^2 w}{\partial u \partial v}, \dots$  în raport cu derivatele  $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, \frac{\partial^2 z}{\partial x^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial y^2}, \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}, \dots$

Această problemă se rezolvă astfel:

**Propoziția 8.5.4.** În cazul în care există:  $\frac{\partial z}{\partial x}, \frac{\partial z}{\partial y}, \dots$  și  $\frac{\partial w}{\partial u}, \frac{\partial w}{\partial v}, \dots$  atunci

$$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\begin{vmatrix} h'_x & g'_x & z'_x \\ h'_y & g'_y & z'_y \\ h'_z & g'_z & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} f'_x & g'_x & h'_x \\ f'_y & g'_y & h'_y \\ f'_z & g'_z & -1 \end{vmatrix}}, \quad \frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\begin{vmatrix} f'_x & h'_x & z'_x \\ f'_y & h'_y & z'_y \\ f'_z & h'_z & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} f'_x & g'_x & h'_x \\ f'_y & g'_y & h'_y \\ f'_z & g'_z & -1 \end{vmatrix}},$$



**Demonstrație:**

$$dw = \frac{\partial w}{\partial u} du + \frac{\partial w}{\partial v} dv$$

(1)

$$\left\{ \begin{array}{l} du = \frac{\partial f}{\partial x} dx + \frac{\partial f}{\partial y} dy + \frac{\partial f}{\partial z} dz \\ du = \frac{\partial g}{\partial x} dx + \frac{\partial g}{\partial y} dy + \frac{\partial g}{\partial z} dz \end{array} \right. \quad (2)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} dw = \frac{\partial h}{\partial x} dx + \frac{\partial h}{\partial y} dy + \frac{\partial h}{\partial z} dz \end{array} \right. \quad (3)$$

$$\left\{ \begin{array}{l} dz = \frac{\partial z}{\partial x} dx + \frac{\partial z}{\partial y} dy \end{array} \right. \quad (4)$$

Înlocuind relațiile (4) în relațiile (2) și (3), iar după aceea relațiile (2) în relația (1) după care egalând cu (3) se obține:

$$\begin{aligned} & \left( \frac{\partial h}{\partial x} + \frac{\partial h}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} \right) dx + \left( \frac{\partial h}{\partial y} + \frac{\partial h}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} \right) dy = \\ & = \left[ \frac{\partial w}{\partial u} \left( \frac{\partial f}{\partial x} + \frac{\partial f}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} \right) + \frac{\partial w}{\partial v} \left( \frac{\partial g}{\partial x} + \frac{\partial g}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} \right) \right] dx + \\ & + \left[ \frac{\partial w}{\partial u} \left( \frac{\partial f}{\partial y} + \frac{\partial f}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} \right) + \frac{\partial w}{\partial v} \left( \frac{\partial g}{\partial y} + \frac{\partial g}{\partial z} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} \right) \right] dy . \end{aligned}$$

Prin identificare se obține sistemul liniar în  $\frac{\partial w}{\partial u}$ ,  $\frac{\partial w}{\partial v}$

$$\begin{cases} \frac{\partial w}{\partial u} (f'_x + f'_z \cdot z'_x) + \frac{\partial w}{\partial v} (g'_x + g'_z \cdot z'_x) = h'_x + h'_z \cdot z'_x \\ \frac{\partial w}{\partial u} (f'_y + f'_z \cdot z'_y) + \frac{\partial w}{\partial v} (g'_y + g'_z \cdot z'_y) = h'_y + h'_z \cdot z'_y \end{cases}$$

Prin rezolvarea acestui sistem se obține:

$$\frac{\partial w}{\partial u} = \frac{\begin{vmatrix} h'_x & g'_x & z'_x \\ h'_y & g'_y & z'_y \\ h'_z & g'_z & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} f'_x & g'_x & h'_x \\ f'_y & g'_y & h'_y \\ f'_z & g'_z & -1 \end{vmatrix}}, \quad \frac{\partial w}{\partial v} = \frac{\begin{vmatrix} f'_x & h'_x & z'_x \\ f'_y & h'_y & z'_y \\ f'_z & h'_z & -1 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} f'_x & g'_x & h'_x \\ f'_y & g'_y & h'_y \\ f'_z & g'_z & -1 \end{vmatrix}}$$

**Exemplu:**

Ce devine relația  $x \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + y \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = z$ ;  $z = z(x, y)$  dacă se face schimbarea

$$T := \begin{cases} u = x + z \\ v = y + z \\ w = x + y \end{cases}$$

în noua funcție  $w = w(u, v)$ .

Rezolvare:

Prin diferențiere se obține sistemul

$$\begin{cases} du = \left(1 + \frac{\partial z}{\partial x}\right) \cdot dx + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot dy \\ dv = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot dx + \left(1 + \frac{\partial z}{\partial y}\right) \cdot dy \\ dx + dy = \frac{\partial w}{\partial u} \cdot du + \frac{\partial w}{\partial v} \cdot dv \end{cases}$$

În acest sistem eliminând pe  $u$  și  $v$  se obține:

$$dx + dy = \left[ \frac{\partial w}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \left( \frac{\partial w}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial v} \right) \right] dx + \left[ \frac{\partial w}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \left( \frac{\partial w}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial v} \right) \right] dy \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1 - \frac{\partial w}{\partial u}}{\frac{\partial w}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial v}} \text{ și}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = \frac{1 - \frac{\partial w}{\partial v}}{\frac{\partial w}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial v}}$$

(1)

Din transformarea  $T$  se obține:

$$x = \frac{u + w - v}{2}; \quad y = \frac{v + w - u}{2}; \quad z = \frac{u + v - w}{2}$$

(2)

Ținând cont de relațiile (1) și (2) ecuația din enunț devine:

$$(u + w - v) \frac{\partial w}{\partial u} + (v + w - u) \frac{\partial w}{\partial v} = 3w - u - v.$$

## 6. Exerciții rezolvate

**Exercițiul 8.6.1.** Se dă ecuația  $y^2 + x^5 = 1$ . Să se cerceteze dacă această ecuație definește pe  $y$  ca funcție de  $x$ .

Rezolvare:


Se notează  $F(x,y) = y^2 + x^5 - 1$ . Ținând cont de faptul că  $y^2 = 1 - x^5$ , atunci evident  $1 - x \geq 0 \Rightarrow x \in (-\infty, 1]$ . În acest caz  $y \in (-\infty, 0]$  sau  $y \in [0, \infty)$ . Deci există două situații pentru ca  $F(x,y)$  să fie o funcție de două variabile și anume:

a)  $F : (-\infty, +1] \times [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$

b)  $F : (-\infty, 1] \times (-\infty, 0] \rightarrow \mathbb{R}$

Dacă se consideră  $F : (-\infty, 1] \times [0, \infty) \rightarrow \mathbb{R}$  ecuația  $F(x,y) = 0$  definește pe  $y$  ca funcție de  $x$ , dacă există  $(x_0, y_0) \in (-\infty, 1] \times [0, \infty)$  a.î.  $F(x_0, y_0) = 0$  și există  $\frac{\partial F(x,y)}{\partial y} \neq 0$  într-o vecinătate a lui  $(x_0, y_0)$ .

Dacă se consideră punctul  $(0,1)$  atunci este evident că  $F(0,1) = 0$  și  $\frac{\partial F}{\partial y} = 2y \neq 0, (\forall) (x,y) \in V_{(0,1)}$ .  $V_{(0,1)}$  este prezentat în figura alăturată:



**Exercițiul 8.6.2.** Se dă ecuația  $x^2 + 2y^2 + 3z^2 = 1$ . În ce condiții ecuația definește pe  $z$  ca funcție de  $x, y$ . Să se determine mulțimea de continuitate și diferențiability a funcției  $z(x,y)$ .

Rezolvare:

Ecuația se mai scrie și astfel:  $3z^2 = 1 - x^2 - 2y^2$ . Este evident că această egalitate are sens în cazul în care  $1 - x^2 - 2y^2 \geq 0 \Leftrightarrow x^2 + 2y^2 - 1 \leq 0$ .

Dacă se notează  $F(x,y,z) = x^2 + 2y^2 + 3z^2 - 1$ . În acest caz  $z \in [-1,0]$  sau  $z \in [0,1)$ .

Deci există situațiile:

a)  $F : D \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$

b)  $F : D \times [-1, 0] \rightarrow \mathbb{R}$  unde  $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + 2y^2 - 1 \leq 0\}$

Există  $(x_0, y_0, z_0) \in D \times [0, 1]$  a.î.  $F(x_0, y_0, z_0) = 0$ . Într-adevăr

$$F\left(\frac{1}{\sqrt{3}}, \frac{1}{\sqrt{6}}, \frac{1}{\sqrt{9}}\right) = 0.$$

Deci  $F : D \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$  și atunci ecuația  $F(x,y,z) = 0$  definește pe  $z$  funcție de  $(x, y)$ .

Dacă se consideră  $F : D \times [-1, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ , atunci fie  $D_1, D_2 \subset \mathbb{R}$  a.î.  $D_1 \cup D_2 = D$  și  $D_1 \cap D_2 = \emptyset$ .

În acest caz  $F(x, y, z) = 0$  implică

$$z(x, y) = \begin{cases} \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{1 - x^2 - 2y^2}; & (x, y) \in D_1 \\ -\frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{1 - x^2 - 2y^2}; & (x, y) \in D_2 \end{cases}.$$

Deci pe  $D$  ecuația  $F(x, y, z) = 0$  are o infinitate de soluții  $z(x, y)$ . Aceste soluții nu sunt funcții continue. Într-adevăr fie  $(a, b) \in \text{Fr}D_1$  (de exemplu).

$$\lim_{\substack{x \rightarrow a \\ y \rightarrow b \\ (x, y) \in D_1}} z(x, y) = \frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{1 - a^2 - 2b^2} \neq \lim_{\substack{x \rightarrow a \\ y \rightarrow b \\ (x, y) \in D_2}} z(x, y) = -\frac{1}{\sqrt{3}} \cdot \sqrt{1 - a^2 - 2b^2}$$

Dacă se consideră funcția  $F : D \times [0, 1] \rightarrow \mathbb{R}$ , atunci ecuația  $F(x, y, z) = 0$  definește pe  $z(x, y)$  și aceasta este continuă. Analog pentru cazul  $F : D \times [-1, 0] \rightarrow \mathbb{R}$ . Deci  $D = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + 2y^2 - 1 \leq 0\}$  este mulțimea de continuitate pentru funcția  $z(x, y)$  definită implicit de ecuația  $F(x, y, z) = 0$  atât în cazul a), cât și în cazul b).

Pentru ca  $z(x, y)$  să fie diferențiabilă, trebuie ca  $F(x, y, z)$  să admită derivate parțiale continue și  $F'_z(x, y, z) \neq 0$ . Aceste condiții implică faptul că domeniul de diferențiabilitate a lui  $z(x, y)$  este  $D' = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 \mid x^2 + 2y^2 - 1 < 0\}$  atât în cazul a), cât și în cazul b).

**Exercițiul 8.6.3.** Să se calculeze  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$  pentru funcția  $z(x, y)$  definită implicit de ecuația  $\ln(x^2 + y^2 + z^2) + ax + by + cz = 1$ .

Rezolvare:

Se notează  $F(x, y, z) = \ln(x^2 + y^2 + z^2) + ax + by + cz - 1$

$F : \mathbb{R}_+^3 - \{(0, 0, 0)\} \rightarrow \mathbb{R}$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial y} \left( \frac{\partial z}{\partial x} \right)$$

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{\frac{\partial F}{\partial x}}{\frac{\partial F}{\partial z}} = \frac{\frac{2x}{x^2 + y^2 + z^2} + a}{\frac{2z}{x^2 + y^2 + z^2} + c} = -\frac{2x + a(x^2 + y^2 + z^2)}{2z + c(x^2 + y^2 + z^2)}$$

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{2y + b(x^2 + y^2 + z^2)}{2z + c(x^2 + y^2 + z^2)}$$

Se derivează egalitatea  $F(x, y, z) = 0$  în raport cu  $x$  și apoi în raport cu  $y$ , ținând cont că  $z$  este funcție de  $x$  și  $y$  și se obține:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{1}{(x^2 + y^2 + z^2)[2z + c(x^2 + y^2 + z^2)]} \left[ \left( 2x + 2z \cdot \frac{\partial z}{\partial x} \right) \cdot \left( 2x + 2z \cdot \frac{\partial z}{\partial y} \right) - 2 \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} \right]$$

**Exercițiul 8.6.4.** Să se arate că funcția  $z(x,y)$  definită de  $F(x - mz, y - nz) = 0$ ,  $m, n \in \mathbb{R}$  verifică relația  $m \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + n \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = 1$ .

Rezolvare:

Fie  $u = x - mz$  și  $v = y - nz$ . Derivând egalitatea  $F(x - mz, y - nz) = 0$  în raport cu  $x$  se obține:

$$\frac{\partial F}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial F}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = 0 \Rightarrow \frac{\partial F}{\partial u} \left( 1 - m \cdot \frac{\partial z}{\partial x} \right) + \frac{\partial F}{\partial v} \left( 1 - n \cdot \frac{\partial z}{\partial x} \right) = 0 \Rightarrow \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\frac{\partial F}{\partial u}}{m \frac{\partial F}{\partial u} + n \frac{\partial F}{\partial v}}$$

(1)

$$\text{Analog } \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\frac{\partial F}{\partial v}}{m \cdot \frac{\partial F}{\partial u} + n \cdot \frac{\partial F}{\partial v}}$$

(2)

Ținând cont de egalitățile (1) și (2) se obține:

$$m \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + n \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{m \cdot \frac{\partial F}{\partial u}}{m \cdot \frac{\partial F}{\partial u} + n \cdot \frac{\partial F}{\partial v}} + \frac{n \cdot \frac{\partial F}{\partial v}}{m \cdot \frac{\partial F}{\partial u} + n \cdot \frac{\partial F}{\partial v}} = \frac{m \cdot \frac{\partial F}{\partial u} + n \cdot \frac{\partial F}{\partial v}}{m \cdot \frac{\partial F}{\partial u} + n \cdot \frac{\partial F}{\partial v}} = 1.$$

**Exercițiul 8.6.5.** Să se afle punctele de extrem ale funcției  $z = z(x,y)$  definită implicit de ecuația:  $x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 7 = 0$ .

Rezolvare:

Se notează  $F(x,y,z) = x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 7$ . Punctele staționare sunt

$$\text{soluțiile sistemului } \begin{cases} F'_x(x,y,z) = 0 \\ F'_y(x,y,z) = 0 \\ F'_z(x,y,z) = 0 \end{cases} \text{ care verifică condiția } F'_z(x,y,z) \neq 0.$$

$$\text{Deci } \begin{cases} 2x - 2 = 0 \\ 2y - 2 = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 - 2x - 2y - 7 = 0 \end{cases}$$

Se obțin soluțiile (1,1,3) și (1,1,-3).

Cum  $F'_z(x,y,z) = 2z$  se observă că  $F'_z(1,1,3) = 6 \neq 0$  și  $F'_z(1,1,-3) = -6 \neq 0$ .

Deci atât (1,1,3) cât și (1,1,-3) sunt puncte staționare.

$$\frac{\partial z}{\partial x} = -\frac{F'_x(x,y,z)}{F'_z(x,y,z)} = \frac{1-x}{z}$$

(1)

$$\frac{\partial z}{\partial y} = -\frac{F'_y(x,y,z)}{F'_z(x,y,z)} = \frac{1-y}{z}$$

(2)

Se derivează (1) în raport cu  $x$  și se obține:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{-z - (1-x) \frac{\partial z}{\partial x}}{z^2} = \frac{-z - (1-x) \frac{1-x}{z}}{z^2} = -\frac{z^2 + (1-x)^2}{z^3} \quad (3)$$

Se derivează (2) în raport cu  $y$  și se obține:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = -\frac{z^2 + (1-y)^2}{z^3}$$

(4)

Se derivează (1) în raport cu  $y$  și se obține:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{-(1-x) \cdot \frac{\partial z}{\partial y}}{z^2} = -\frac{(1-x)(1-y)}{z^3}$$

Se cercetează dacă  $(1,1,3)$  este punct de extrem.

$$a_{11} = -\frac{9}{27} = -\frac{1}{3}; \quad a_{22} = -\frac{1}{3}; \quad a_{12} = a_{21} = 0$$

$$a_{11} = -\frac{1}{3} < 0, \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{vmatrix} = \frac{1}{9} > 0$$

Deci  $(1,1,3)$  este punct de maxim pentru funcția definită implicit.

Se cercetează dacă  $(1,1,-3)$  este punct de extrem.

$$a_{11} = \frac{9}{27} = \frac{1}{3} > 0; \quad a_{22} = \frac{1}{3}; \quad a_{12} = a_{21} = 0$$

$$a_{11} = \frac{1}{3} > 0, \quad \begin{vmatrix} a_{11} & a_{12} \\ a_{21} & a_{22} \end{vmatrix} = \begin{vmatrix} \frac{1}{3} & 0 \\ 0 & \frac{1}{3} \end{vmatrix} = \frac{1}{9} > 0$$

Deci  $(1,1,-3)$  este punct de minim pentru funcția definită implicit.

**Exercițiul 8.6.6.** Funcția  $z = f(x,y)$  este definită implicit de sistemul de

$$\text{ecuații: } \begin{cases} x = u \cdot \cos v \\ y = u \cdot \sin v \\ z = v \end{cases}$$

Să se calculeze derivata funcției  $f$  după direcția  $\vec{S} = \vec{i} + 2\vec{j}$  în punctul  $\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\pi}{4}, 1, \frac{\pi}{4}\right)$ .

Rezolvare:

Se notează  $F_1(x, y, z, u, v) = x - u \cdot \cos v$ ;  $F_2(x, y, z, u, v) = y - u \cdot \sin v$ ;  
 $F_3(x, y, z, u, v) = z - v$ .

Se observă că funcțiile  $F_1, F_2, F_3$  sunt continue și derivabile în  $\mathbb{R}^5$ .

$$\frac{D(F_1, F_2, F_3)}{D(z, u, v)} = \begin{vmatrix} 0 & -\cos v & u \sin v \\ 0 & -\sin v & -u \cos v \\ 1 & 0 & -1 \end{vmatrix} = u$$

Se observă că  $\frac{D(F_1, F_2, F_3)}{D(u, v, w)} \Big|_{\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\pi}{4}, 1, \frac{\pi}{4}\right)} = 1 \neq 0$ .

Conform cu teorema de existență a sistemelor de funcții implicite, din cele arătate anterior rezultă că sistemul  $\begin{cases} F_1(x, y, z, u, v) = 0 \\ F_2(x, y, z, u, v) = 0 \\ F_3(x, y, z, u, v) = 0 \end{cases}$  definește implicit funcțiile

$z = f(x, y)$ ,  $u = g(x, y)$ ,  $v = h(x, y)$ .

Conform aceleiași teoreme  $\frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{D(F_1, F_2, F_3)}{D(x, z, u, v)} \cdot \frac{D(F_1, F_2, F_3)}{D(z, u, v)}$ ;  $\frac{\partial f}{\partial y} = -\frac{D(F_1, F_2, F_3)}{D(y, z, u, v)} \cdot \frac{D(F_1, F_2, F_3)}{D(z, u, v)}$

$$\frac{\partial f}{\partial x} = -\frac{-1}{u} \cdot \sin v; \quad \frac{\partial f}{\partial y} = \frac{\cos v}{u}.$$

$$\text{Așadar } \frac{\partial f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)}{\partial x} = -\frac{\sqrt{2}}{2}; \quad \frac{\partial f\left(\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)}{\partial y} = \frac{\sqrt{2}}{2}.$$

Dacă  $\vec{S} = a \cdot \vec{i} + b \cdot \vec{j}$  atunci  $\frac{\partial f}{\partial \vec{S}} = \left(\frac{\partial f}{\partial x} \cdot \vec{i} + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot \vec{j}\right) \cdot \vec{S} \Rightarrow \frac{\partial f}{\partial \vec{S}} = \frac{\partial f}{\partial x} \cdot a + \frac{\partial f}{\partial y} \cdot b$

Dacă  $\vec{S} = \vec{i} + 2\vec{j}$  atunci  $\frac{\partial f}{\partial \vec{S}} = -\frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{\sqrt{2}}{2} \cdot 2 = \sqrt{2} - \frac{\sqrt{2}}{2} = \frac{\sqrt{2}}{2}$ .

**Exercițiul 8.6.7.** Sistemul  $\begin{cases} x + y + u^2 + v^2 = 1 \\ x \cdot y + u^3 + v^3 = 2 \end{cases}$  definește pe  $u$  și  $v$  ca funcții

de  $x$  și  $y$ . Să se determine  $du(x, y)$  și  $dv(x, y)$ .

Rezolvare:

Se știe că  $du = \frac{\partial u}{\partial x} dx + \frac{\partial u}{\partial y} dy$  și  $dv = \frac{\partial v}{\partial x} dx + \frac{\partial v}{\partial y} dy$ . Pentru determinarea lui  $\frac{\partial u}{\partial x}, \frac{\partial u}{\partial y}, \frac{\partial v}{\partial x}, \frac{\partial v}{\partial y}$  se folosește o altă modalitate față de cea din exercițiul anterior și anume, se derivează sistemul în raport cu  $x$ , respectiv în raport cu  $y$ , ținând cont că  $x$  și  $y$  sunt variabile independente, iar  $u$  și  $v$  sunt funcții de  $x$  și  $y$ ,

$$\begin{cases} 2u \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + 2v \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = -1 \\ 3u^2 \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + 3v^2 \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = -y \end{cases}$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{\begin{vmatrix} -1 & 2v \\ -y & 3v^2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2u & 2v \\ 3u^2 & 3v^2 \end{vmatrix}} = \frac{2yv - 3v^2}{6uv^2 - 6u^2v} = \frac{2y - 3v}{6u(v - u)}$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\begin{vmatrix} 2u & -1 \\ 3u^2 & -y \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2u & 2v \\ 3u^2 & 3v^2 \end{vmatrix}} = \frac{3u^2 - 2yu}{6uv^2 - 6u^2v} = \frac{3u - 2y}{6v(v - u)}$$

Analog se determină  $\frac{\partial u}{\partial y}$  și  $\frac{\partial v}{\partial y}$  rezolvând sistemul

$$\begin{cases} 2u \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + 2v \cdot \frac{\partial v}{\partial y} = -1 \\ 3u^2 \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + 3v^2 \cdot \frac{\partial v}{\partial y} = -x \end{cases} \text{ și se obține:}$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\begin{vmatrix} -1 & 2v \\ -x & 3v^2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2u & 2v \\ 3u^2 & 3v^2 \end{vmatrix}} = \frac{2vx - 3v}{6uv^2 - 6u^2v} = \frac{2x - 3}{6u(v - u)}$$

$$\frac{\partial v}{\partial y} = \frac{\begin{vmatrix} 2u & -1 \\ 3u^2 & x \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} 2u & 2v \\ 3u^2 & 3v^2 \end{vmatrix}} = \frac{3u^2 + 2ux}{6uv^2 - 6u^2v} = \frac{3u + 2x}{6v(v - u)}$$

Așadar,

$$du = \frac{2y - 3v}{6u(v - u)} dx + \frac{2x - 3}{6u(v - u)} dy \Rightarrow du = \frac{1}{6u(v - u)} [(2y - v)dx + (2x - 3)dy]$$

$$dv = \frac{1}{6v(v - u)} [(3u - 2y)dx + (3u + 2x)dy]$$



**Exercițiul 8.6.8.** Fie  $u_1 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R}$   $u_1(x_1, x_2, x_3) = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2$ ;

$$u_2 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} \quad u_2(x_1, x_2, x_3) = x_1 + x_2 + x_3;$$

$$u_3 : \mathbb{R}^3 \rightarrow \mathbb{R} \quad u_3(x_1, x_2, x_3) = x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3.$$

Să se arate că  $u_1, u_2, u_3$  sunt în dependență funcțională.

Rezolvare:

Este evident  $(x_1 + x_2 + x_3)^2 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + 2(x_1x_2 + x_1x_3 + x_2x_3)$ . Deci  $u_2^2 = u_1 + 2u_3 \Rightarrow u_1 = u_2^2 - 2u_3$ . Se consideră  $\phi(u_2, u_3) = u_2^2 - 2u_3$ . Deci  $u_1 = \phi(u_2, u_3)$ , ceea ce arată că  $u_1$  depinde funcțional de  $u_2$  și  $u_3$ .

**Exercițiul 8.6.9.** Fie  $f, g, h$  bijecții și  $u, v, w : \mathbb{R}_+^3 \rightarrow \mathbb{R}$   $u = f\left(\frac{y}{z}\right)$ ,  $v = g\left(\frac{z}{x}\right)$ ,

$w = h\left(\frac{x}{y}\right)$ . Să se arate că  $u, v, w$  sunt dependente funcțional și să se găsească relația dintre ele.

Rezolvare:

Se știe că  $u, v, w$  sunt dependente funcțional dacă și numai dacă

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial u}{\partial z} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} & \frac{\partial v}{\partial z} \\ \frac{\partial w}{\partial x} & \frac{\partial w}{\partial y} & \frac{\partial w}{\partial z} \end{vmatrix} = 0$$

$$\frac{\partial u}{\partial x} = 0; \quad \frac{\partial u}{\partial y} = \frac{1}{z} \cdot f', \quad \frac{\partial u}{\partial z} = -\frac{y}{z^2} \cdot f'$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{z}{x^2} \cdot g'; \quad \frac{\partial v}{\partial y} = 0, \quad \frac{\partial v}{\partial z} = \frac{1}{x} \cdot g'$$

$$\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{1}{y} \cdot h'; \quad \frac{\partial w}{\partial y} = -\frac{x}{y^2} \cdot h'; \quad \frac{\partial w}{\partial z} = 0$$

Așadar

$$\begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial u}{\partial z} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} & \frac{\partial v}{\partial z} \\ \frac{\partial w}{\partial x} & \frac{\partial w}{\partial y} & \frac{\partial w}{\partial z} \end{vmatrix} = f' \cdot g' \cdot h' \cdot \begin{vmatrix} 0 & \frac{1}{z} & -\frac{y}{z^2} \\ -\frac{z}{x^2} & 0 & \frac{1}{x} \\ \frac{1}{y} & -\frac{x}{y^2} & 0 \end{vmatrix} = \frac{f' \cdot g' \cdot h'}{x \cdot y \cdot z} \cdot \begin{vmatrix} 0 & 1 & -\frac{y}{z} \\ -\frac{z}{x} & 0 & 1 \\ 1 & -\frac{x}{y} & 0 \end{vmatrix} =$$

$$= \frac{f' \cdot g' \cdot h'}{x \cdot y \cdot z} \cdot \left( -\begin{vmatrix} -\frac{z}{x} & 1 \\ 1 & 0 \end{vmatrix} - \frac{y}{z} \cdot \begin{vmatrix} -\frac{z}{x} & 0 \\ 1 & -\frac{x}{y} \end{vmatrix} \right) = \frac{f' \cdot g' \cdot h'}{x \cdot y \cdot z} \cdot (1-1) = 0.$$

Așadar  $u, v, w$  sunt în dependență funcțională. Cum  $f, g, h$  sunt bijecții,

$$\text{atunci există } f^{-1}, g^{-1}, h^{-1} \text{ și } \begin{cases} \frac{y}{z} = f^{-1}(u) \\ -\frac{z}{x} = g^{-1}(v) \\ \frac{x}{y} = h^{-1}(w) \end{cases}$$

Rezultă că  $f^{-1}(u) \cdot g^{-1}(v) \cdot h^{-1}(w) = 1$  sau  $u = f\left(\frac{1}{g^{-1}(v) \cdot h^{-1}(w)}\right)$  care reprezintă relația între funcțiile  $u, v, w$ .

**Exercițiul 8.6.10.** Fie  $f, g, h$  bijecții și  $u, v, w : A \rightarrow \mathbb{R}$  unde  $u = f\left(\frac{x^2}{(x-y)(x-z)}\right)$ ,  $v = g\left(\frac{y^2}{(y-x)(y-z)}\right)$ ,  $w = h\left(\frac{z^2}{(z-x)(z-y)}\right)$ . Să se arate că  $u, v, w$  sunt în dependență funcțională și să se găsească relația dintre ele.

Rezolvare:

Pentru a arăta ca  $u, v, w$  sunt în dependență funcțională trebuie arătat că:

$$\Delta = \begin{vmatrix} \frac{\partial u}{\partial x} & \frac{\partial u}{\partial y} & \frac{\partial u}{\partial z} \\ \frac{\partial v}{\partial x} & \frac{\partial v}{\partial y} & \frac{\partial v}{\partial z} \\ \frac{\partial w}{\partial x} & \frac{\partial w}{\partial y} & \frac{\partial w}{\partial z} \end{vmatrix} = 0$$

Dar

$$\frac{\partial u}{\partial x} = \frac{2x(x-y)(x-z) - x^2(x-z) - x^2(x-y)}{(x-y)^2(x-z)^2} \cdot f' = \frac{2yz - x(y+z)}{(x-y)^2(x-z)^2} \cdot f'$$

$$\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{x^2(x-z)}{(x-y)^2(x-z)} \cdot f' = \frac{x^2}{(x-y)^2(x-z)} \cdot f'; \quad \frac{\partial u}{\partial z} = \frac{x^2}{(x-y)(x-z)^2} \cdot f'$$

$$\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{y^2}{(y-z)(y-x)^2} \cdot g'; \quad \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{2xz - y(x+z)}{(y-z)^2(y-x)^2} \cdot g'; \quad \frac{\partial v}{\partial z} = \frac{y^2}{(y-z)^2(y-x)} \cdot g'$$

$$\frac{\partial w}{\partial x} = \frac{z^2}{(z-x)^2(z-y)} \cdot h'; \quad \frac{\partial w}{\partial y} = \frac{z^2}{(z-x)(z-y)^2} \cdot h'; \quad \frac{\partial w}{\partial z} = \frac{2xy - z(x+y)}{(z-x)^2(z-y)^2} \cdot h'$$

Atunci

$$\Delta = \frac{f' \cdot g' \cdot h'}{(x-y)^2(x-z)^2(y-z)^2} \cdot \begin{vmatrix} \frac{2yz-x(y+z)}{(x-y)(x-z)} & \frac{x^2}{x-y} & \frac{x^2}{x-z} \\ \frac{y^2}{y-x} & \frac{2xz-y(x+z)}{(y-z)(y-x)} & \frac{y^2}{y-z} \\ \frac{z^2}{z-x} & \frac{z^2}{z-y} & \frac{2xy-z(x+y)}{(z-x)(z-y)} \end{vmatrix} = 0$$

Deci  $u, v, w$  sunt în dependență funcțională pe  $A$  ( $A$  fiind  $\mathbb{R}^3$  mai puțin planele bisectoare). Deoarece  $f, g, h$  sunt bijecții, există  $f^{-1}, g^{-1}, h^{-1}: \mathbb{R} \rightarrow A$  a.î.

$$f^{-1}(u) = \frac{x^2}{(x-y)(x-z)}; \quad g^{-1}(v) = \frac{y^2}{(y-x)(y-z)}; \quad h^{-1}(w) = \frac{z^2}{(z-x)(z-y)}.$$

$$\text{Dar } \frac{x^2}{(x-y)(x-z)} + \frac{y^2}{(y-x)(y-z)} + \frac{z^2}{(z-x)(z-y)} = 1.$$

$$\text{Atunci } f^{-1}(u) + g^{-1}(v) + h^{-1}(w) = 1.$$

**Observație:**

Deoarece pentru a arăta că  $\Delta = 0$  sunt necesare calcule foarte lungi, se poate arăta dependența funcțională, arătând direct relația dintre  $u, v, w$ .

**Exercițiul 8.9.11.** Să se arate că funcțiile  $u = \sum_{k=1}^n x_k$ ,  $v = \sum_{k=1}^n x_k^2$  și  $w = x_1x_2 + x_1x_3 + \dots + x_1x_n + x_2x_3 + \dots + x_{n-1}x_n$  sunt în dependență funcțională pe  $\mathbb{R}^n$ .

Rezolvare:

Pentru ca funcțiile  $u, v, w$  să fie în dependență funcțională pe  $\mathbb{R}^n$  trebuie

ca matricea Jacobiană  $J = \begin{pmatrix} \frac{\partial u}{\partial x_1} & \frac{\partial u}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial u}{\partial x_n} \\ \frac{\partial v}{\partial x_1} & \frac{\partial v}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial v}{\partial x_n} \\ \frac{\partial w}{\partial x_1} & \frac{\partial w}{\partial x_2} & \dots & \frac{\partial w}{\partial x_n} \end{pmatrix}$  să nu aibă rangul trei. În acest

caz matricea Jacobiană este  $J = \begin{pmatrix} 1 & 1 & \dots & 1 \\ 2x_1 & 2x_2 & \dots & 2x_n \\ S_1 & S_2 & \dots & S_n \end{pmatrix}$  unde  $S_j = \sum_{k=1}^n x_k - j$

$$j = \overline{1, n}.$$

Într-adevăr rang  $J < 3$ , deoarece toți minorii de ordin 3 sunt nuli.

Fie

$$\Delta_{ijk} = \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 2x_i & 2x_j & 2x_k \\ S_i & S_j & S_k \end{vmatrix} = 2 \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ \sum_{l=1}^n x_l & \sum_{l=1}^n x_l & \sum_{l=1}^n x_l \\ S_i & S_j & S_k \end{vmatrix} = 2 \sum_{l=1}^n x_l \begin{vmatrix} 1 & 1 & 1 \\ 1 & 1 & 1 \\ S_i & S_j & S_k \end{vmatrix} = 0 \Rightarrow$$

$$\Rightarrow \Delta_{ijk} = 0.$$

Cum  $\Delta_{ijk}$  este un determinant de ordin 3 oarecare al matricii J, rezultă că rang  $J < 3$ . Deci  $u, v, w$  sunt în dependență funcțională pe  $\mathbb{R}^3$ .

**Observație:**

Dependența funcțională a lui  $u, v, w$  se observă și direct, deoarece  $v = u^2 - 2w$ .

**Exercițiul 8.6.12.** Se consideră ecuația diferențială  $(x+1)^2 y'' + 2(x+1)y' + 4y = \ln|x+1|$ . Care este forma ecuației dacă se utilizează substituția  $|x+1| = e^t$   $t \in \mathbb{R}$ ?

Rezolvare:

Se consideră  $x+1 > 0$ . Deci substituția devine  $x+1 = e^t$ . Deci  $x = e^t - 1 = \varphi(t)$ .

$$\text{Se știe că } \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\varphi'(t)} \cdot \frac{dy}{dt}, \quad \frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{\varphi'(t)} \cdot \frac{d}{dt} \left( \frac{1}{\varphi'(t)} \cdot \frac{dy}{dt} \right). \text{ Deci } \frac{dy}{dx} = e^{-t} \cdot \frac{dy}{dt},$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = e^{-2t} \left( -\frac{dy}{dt} + \frac{d^2y}{dt^2} \right).$$

Ținând cont de acestea ecuația devine  $\frac{d^2y}{dt^2} + \frac{dy}{dt} + 4y = t$ .

Dacă se consideră  $x+1 < 0$  atunci  $x+1 = -e^t$  și se obține același rezultat.

**Exercițiul 8.6.13.** Ce devine ecuația  $y'' \cdot \sin x + y' \cdot (\cos x + 1) = 0$  dacă se folosește schimbarea de variabilă  $t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$ .

Rezolvare:

Se observă că  $x = 2 \operatorname{arctg} t$ ,  $dx = \frac{2dt}{1+t^2}$

$$\frac{dx}{dt} = \frac{2}{1+t^2} \Rightarrow \frac{dt}{dx} = \frac{1+t^2}{2}$$

$$\text{Cum } \frac{dy}{dx} = \frac{dy}{dt} \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{1}{2}(t^2+1) \cdot \frac{dy}{dt}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{1}{2}(t^2+1) \cdot \frac{d}{dt} \left[ \frac{1}{2}(t^2+1) \cdot \frac{dy}{dt} \right] = \frac{1}{2}(t^2+1) \left[ t \cdot \frac{dy}{dt} + \frac{1}{2}(t^2+1) \cdot \frac{d^2y}{dt^2} \right] =$$

$$= \frac{t(t^2 + 1)}{2} \cdot \frac{dy}{dt} + \frac{(t^2 + 1)^2}{4} \cdot \frac{d^2y}{dt^2}.$$

De asemenea, se știe că  $\sin x = \frac{2t}{1+t^2}$  și  $\cos x = \frac{1-t^2}{1+t^2}$ .

Ținând cont de toate acestea se obține:  $t \cdot \frac{d^2y}{dt^2} + 2 \cdot \frac{dy}{dt} = 0$ .

**Exercițiul 8.6.14.** Ce devine ecuația  $y'' + xy' = e^y$  dacă se consideră  $x$  funcție de  $y$ .

Rezolvare:

$$y' = \frac{dy}{dx} = \frac{1}{\frac{dx}{dy}} = \frac{1}{x'}$$

$$y'' = \frac{1}{x'} \cdot \frac{d}{dy} \left( \frac{dy}{dx} \right) = \frac{1}{x'} \cdot \left( \frac{1}{x'} \right)' = \frac{1}{x'} \cdot \frac{-x''}{(x')^2} = -\frac{x''}{(x')^3}$$

$$-\frac{x''}{(x')^3} + \frac{x}{x'} = e^y \Rightarrow -x'' + x \cdot (x')^2 = e^y$$

**Exercițiul 8.6.15.** Ce devine ecuația  $y'' + (x+y)(1+y')^3 = 0$  dacă se face schimbarea de variabilă și funcție  $x = u + t$ ;  $y = u - t$  unde  $u = u(t)$ .

Rezolvare:

$$dx = du + dt; \quad dy = du - dt$$

$$\text{Deci } \frac{dy}{dx} = \frac{du - dt}{du + dt} = \frac{\frac{du}{dt} - 1}{\frac{du}{dt} + 1}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left( \frac{\frac{du}{dt} - 1}{\frac{du}{dt} + 1} \right) = \frac{d}{dt} \left( \frac{\frac{du}{dt} - 1}{\frac{du}{dt} + 1} \right) \cdot \frac{dt}{dx} = \frac{1}{\frac{du}{dt} + 1} \cdot \frac{2 \cdot \frac{d^2u}{dt^2}}{\left( \frac{du}{dt} + 1 \right)^2} = \frac{2 \cdot \frac{d^2u}{dt^2}}{\left( \frac{du}{dt} + 1 \right)^3}$$

Ținând cont de aceste egalități, ecuația devine  $u'' + 8u \cdot (u')^3 = 0$ .

**Exercițiul 8.6.16.** Să se transforme ecuația:  $y'' + \frac{2}{x} \cdot y' + y = 0$  luând pe  $x$  ca funcție și pe  $t = x \cdot y$  ca variabilă independentă.

Rezolvare:

$$dt = y \cdot dx + x \cdot dy.$$

Atunci

$$\frac{dx}{dt} = \frac{dx}{ydx + xdy} \Rightarrow \frac{dx}{dt} = \frac{1}{y + x \cdot \frac{dy}{dx}} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{1 - y \cdot \frac{dx}{dt}}{x \cdot \frac{dx}{dt}} \Rightarrow \frac{dy}{dx} = \frac{x - t \cdot \frac{dx}{dt}}{x^2 \cdot \frac{dx}{dt}}$$

$$\frac{d^2y}{dx^2} = \frac{d}{dx} \left( \frac{dy}{dx} \right) = \frac{d}{dt} \left( \frac{x - t \cdot \frac{dx}{dt}}{x^2 \cdot \frac{dx}{dt}} \right) \cdot \frac{dx}{dt} = \frac{-2x \cdot \left( \frac{dx}{dt} \right)^2 - x^2 \cdot \frac{d^2x}{dt^2} + 2t \cdot \left( \frac{dx}{dt} \right)^3}{x^3 \cdot \left( \frac{dx}{dt} \right)^3}$$

Înlocuind acestea în ecuația dată se obține:  $\frac{d^2x}{dt^2} = t \cdot \left( \frac{dx}{dt} \right)^3.$

**Exercițiul 8.6.17.** Să se transforme ecuația  $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2xy^2 \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + 2 \cdot (y - y^3) \cdot \frac{\partial z}{\partial y} + x^2 \cdot y^2 \cdot z^2 = 0$ , considerând schimbarea de variabile independente  $x = u \cdot v$ ;  $y = \frac{1}{v}$ .

Rezolvare:

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial u} \\ \frac{\partial z}{\partial v} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial v} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial v} \end{cases}$$

Ținând cont că  $x = u \cdot v$  și  $y = \frac{1}{v}$  se obține:  $\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial u} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot v \\ \frac{\partial z}{\partial v} = u \cdot \frac{\partial z}{\partial x} - \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} \end{cases}$

Deci  $\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{v} \cdot \frac{\partial z}{\partial u} \\ \frac{\partial z}{\partial y} = u \cdot v \cdot \frac{\partial z}{\partial u} - v^2 \cdot \frac{\partial z}{\partial v} \end{cases}$

Ținând cont că  $\frac{\partial z}{\partial x} = \frac{1}{v} \cdot \frac{\partial z}{\partial u} \Rightarrow \frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \frac{1}{v} \cdot \frac{\partial}{\partial u} \left( \frac{1}{v} \cdot \frac{\partial z}{\partial u} \right) = \frac{1}{v^2} \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial u^2}.$

Ținând cont de aceste egalități ecuația devine:  $\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + 2u \cdot v^2 \cdot \frac{\partial z}{\partial u} + 2 \cdot (v - v^3) \cdot \frac{\partial z}{\partial v} + x^2 \cdot y^2 \cdot z^2 = 0.$

**Exercițiul 8.6.18.** Să se determine  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$  dacă se trece de la coordonate carteziane la coordonate polare.

Rezolvare:

Trecerea de la coordonate carteziene la coordonate polare este dată de

$$\text{relațiile: } \begin{cases} x = \rho \cdot \cos \theta \\ y = \rho \cdot \sin \theta \end{cases}$$

(1)

$$\text{Atunci } \begin{cases} \frac{dz}{d\rho} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial \rho} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial \rho} \\ \frac{\partial z}{\partial \theta} = \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial x}{\partial \theta} + \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial y}{\partial \theta} \end{cases}$$

$$\text{Ținând cont de egalitățile (1) se obține: } \begin{cases} \frac{\partial z}{\partial \rho} = \cos \theta \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + \sin \theta \cdot \frac{\partial z}{\partial y} \\ \frac{\partial z}{\partial \theta} = -\rho \cdot \sin \theta \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + \rho \cdot \cos \theta \cdot \frac{\partial z}{\partial y} \end{cases}$$

Rezolvând sistemul în raport cu  $\frac{\partial z}{\partial x}$  și  $\frac{\partial z}{\partial y}$  se obține:

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = \cos \theta \cdot \frac{\partial z}{\partial \rho} - \frac{\sin \theta}{\rho} \cdot \frac{\partial z}{\partial \theta} \\ \frac{\partial z}{\partial y} = \sin \theta \cdot \frac{\partial z}{\partial \rho} + \frac{\cos \theta}{\rho} \cdot \frac{\partial z}{\partial \theta} \end{cases}$$

Din aceste egalități se obțin următorii operatori de derivare:

$$\begin{cases} \frac{\partial \cdot}{\partial x} = \cos \theta \cdot \frac{\partial \cdot}{\partial \rho} - \frac{\sin \theta}{\rho} \cdot \frac{\partial \cdot}{\partial \theta} \\ \frac{\partial \cdot}{\partial y} = \sin \theta \cdot \frac{\partial \cdot}{\partial \rho} + \frac{\cos \theta}{\rho} \cdot \frac{\partial \cdot}{\partial \theta} \end{cases}$$

Ținând cont de acești operatori se obține:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial}{\partial x} \left( \sin \theta \cdot \frac{\partial z}{\partial \rho} + \frac{\cos \theta}{\rho} \cdot \frac{\partial z}{\partial \theta} \right) = \cos \theta \cdot \frac{\partial}{\partial \rho} \left( \sin \theta \cdot \frac{\partial z}{\partial \rho} + \frac{\cos \theta}{\rho} \cdot \frac{\partial z}{\partial \theta} \right) - \frac{\sin \theta}{\rho}$$

$$\cdot \frac{\partial}{\partial \theta} \left( \sin \theta \cdot \frac{\partial z}{\partial \rho} + \frac{\cos \theta}{\rho} \cdot \frac{\partial z}{\partial \theta} \right) = \cos \theta \cdot \sin \theta \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial \rho^2} - \frac{\sin \theta \cdot \cos \theta}{\rho^2} \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial \theta^2} + \frac{\cos 2\theta}{\rho} \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial \theta \partial \rho} -$$

$$- \frac{\cos 2\theta}{\rho} \cdot \frac{\partial z}{\partial \theta} - \frac{\sin \theta \cdot \cos \theta}{\rho} \cdot \frac{\partial z}{\partial \rho}$$

**Exercițiul 8.6.19.** Ce devine ecuația  $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2 \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = 0$  dacă se fac schimbările de variabile  $u = x + z$ ,  $v = y + z$ .

Rezolvare:

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} \\ \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} \end{cases}$$

Ținând cont că  $\frac{\partial u}{\partial x} = 1 + \frac{\partial z}{\partial x}$ ;  $\frac{\partial v}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial x}$ ;  $\frac{\partial u}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial y}$ ;  $\frac{\partial v}{\partial y} = 1 + \frac{\partial z}{\partial y}$  se obține că:

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\frac{\partial z}{\partial u}}{1 - \frac{\partial z}{\partial u} - \frac{\partial z}{\partial v}} \\ \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\frac{\partial z}{\partial v}}{1 - \frac{\partial z}{\partial u} - \frac{\partial z}{\partial v}} \end{cases}$$

(1)

Relațiile (1) se mai pot pune și sub forma

$$\begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = \frac{\partial z}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \left( \frac{\partial z}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial v} \right) = \left( 1 + \frac{\partial z}{\partial x} \right) \cdot \frac{\partial z}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial z}{\partial v} \\ \frac{\partial z}{\partial y} = \frac{\partial z}{\partial y} \cdot \frac{\partial z}{\partial u} + \left( 1 + \frac{\partial z}{\partial y} \right) \frac{\partial z}{\partial v} \end{cases}$$

(2)

Ținând cont de relațiile (2) se obține:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = \left( 1 + \frac{\partial z}{\partial x} \right) \cdot \frac{\partial}{\partial u} \left( \frac{\frac{\partial z}{\partial u}}{1 - \frac{\partial z}{\partial u} - \frac{\partial z}{\partial v}} \right) + \frac{\partial z}{\partial x} \cdot \frac{\partial}{\partial v} \left( \frac{\frac{\partial z}{\partial v}}{1 - \frac{\partial z}{\partial u} - \frac{\partial z}{\partial v}} \right) =$$

$$\frac{1}{\left( 1 - \frac{\partial z}{\partial u} - \frac{\partial z}{\partial v} \right)^3} \cdot \left[ \left( 1 - \frac{\partial z}{\partial v} \right) \frac{\partial \cdot}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial \cdot}{\partial v} \right]^{(2)} (z)$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{1}{\left( 1 - \frac{\partial z}{\partial u} - \frac{\partial z}{\partial v} \right)^3} \cdot \left[ \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial \cdot}{\partial u} + \left( 1 - \frac{\partial z}{\partial u} \right) \cdot \frac{\partial \cdot}{\partial v} \right]^{(2)} (z)$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{1}{\left( 1 - \frac{\partial z}{\partial u} - \frac{\partial z}{\partial v} \right)^3} \cdot \left\{ \left[ \frac{\partial z}{\partial v} \cdot \frac{\partial \cdot}{\partial u} - \left( 1 - \frac{\partial z}{\partial u} \right) \cdot \frac{\partial \cdot}{\partial v} \right] \cdot \left[ \left( 1 - \frac{\partial z}{\partial v} \right) \frac{\partial \cdot}{\partial u} + \frac{\partial z}{\partial u} \cdot \frac{\partial \cdot}{\partial v} \right] \right\} (z)$$

Ținând cont de acestea se obține că:



$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + 2 \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = \frac{1}{\left(1 - \frac{\partial z}{\partial u} - \frac{\partial z}{\partial v}\right)^3} \cdot \left[\frac{\partial \cdot}{\partial u} + \frac{\partial \cdot}{\partial v}\right]^{(2)}(z)$$

Deci ecuația obținută este:  $\frac{\partial^2 z}{\partial u^2} + 2 \cdot \frac{\partial^2 z}{\partial u \partial v} + \frac{\partial^2 z}{\partial v^2} = 0$ .

**Exercițiul 8.6.20.** Să se determine  $2z \cdot \left(\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}\right)$  dacă se face schimbarea:  $u = \frac{y}{x}$ ;  $v = x^2 + y^2$ ;  $w = z^2$ .

Rezolvare: Sunt evidente relațiile

$$\begin{cases} \frac{\partial w}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = 2z \cdot \frac{\partial z}{\partial x} \\ \frac{\partial w}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} = 2z \cdot \frac{\partial z}{\partial y} \end{cases}$$

Ținând cont că  $u = \frac{y}{x}$ ;  $v = x^2 + y^2$  relațiile anterioare devin:

$$\begin{cases} -\frac{y}{x^2} \cdot \frac{\partial w}{\partial u} + 2 \cdot x \cdot \frac{\partial w}{\partial v} = 2z \cdot \frac{\partial z}{\partial x} \\ \frac{1}{x} \cdot \frac{\partial w}{\partial u} + 2y \cdot \frac{\partial w}{\partial v} = 2z \cdot \frac{\partial z}{\partial y} \end{cases}$$

Atunci  $\frac{x-y}{x^2} \cdot \frac{\partial w}{\partial u} + 2(x+y) \cdot \frac{\partial w}{\partial v} = 2z \left(\frac{\partial z}{\partial x} + \frac{\partial z}{\partial y}\right)$ .

**Exercițiul 8.6.21.** Ce devine ecuația  $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 z}{\partial y^2} - 2 \cdot \frac{\partial z}{\partial x \partial y} = 0$  dacă se face

schimbarea de variabilă și funcție:  $u = x + y$ ;  $v = \frac{y}{x}$ ;  $w = \frac{z}{x}$ .

Rezolvare:

Din datele problemei se obține:

$$\begin{cases} \frac{\partial w}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + \frac{\partial w}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial x} = -\frac{z}{x^2} + \frac{1}{x} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} \\ \frac{\partial w}{\partial u} \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + \frac{\partial w}{\partial v} \cdot \frac{\partial v}{\partial y} = \frac{1}{x} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} \end{cases}$$

Ținând cont că  $u = x + y$  și  $v = \frac{y}{x}$  se obține:

$$\begin{cases} \frac{\partial w}{\partial u} - \frac{y}{x^2} \cdot \frac{\partial w}{\partial v} = -\frac{z}{x^2} + \frac{1}{x} \cdot \frac{\partial z}{\partial x} \\ \frac{\partial w}{\partial u} - \frac{1}{x} \cdot \frac{\partial w}{\partial v} = \frac{1}{x} \cdot \frac{\partial z}{\partial y} \end{cases}$$

$$\text{Deci } \begin{cases} \frac{\partial z}{\partial x} = x \cdot \frac{\partial w}{\partial u} - \frac{y}{x} \cdot \frac{\partial w}{\partial v} + \frac{z}{x} \\ \frac{\partial z}{\partial y} = x \cdot \frac{\partial w}{\partial u} + \frac{\partial w}{\partial v} \end{cases} .$$

Se calculează derivatele de ordinul doi și se obține:

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x^2} = 2 \cdot \frac{\partial w}{\partial u} + x \cdot \frac{\partial^2 w}{\partial u^2} - 2 \cdot \frac{y}{x} \cdot \frac{\partial^2 w}{\partial x \partial y} + \frac{y^2}{x^3} \cdot \frac{\partial^2 w}{\partial v^2}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial y^2} = x \cdot \frac{\partial^2 w}{\partial u^2} - 2 \cdot \frac{\partial^2 w}{\partial u \partial v} + \frac{1}{x} \cdot \frac{\partial^2 w}{\partial v^2}$$

$$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial w}{\partial u} + x \cdot \frac{\partial^2 w}{\partial u^2} + \left(1 - \frac{y}{x}\right) \cdot \frac{\partial^2 w}{\partial u \partial v} - \frac{y}{x^2} \cdot \frac{\partial^2 w}{\partial v^2}$$

Dacă se înlocuiesc valorile lui  $\frac{\partial^2 z}{\partial x^2}$ ,  $\frac{\partial^2 z}{\partial y^2}$ ,  $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y}$  în ecuația dată se obține:

$$\frac{\partial^2 w}{\partial v^2} = 0 .$$

# CAPITOLUL IX

## EXERCIȚII PROPUSE

### Exercițiul 9.1.1.

Să se arate că funcția  $f : X \rightarrow Y$  este inversabilă dacă și numai dacă este bijectivă.

### Exercițiul 9.1.2.

Să se arate că dacă funcțiile  $f : X \rightarrow Y$  și  $g : Y \rightarrow Z$  sunt bijective atunci:

a)  $g \circ f : X \rightarrow Z$  este bijectivă

b)  $(g \circ f)^{-1} = f^{-1} \circ g^{-1}$ .

### Exercițiul 9.1.3.

Fie  $X = \{x_1, x_2, \dots, x_n\}$  o mulțime formată dintr-un număr finit de elemente și  $f : X \rightarrow X$  o funcție. Următoarele afirmații sunt echivalente:

a)  $f$  este injectivă;

b)  $f$  este surjectivă;


c)  $f$  este bijectivă.

### Exercițiul 9.1.4.

Fie  $f : X \rightarrow Y$  o funcție. Să se arate că:

a) Relația  $R_f$  definită prin  $xR_f y$  dacă și numai dacă  $f(x) = f(y)$  este o relație de echivalență pe  $X$ ;

b) Există o funcție injectivă  $h : X/R_f \rightarrow Y$  astfel încât diagrama să fie comutativă, unde  $p$  este aplicația canonică;



c) Dacă  $f$  este surjectivă, atunci  $h$  este bijectivă.

### Exercițiul 9.1.5.

Fie  $M$  o mulțime arbitrară. Să se arate că:

a)  $(P(M), \subset)$  este o structură de ordine parțială în care  $\emptyset$  este primul element, iar  $M$  ultimul element;

b) oricare ar fi  $A_i \in P(M)$ ,  $i \in I$  au loc relațiile:

$$\text{a. } \sup\{A_i\}_{i \in I} = \bigcup_{i \in I} A_i$$

$$\text{b. } \inf\{A_i\}_{i \in I} = \bigcap_{i \in I} A_i$$

**Exercițiul 9.1.6.**

Fie  $X = \{\{1\}, \{1,2\}, \{2,3,4\}, \{5\}\}$  ordonată prin incluziune.

- a) Să se determine elementele maximale și minimale.
- b) Există un cel mai mare element?

**Exercițiul 9.1.7.**

Fie  $\mathbb{Z}$  mulțimea numerelor întregi pe care se definește relația:

$$x \mathfrak{R} y \Leftrightarrow 3 \text{ divide pe } x - y$$

- a) Să se arate că  $\mathfrak{R}$  este o relație de echivalență.
- b) Să se determine  $C_x \in \mathbb{Z} / \mathfrak{R}$  care conține întregul  $x$ .
- c) Să se determine mulțimea factor  $\mathbb{Z} / \mathfrak{R}$ .

**Exercițiul 9.1.8.**

Fie  $f : A \rightarrow B$ . Să se arate că:

- a)  $f$  surjecție  $\Rightarrow \text{card}B \leq \text{card}A$ ;
- b)  $f$  injecție  $\Rightarrow \text{card}A \geq \text{card}B$ .

**Exercițiul 9.1.9.**

Să se demonstreze că mulțimea  $\mathbb{N}$  a numerelor naturale este infinită.

**Exercițiul 9.1.10.**

Să se arate că mulțimea  $\mathbb{N} \times \mathbb{N}$  este numărabilă.

**Exercițiul 9.1.11.**

Să se arate că:

$$\text{a) } \text{card} \left[ \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \right] = \aleph_0; \text{ unde } \text{card}A_n = \aleph_0$$

$$\text{b) } \text{card} \left[ \bigcup_{n \in \mathbb{N}} A_n \right] \leq \aleph_0; \text{ unde } \text{card}A_n < \aleph_0$$

$$\text{c) } \text{card}[A \times B] = \aleph_0; \text{ unde } \text{card}A = \aleph_0, \text{ card}B = \aleph_0$$

$$\text{d) } \text{card} \left[ \prod_{i=1}^n A_i \right] = \aleph_0; \text{ unde } \text{card}A_i = \aleph_0, (\forall) i = \overline{1, n}.$$

**Exercițiul 9.1.12.**

Să se arate că pentru orice numere reale  $a, b, c, d$  cu  $a < b$  și  $c < d$  există relațiile:

- a)  $[a, b] \sim [c, d]; (a, b) \sim (c, d);$
- b)  $[a, b] \sim (a, b) \sim (a, b) \sim [a, b];$

**Exercițiul 9.1.13.**

Să se arate că:

- a)  $\text{card}(\mathbb{Z}) = \aleph_0;$
- b)  $\text{card}(\mathbb{Q}) = \aleph_0;$
- c)  $\text{card}(P) = \aleph_0$ ,  $P$  mulțimea numerelor prime;
- d) mulțimea polinoamelor cu coeficienți reali este numărabilă;
- e)  $\text{card}(A) = \aleph_0$ ;  $A$  mulțimea numerelor algebrice.

**Exercițiul 9.1.14.**

Fie  $M$  o mulțime oarecare. Să se arate că:

- a)  $\text{card}P(M) = 2^{\text{card}M};$
- b)  $\text{card}A < 2^n$  oricare ar fi cardinalul  $a$ .

**Exercițiul 9.1.15.**

Să se arate că:

- a)  $\text{card}([a, b]) = \text{card}((a, b)) = ([a, b]) = \aleph_c;$
- b)  $\text{card}(I) = \aleph_c$ ;  $I$  mulțimea numerelor iraționale;
- c)  $\text{card}(T) = \aleph_c$ ;  $T$  mulțimea numerelor transcedente;
- d)  $\text{card}(\mathbb{N}^{\mathbb{N}}) = \aleph_0;$

**Exercițiul 9.1.16.**

Să se arate că:

- a)  $\text{card}\bigcup_{i=1}^n (A_i) = \aleph_c; [\text{card}A_i = \aleph_c; A_i \cap A_j = \emptyset \ i \neq j;]$
- b)  $\text{card}\left(\bigcup_{i \in \mathbb{N}} A_i\right) = \aleph_c; [\text{card}A_i = \aleph_c; A_i \cap A_j = \emptyset \ i \neq j;]$
- c)  $\text{card}(A \times B) = \aleph_c; [\text{card}A = \text{card}B = \aleph_c]$

**Exercițiul 9.1.17.**

Să se afle:

- a)  $\text{card}P(\mathbb{N})$
- b)  $\text{card}P(\mathbb{R})$
- c)  $\text{card} \mathbb{R}^{\mathbb{R}}$

**Exercițiul 9.2.1.**

Familia  $F$  a mulțimilor închise din spațiul topologic  $(\mathbb{R}, \tau_{\mathbb{R}})$  are următoarele proprietăți:

$$1^0 \phi, \mathbb{R} \in F$$

$$2^0 \text{ pentru orice } k \in I \Rightarrow \bigcap_{k \in I} F_k \in F;$$

$$3^0 \text{ pentru orice } F_k \in F, k = \overline{1, n} \Rightarrow \bigcup_{k=1}^n F_k \in F.$$

**Exercițiul 9.2.2.**

Să se arate folosind mulțimile  $F_n = [1/n, 1]$ ,  $n \in \mathbb{N}^*$ , că proprietatea  $3^0$  de la Exercițiul 9.2.1 nu este adevărată pentru reuniune infinită.

**Exercițiul 9.2.3.**

Fie  $(X, T)$  un spațiu topologic și  $A, B \subset X$ . Să se arate că:

$$a) \overset{0}{A} \subset A;$$

$$b) A \subset B \Rightarrow \overset{0}{A} \subset \overset{0}{B};$$

$$c) \overset{0}{A \cap B} = \overset{0}{A} \cap \overset{0}{B};$$

$$d) \overset{0}{\bigcap_{i \in I} A_i} = \bigcap_{i \in I} \overset{0}{A_i};$$

$$e) \bigcup_{i \in I} \overset{0}{A_i} = \overset{0}{\bigcup_{i \in I} A_i}.$$

**Exercițiul 9.2.4.**

Fie  $(X, T)$  un spațiu topologic și  $A, B \subset X$ . Să se arate că:

$$a) A \subset \bar{A};$$

$$b) A \subset B \Rightarrow \bar{A} \subset \bar{B};$$

$$c) \overline{A \cup B} = \bar{A} \cup \bar{B};$$

$$d) \bar{\bar{A}} = A.$$

**Exercițiul 9.2.5.**

Fie  $(X, T)$  un spațiu topologic și  $A, B \subset X$ . Să se arate că:

$$a) A \subset B \Rightarrow A' \subset B';$$

$$b) (A \cup B)' = A' \cup B';$$

$$c) (A')' = A';$$

$$d) A' \subset \bar{A}.$$

**Exercițiul 9.2.6.**

Fie  $(X, T)$  un spațiu topologic și  $A \subset X$ . Să se arate că următoarele afirmații sunt echivalente:

- a)  $A$  este închisă;
- b)  $A \supset \bar{A}$ , ( $A = \bar{A}$ );
- c)  $A \supset A'$ ;
- d)  $A \supset \text{fr}A$ .

**Exercițiul 9.2.7.**

Fie  $(\mathbb{R}, \tau_{\mathbb{R}})$  spațiu topologic. Se consideră mulțimile:

$$A_p = \left\{ \frac{1}{p} + \frac{1}{n} \mid n \in \mathbb{N}^* \right\}, p \in \mathbb{N}^*$$

și

$$A = \bigcup_{p=1}^{\infty} A_p$$

Să se determine punctele lor importante.

**Exercițiul 9.2.8.**

Să se arate că:

- a)  $\partial A = \bar{A} \cap \overline{CA}$ ;
- b)  $\partial A = A \setminus \overset{\circ}{A} = \text{Iz}A \cup (A \setminus \overset{\circ}{A})$ ;
- c)  $\overline{\partial A} = \partial A$ ;
- d)  $\partial(\partial A) = \partial A \setminus \overset{\circ}{\partial A}$ ;
- e)  $\partial(A \cup B) \subset \partial A \cup \partial B$ .

**Exercițiul 9.2.9.**

Fie  $(\mathbb{R}, \tau_{\mathbb{R}})$  spațiu topologic real. Să se determine:

$$\overset{\circ}{E}, \text{ext}E, \text{fr}E, \bar{E}, E', \text{I}_z E$$

dacă

- a)  $E = (x_1, x_2, \dots, x_n)$ ;
- b)  $E = [1, 2] \cup (3, 4) \cup \{5\}$ ;
- c)  $E = \mathbb{Q}$ .

**Exercițiul 9.2.10.**

Fie  $S = \left\{ \{x_n\}_{n \in \mathbb{N}} \mid x_n \in \mathbb{R}, (\forall) n \in \mathbb{N} \right\}$  (mulțimea șirurilor de numere reale).

Să se arate că:

$$d : S \times S \rightarrow \mathbb{R}, d(x_n, y_n) = \sum_{n \in \mathbb{N}} \frac{1}{2^n} \frac{|x_n - y_n|}{1 + |x_n - y_n|}$$

este o metrică pe  $S$ .

Să se calculeze distanța dintre șirurile:

$$x_n = 1 + (-1)^n \text{ și } y_n = 1 - (-1)^{\frac{n(n+1)}{2}}.$$

### Exercițiul 9.2.11.

Se consideră mulțimea:

$S = C^1[a, b]$  (mulțimea funcțiilor continue și cu derivata de ordinul întâi continuă pe  $[a, b]$ ) și se definește funcția  $d : S \times S \rightarrow \mathbb{R}_+$  astfel

$$d(f, g) = \max_{x \in [a, b]} |f(x) - g(x)| + \max_{x \in [a, b]} |f'(x) - g'(x)|$$

Să se arate că  $d$  este o metrică.

### Exercițiul 9.2.12.

Considerând metrica de la Exercițiul 9.2.11 să se calculeze  $d(f, g)$  dacă:

a)  $f(x) = x$ ;  $g(x) = \ln x$ ;  $x \in [e^{-1}, e]$ ;

b)  $f(x) = x^2$ ;  $g(x) = x^3$ ;  $x \in [0, 1]$ ;

c)  $f_n(x) = \sin \frac{x}{n}$ ;  $g(x) = 0$ ;  $x \in [0, 1]$ ;

d)  $f_n(x) = \cos \frac{nx}{n^2 + 1}$ ;  $g(x) = 0$ ;  $x \in [0, 2\pi]$ .

### Exercițiul 9.2.13.

Se dau:

$$d_1(x, y) = |x - y| \text{ și } d_2(x, y) = |\ln x - \ln y|$$

oricare ar fi  $x, y \in \mathbb{R}_+ \setminus \{0\} = E$ .

a) Să se arate că  $(E, d_1)$  și  $(E, d_2)$  sunt spații metrice.

b) Cum arată sferile deschise pentru fiecare din cele două spații metrice.

### Exercițiul 9.2.14.

Să se arate că dacă  $(S, d)$  este spațiu metric, atunci:

a)  $d_1 : S \times S \rightarrow \mathbb{R}_+$ ;  $d_1(x, y) = \frac{d(x, y)}{1 + d(x, y)}$ ,  $(\forall) x, y \in S$ ;

b)  $d_2 : S \times S \rightarrow \mathbb{R}_+$ ;  $d_2(x, y) = \ln(1 + d(x, y))$ ,  $(\forall) x, y \in S$ ;

c)  $d_3 : S \times S \rightarrow \mathbb{R}_+$ ;  $d_3(x, y) = (d(x, y))^\alpha$ ,  $\alpha \in (0, 1)$ ,  $(\forall) x, y \in S$

sunt metrice.



d) Dacă  $S = \mathbb{R}^2$  și  $d$  metrica euclidiană să se calculeze  $d_1, d_2, d_3$  pentru  $x = (1,2)$  și  $y = (-3,-1)$ .

**Exercițiul 9.2.15.**

Fie  $\mathbb{R}^n$  înzestrat cu structura de spațiu vectorial, real. Să se arate că:

a)  $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_+, \varphi(\bar{x}) = \|\bar{x}\| = \sum_{i=1}^n x_i^2$  este normă;

b)  $\varphi: \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}_+, \varphi(\bar{x}) = \|\bar{x}\| = \sum_{i=1}^n |x_i|$  este normă.

**Exercițiul 9.2.16.**

Doi vectori  $x, y$  ai unui spațiu prehilbertian sunt ortogonali

$$\Leftrightarrow \|x + y\|^2 = \|x\|^2 + \|y\|^2.$$

**Exercițiul 9.3.1.**

Să se găsească marginile mulțimilor de numere reale:

$$1^0 A = \left\{ \frac{6^n}{n!} \mid n \in \mathbb{N} \right\};$$

$$2^0 A = \left\{ \frac{(-1)^n}{n} + \frac{n}{2n+1} \mid n \in \mathbb{N} \right\};$$

$$3^0 A = \left\{ 1 + \frac{(-1)^{n-1}}{n} + \frac{(-1)^n n}{2n-1} \mid n \in \mathbb{N} \right\};$$

$$4^0 A = \left\{ \frac{1}{m^2} + \frac{1}{n^2} \mid m, n \in \mathbb{N} \right\};$$

$$5^0 A = \left\{ n^{(-1)^n} + 1 \mid n \in \mathbb{N} \right\};$$

$$6^0 A = \left\{ (-1)^{n-1} + n \cdot \sin n \cdot \frac{\pi}{2} \mid n \in \mathbb{N} \right\}.$$

**Exercițiul 9.3.2.**

Să se găsească un interval închis care conține toți termenii șirurilor:

$$1^0 (x_n)_{n \in \mathbb{N}}; x_n = \sin \frac{n}{n+1} \cdot \frac{\pi}{2};$$

$$2^0 (I_n)_{n \in \mathbb{N}}; I_n = \int_0^n e^{-x^2} dx.$$

**Exercițiul 9.3.3.**

Să se precizeze dacă următoarele șiruri sunt mărginite sau nu:

$$1^0 x_n = \sum_{k=1}^n \cos k\alpha, \alpha \in (0, \pi);$$

$$2^0 x_n = \sum_{k=1}^n (-1)^k \cos k\alpha, \alpha \in (0, \pi);$$

$$3^0 x_n = \sum_{k=1}^n \sin k\alpha, \alpha \in (0, \pi);$$

$$4^0 x_n = \sum_{k=1}^n (-1)^k \sin k\alpha, \alpha \in (0, \pi);$$

$$5^0 x_n = n^{(-1)^n} + 1, \alpha \in (0, \pi);$$

$$6^0 x_n = (-1)^n n \cdot \sin \frac{n\pi}{2};$$

$$7^0 x_n = \sqrt{1 + \sqrt{2 + \sqrt{3 + \dots + \sqrt{n}}}}.$$

#### Exercițiul 9.3.4.

Să se studieze monotonia următoarelor șiruri:

$$1^0 x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^n;$$

$$2^0 x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n+1};$$

$$3^0 x_n = \prod_{k=1}^n \left(1 - \frac{1}{3k}\right);$$

$$4^0 x_n = \prod_{k=1}^n \left(1 + \frac{1}{2k}\right);$$

$$5^0 x_n = \frac{\sqrt[n+1]{(n+1)!}}{\sqrt[n]{n!}};$$

$$6^0 x_n = \left(1 + \frac{1}{n}\right)^{n^2} \cdot \frac{n!}{n^n \cdot \sqrt{n}}.$$

#### Exercițiul 9.3.5.

Să se studieze convergența următoarelor șiruri:

$$1^0 x_n = \frac{1}{n^\alpha};$$

$$3^0 x_n = \lambda^n;$$

$$5^0 x_n = \frac{2^n}{n!};$$

$$2^0 x_n = (-1)^n \cdot \frac{1}{n^\alpha};$$

$$4^0 x_n = \frac{n}{2^n};$$

$$6^0 x_n = \frac{n}{a^n}, a > 0;$$

$$7^0 \quad x_n = \prod_{k=1}^n \frac{2k-1}{2k}; \quad 8^0$$

$$x_n = \frac{\sqrt[3]{n^2} \cdot \sin(n!)}{2n+1};$$

$$9^0 \quad x_n = \frac{\ln n}{n^\alpha}; \quad 10^0$$

$$x_n = (-1)^n \cdot \frac{n}{n+1};$$

$$11^0 \quad x_n = \sin \frac{n\pi}{4}; \quad 12^0 \quad x_n = \sin n;$$

$$13^0 \quad x_n = \cos \frac{\pi}{2^n}; \quad 14^0$$

$$x_n = \operatorname{tg} \frac{n^2}{n^2+1} \cdot \frac{\pi}{4};$$

$$15^0 \quad x_n = \arcsin \frac{(-1)^n \cdot n^2 + 1}{n^2 + 2n}; \quad 16^0$$

$$x_n = \operatorname{arctg} \frac{1 + (-1)^n \cdot n^2}{1 + n^2};$$

### Exercițiul 9.3.6.

Să se calculeze:

$$1^0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \cdot \sum_{k=1}^n \operatorname{tg}^2 \frac{\alpha}{k}, \quad \alpha \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$$

$$2^0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n^k}, \quad k \in \mathbb{Z};$$

$$3^0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt[n]{n!}};$$

$$4^0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{n!}}{n};$$

$$5^0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sqrt[n]{\prod_{k=1}^n (n+k)}}{n};$$

$$6^0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{n! \cdot 2^{\frac{n(n+1)}{2}}};$$

$$7^0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{(n!)^3}{(3n)!}};$$

$$8^0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} n \cdot \sqrt[n]{\frac{3^k}{(2n)!}};$$

$$9^0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\frac{(n!)^3 \cdot a^n}{(2n-1)!}}, \quad a > 0; \quad 10^0$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n+1]{(n+1)!} - \sqrt[n]{n!};$$

$$11^0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{k!}; \quad 12^0 \quad \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sum_{k=1}^n \frac{1}{k} - \ln n \right);$$

$$13^0 \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \cos \pi \cdot n^2 \cdot \ln \frac{n}{n+1} \right), a > 0;$$

$$15^0 \lim_{n \rightarrow \infty} n \left( a^{\frac{1}{n}} - 1 \right), a > 0;$$

$$17^0 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{(2k)^2};$$

$$19^0 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n^2+k}};$$

$$21^0 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt[4]{n+k}};$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{(n^2+k^2)^2};$$

$$23^0 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{(n+k)^2};$$

$$25^0 \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{\sum_{k=1}^n k^m}{n^{m+1}} - \frac{n}{m+1} \right), m \in \mathbb{N};$$

$$27^0 \lim_{n \rightarrow \infty} \sqrt[n]{\prod_{k=1}^n C_n^k};$$

$$29^0 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n!} \int_0^1 (\arcsin x)^n dx;$$

$$30^0 \lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\frac{1}{n+1}}^{\frac{1}{n}} \arctg nx dx;$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \int_{\frac{1}{n+1}}^{\frac{1}{n}} \arcln nx dx;$$

$$14^0 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{2k-1}{2^k};$$

$$16^0 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{(n)^2 \cdot 2^{2n}}{(2n)! \sqrt{n}};$$

$$18^0 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{\sqrt{n+k}};$$

$$20^0 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{k^3+k}{n^2+k};$$

$$22^0$$

$$24^0 \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sum_{k=1}^n k^m}{n^{m+1}};$$

$$26^0 \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n \frac{1}{(k+1)!};$$

$$28^0 \lim_{n \rightarrow \infty} \int_0^1 \frac{x^n}{\sqrt{1-x^2}} dx;$$

$$31^0$$

### Exercițiul 9.3.7.

Să se studieze convergența și în caz afirmativ să se determine limita pentru șirurile definite recurent după cum urmează:

$$1^0 x_n = (n+2)x_{n-1} - (n+1)x_{n-2}, x_0 = a, x_1 = 2a;$$

$$2^0 n \cdot x_{n+2} - (n-1)x_{n+1} - x_n = 0, n \in \mathbb{N}, x_0 = a;$$

$$3^0 (n+1)^2 \cdot x_{n-1} - n^2 \cdot x_n = 2n+1, n \in \mathbb{N};$$

$$4^0 (n+1)^2 \cdot x_{n+1} - n^3 \cdot x_n = n+1, x_1 = a, n \in \mathbb{N};$$

$$5^0 x_{n+1} = \frac{x_n}{3-2 \cdot x_n}, n \in \mathbb{N}, x_0 = a \neq \frac{3}{2};$$

$$6^0 x_{n+1} = \frac{2 \cdot x_n - 1}{x_n}, n \in \mathbb{N}, x_0 = a;$$

### Exercițiul 9.3.8.

Folosind definiția limitei să se arate că:

$$1^0 \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{(\sqrt{n^2+1}+n)^2}{\sqrt[3]{n^6+1}}, \frac{(n+2)!+(n+1)!}{(n+3)!} \right) = (4,0);$$

$$2^0 \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sqrt{n+1} - \sqrt{n}, \frac{(-1)^n}{n}, \frac{(-3)^n + 4^n}{(-3)^{n+1} + 4^n} \right) = (0,0,1);$$

$$3^0 \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \sum_{k=1}^n \frac{1}{k(k+1)}, \frac{n!}{n}, \frac{\sum_{k=1}^n k - \frac{n}{2}}{n+2} \right) = (1,0,1);$$

$$4^0 \lim_{n \rightarrow \infty} \left( \frac{(-1)^n}{n^2+1}, \frac{1+(-1)^n}{n!}, \cos \frac{n\pi}{2} \right) \text{ nu există.}$$

### Exercițiul 9.3.9.

În  $\mathbb{R}^2$  se consideră șirul:  $x_1 = (1,0)$ ,  $x_2 = (0,1)$ ,  $x_3 = (1,0)$ ,  $x_4 = (0,1), \dots$

Să se arate că:

1<sup>0</sup> În metrica uzuală acest șir este divergent.

2<sup>0</sup> Șirul  $(\|x_n\|)_{n \in \mathbb{N}}$  este convergent.

### Exercițiul 9.3.10.

Se consideră spațiul metric  $(\mathbb{R}, d_1)$  unde  $d_1(x, y) = |\arctg x - \arctg y|$ . Să se arate că șirul  $(x_n)_{n \in \mathbb{N}}$ ,  $x_n = n$ ,  $(\forall) n \in \mathbb{N}$  este fundamental, dar nu este convergent.

### Exercițiul 9.3.11.

Fie  $(C_{[a,b]}^0, d)$  spațiu metric unde  $d(f, g) = \sqrt{\int_{[0,1]} (f(x) - g(x))^2 dx}$ .

Să se arate că șirul  $(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$ ,  $f_n(x) = x^n$ ,  $x \in [0,1]$  nu este convergent în  $((C^0[0,1]), d)$ , dar este șir fundamental.

**Exercițiul 9.3.12.**

Fie  $(\mathbb{R}^2, d)$  spațiu metric, cu metoda euclidiană uzuală. Folosind criteriul lui Cauchy, să se studieze convergența următoarelor șiruri;

$$1^0 \bar{x}_n = \left( \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{k}; \frac{n+1}{n} \right)$$

$$2^0 \bar{x}_n = \left( \sum_{k=1}^n \frac{1}{k^2}; \sum_{k=1}^n \frac{(-1)^{k-1}}{\ln(k+1)} \right)$$

$$3^0 \bar{x}_n = \left( \sum_{k=1}^n \frac{1}{(2k+1)!}; \sum_{k=1}^n \frac{\cos k \frac{\pi}{6}}{k(k+1)} \right)$$

$$4^0 \bar{x}_n = \left( \frac{1+(-1)^{n-1}}{3^n}; \frac{(n+1)^2}{3n^2+n+1} \right)$$

**Exercițiul 9.3.13.**

Să se găsească punctele limită ale șirului  $\bar{u}_n = (x_n, y_n, z_n)$  pentru următoarele cazuri:

$$1^0 x_n = 1 + (-1)^n \cdot \sqrt[n]{\alpha} \quad (\alpha > 0); \quad y_n = \sin^2 \frac{n\pi}{4}; \quad z_n = \sqrt[n]{1+2^{n(-1)^n}}, \quad n \in \mathbb{N}$$

$$2^0 x_n = \frac{\ln n}{\sqrt[4]{n^5}}; \quad y_n = \cos \frac{2n\pi}{3}; \quad z_n = (-1)^n \cdot \sqrt[n]{n}, \quad n \in \mathbb{N}$$

**Exercițiul 9.3.14.**

Să se stabilească dacă funcțiile de mai jos admit puncte fixe și apoi să se găsească:

$$1^0 f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^2;$$

$$2^0 f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = x^3;$$

$$3^0 f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \sin x;$$

$$4^0 f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \cos x;$$

$$5^0 f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = e^x - 1;$$

$$6^0 f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, \quad f(x) = \begin{cases} |x|^\alpha \cdot \sin \frac{1}{x}, & x \in \mathbb{R} \setminus \{0\}; \quad \alpha > 0; \\ 0; & x = 0 \end{cases}$$

**Exercițiul 9.3.15.**

Fie  $f : [a, b] \rightarrow [a, b]$ , ( $a < b$ ) crescătoare. Să se arate că  $f$  admite cel puțin un punct fix.

**Exercițiul 9.3.16.**

Să se arate că următoarele funcții sunt contracții pe mulțimile indicate, considerate ca spații metrice cu metrica euclidiană:

$$1^0 f : \left[ \frac{4}{9}; \frac{1}{2} \right] \rightarrow \left[ \frac{4}{9}; \frac{1}{2} \right], f(x) = \frac{1}{(x+1)^2};$$

$$2^0 f : [-3; -2] \rightarrow [-3; -2], f(x) = \sqrt[3]{x} - 1;$$

$$3^0 f : [-1; 0] \rightarrow [-1; 0], f(x) = \frac{x-1}{(x-4)^3} - 1;$$

$$4^0 f : [1; 2] \rightarrow [1; 2], f(x) = \sqrt[3]{5-x};$$

$$5^0 f : [-3; -2] \rightarrow [-3; -2], f(x) = \arcsin \frac{x+1}{4}.$$

**Exercițiul 9.3.17.**

Să se aplice principiul contracției pentru studiul convergenței șirurilor date prin relațiile de recurență:

$$1^0 x_n = \frac{\pi}{3\sqrt{3}} x_{n-1}, x_0 \in \mathbb{R} \text{ dat}, n \in \mathbb{N};$$

$$2^0 x_n = \frac{4}{\pi} \operatorname{arctg} x_{n-1}, x_0 \in \mathbb{R} \text{ dat}, n \in \mathbb{N};$$

$$3^0 x_n = 1 + \ln \sqrt{x_{n-1}}, x_0 \in [1, +\infty) \text{ dat}, n \in \mathbb{N};$$

**Exercițiul 9.4.1.**

Utilizând șirul sumelor parțiale să se studieze natura seriilor următoare și, în caz afirmativ, să se calculeze sumele acestor serii:

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{2n+3}{n(n+1)(n+2)};$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left[ 1 + \frac{2}{n(n+3)} \right];$$

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} (\sqrt{n+2} - 2\sqrt{n+1} + \sqrt{n});$$

$$d) \sum_{n=1}^{\infty} \ln \left( \operatorname{ch} \frac{a}{2^n} \right), a \in \mathbb{R};$$

$$e) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{3^n + 2^n}{6^n};$$

$$f) \sum_{n=1}^{\infty} u_n, \text{ unde } u_n = \sum_{k=1}^n \frac{\sin(2k-1)a}{k^2};$$

$$g) \sum_{n=1}^{\infty} u_n, \text{ unde } u_n = \sum_{k=1}^{n+1} \arctg \frac{1}{2k^2}.$$

#### Exercițiul 9.4.2.

Să se cerceteze dacă seriile următoare satisfac condiția necesară de convergență:

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{n+a}{n+b} \right)^n, \quad a, b \in \mathbb{R};$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} 2^n \cdot \operatorname{tg} \frac{a}{2^n}, \quad a \in \left( 0, \frac{\pi}{2} \right);$$

$$c) \sum_{n=2}^{\infty} n \cdot \ln \left( 1 - \frac{1}{n} \right);$$

$$d) \sum_{n=1}^{\infty} \left( \frac{n^2-1}{n^2+1} \right)^{\frac{n^2-1}{2n+1}}.$$

#### Exercițiul 9.4.3.

Folosind primul și al doilea criteriu al comparației să se studieze natura seriilor:

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n^\alpha}, \quad \alpha \in \mathbb{R}^+;$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt{7n}}{n^2+3n+5};$$

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} \sin \frac{\pi}{n(n+1)};$$

$$d) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(\sqrt{n+1} - \sqrt{n-1})^p}{(\sqrt[3]{8n^4+1} + \sqrt[3]{n^4+2})^q};$$

$$e) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sqrt[3]{n^2+2n+3} - \sqrt[3]{n^2+n+3}}{\sqrt{n(n^3+n^2+2)}};$$

$$f) \sum_{n=1}^{\infty} \ln \frac{1 + \operatorname{tg} \frac{1}{n}}{1 - \operatorname{tg} \frac{1}{n}}.$$

#### Exercițiul 9.4.4.

Folosind criteriile de convergență, să se stabilească natura seriilor:



- a)  $\sum_{n=1}^{\infty} \sqrt{2 - \sqrt{2 + \sqrt{2 + \dots + \sqrt{2}}}}$  (de  $n + 1$  ori se repetă radicalul);
- b)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{3^n} \cdot \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2}$  ;
- c)  $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n}{n+1}\right)^{n^2} \cdot \alpha^n$ ,  $\alpha > 0$ ;
- d)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{a^n \cdot (n!)^2}{(2n)!}$ ,  $a > 0$ ;
- e)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{(a+1)(2a+1)\dots(na+1)}{(b+1)(2b+1)\dots(nb+1)}$ ,  $a > 0$ ;  $b > 0$ ;
- f)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{p(p+1)\dots(p+n-1)}{q(q+1)\dots(q+n-1)} \cdot (\lambda-2)^n$ ,  $p, q > 0$ ;  $\lambda > 2$ ;
- g)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{n!}{a(a+1)\dots(a+n-1)} \cdot \frac{1}{n^\alpha}$ ,  $a > 0$ ;  $\alpha \in \mathbb{R}$ ;
- h)  $\sum_{n=1}^{\infty} a^{1+\frac{1}{2}+\frac{1}{3}+\dots+\frac{1}{n}}$ ,  $a > 0$ ;
- i)  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{1}{\ln^\alpha n}$ ,  $\alpha \in \mathbb{R}$ .

#### Exercițiul 9.4.5.

Să se arate că seria  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{1}{n \cdot 3^{n-1}}$  este convergentă și să se aproximeze suma sa cu trei zecimale exacte.

#### Exercițiul 9.4.6.

Să se arate că seria  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln^3 n}$  este convergentă și să se determine numărul de termeni ce trebuie însumați pentru a obține suma seriei cu trei zecimale exacte.

#### Exercițiul 9.4.7.

Să se cerceteze natura seriilor:

- a)  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} (\sqrt{n+1} - \sqrt{n})$ ;
- b)  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \left(\frac{2n+1}{3n+1}\right)^n$ ;
- c)  $\sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot \sqrt{n} \cdot \ln \frac{n+1}{n-1}$ ;

$$d) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n+1} \cdot \sqrt[n]{n} \cdot \sin \frac{1}{n}.$$

#### Exercițiul 9.4.8.

Să se studieze convergența absolută sau semiconvergența următoarelor serii:

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{n^2}, \quad x \in \mathbb{R};$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos nx}{n^2}, \quad x \in \mathbb{R};$$

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot \frac{\sin n!}{n^2};$$

$$d) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot \frac{1}{n - \ln n};$$

$$e) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^{n-1} \cdot \frac{\operatorname{tg} \frac{n}{5}}{n(n+1)}.$$

#### Exercițiul 9.4.9.

Fie  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  o serie cu termeni pozitivi astfel încât șirul  $(u_n)_{n \geq 1}$  este descrescător, iar  $(a_n)_{n \geq 1}$  un șir crescător divergent de numere naturale în așa fel încât șirul cu termenul general să fie mărginit.

Să se arate că seriile  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$  și  $\sum_{n=1}^{\infty} (a_{n+1} - a_n) \cdot u_n$  au aceeași natură.

#### Exercițiul 9.4.10.

Fie seria  $\sum_{n=1}^{\infty} u_n$ ,  $u_n > 0$  convergentă.

Să se arate că:

$$a) \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_1 + 2u_2 + \dots + nu_n}{n} = 0$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{u_1 + 2u_2 + \dots + nu_n}{n(n+1)} = \sum_{n=1}^{\infty} u_n$$

#### Exercițiul 9.5.1.

Se dă șirul de funcții  $f_n(x) = 1 + x^{2n}$ ,  $x \in \mathbb{R}$  și se cere:

- i) mulțimea de convergență și funcția limită;
- ii) să se arate că nu este uniform convergent pe  $(-1, 1)$ . Să se determine o mulțime de uniform convergență.

**Exercițiul 9.5.2.**

Se dă șirul de funcții:

$$f_n(x) = \frac{1}{n^2 + x^2} + \frac{1}{(n+1)^2 + x^2} + \frac{1}{(n+2)^2 + x^2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Să se studieze convergența.

**Exercițiul 9.5.3.**

Se dă șirul de funcții:

$$f_n(x) = \frac{\sin x}{1^2} + \frac{\sin 2x}{2^2} + \dots + \frac{\sin nx}{n^2}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Să se studieze convergența.

**Exercițiul 9.5.4.**

Fie  $f_n: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f_n(x) = \sin^n x + \cos^n x$ ,  $(\forall) n \geq 1$ .

Să se studieze convergența șirului  $(f_n(x))_{n \geq 1}$ .

**Exercițiul 9.5.5.**

Fie  $f_n(x) = \frac{nx^2}{1+nx^2}$ ,  $x \in \mathbb{R}$ .

Să se studieze convergența șirului.

**Exercițiul 9.5.6.**

Să se determine mulțimea de convergență pentru următoarele serii de funcții:

a)  $\sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{n+1}{n}\right)^n \left(\frac{1-x}{1-2x}\right)^n$ ;

b)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin^n x}{n^\alpha}$ ,  $\alpha \in \mathbb{R}$ ;

c)  $\sum_{n=2}^{\infty} \frac{(-1)^n}{\ln n} \left(\frac{1-x^2}{1+x^2}\right)^n$ ;

d)  $\sum_{n=1}^{\infty} \frac{\ln(1+a^n)}{n}$ ,  $a \geq 0$ .

**Exercițiul 9.5.7.**

Să se studieze caracterul convergenței următoarelor serii de funcții pe mulțimile indicate:

a)  $1 + \sum_{n=1}^{\infty} (x^n - x^{n-1})$ , când:

$$1^0 \quad x \in \left[0, \frac{1}{2}\right]$$

$$2^0 \quad x \in [0, 1]$$

$$b) \quad x + \sum_{n=1}^{\infty} \left[ \frac{x}{1+nx} - \frac{x}{1+(n-1)x} \right], \quad x \in [0, 1]$$

$$c) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\cos \frac{2n\pi}{3} \cdot x}{\sqrt{x^2 + n}}, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$d) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{\sin nx}{\sqrt{n}}, \quad \text{când:}$$

$$1^0 \quad x \in [\alpha, 2\pi - \alpha], \quad \alpha \in (0, 2\pi)$$

$$2^0 \quad x \in [0, 2\pi]$$

$$e) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{arctg} \frac{1}{x^2 + n^4}, \quad x \in \mathbb{R}$$

### Exercițiul 9.5.8.

Este posibilă integrarea termen cu termen a seriei:

$$a) \quad \sum_{n=1}^{\infty} 2x \left[ n^2 \cdot e^{-n^2 x^2} - (n-1)^2 \cdot e^{-(n-1)^2 x^2} \right], \quad x \in [0, 1]?$$

$$b) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \operatorname{arctg} \frac{1}{x^2 + n^2}, \quad x \in [a, b]?$$

### Exercițiul 9.5.9.

Este posibilă derivarea termen cu termen a seriei:

$$\sum_{n=1}^{\infty} \left[ e^{-nx^2} - e^{-(n-1)x^2} \right], \quad x \in [0, 1]?$$

### Exercițiul 9.5.10.

Să se determine mulțimea de convergență pentru următoarele serii de puteri:

$$a) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \left[ 1 - (-2)^n \right] x^n$$

$$b) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^n}{2^n + 3^n}$$

$$c) \quad 1 + \sum_{n=1}^{\infty} \frac{(2n-1)!}{n!} \cdot x^n$$

$$d) \quad \sum_{n=1}^{\infty} \sqrt[n]{n!} \cdot x^n$$

$$e) \sum_{n=1}^{\infty} \left(\frac{x}{n}\right)^n$$

$$f) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{n+2}{n^2+1} (x-2)^n$$

**Exercițiul 9.5.11.**

Să se determine mulțimea de convergență și suma următoarelor serii de puteri:

$$a) \sum_{n=1}^{\infty} (-1)^n (n+1)^2 \cdot x^n$$

$$b) \sum_{n=1}^{\infty} (n+1)(n+2) \cdot x^n$$

$$c) \sum_{n=1}^{\infty} n^3 \cdot x^n$$

$$d) \sum_{n=1}^{\infty} \frac{x^{4n}}{(4n)!}$$

**Exercițiul 9.5.12.**

Să se determine dacă funcțiile următoare sunt dezvoltate în serii de puteri și să se găsească această dezvoltare, specificându-se intervalul în care este valabilă:

$$a) f(x) = \sin^2 x, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$b) f(x) = \frac{x^2 + x + 1}{(x-1)^2(x-2)}, \quad x \in \mathbb{R} \setminus \{1, 2\}$$

$$c) f(x) = \ln(1 - x + x^2), \quad x \in \mathbb{R}$$

$$d) f(x) = \sqrt{x + a^2}, \quad x \geq -a^2$$

$$e) f(x) = \frac{1}{1 - x + x^2}, \quad x \in \mathbb{R}$$

$$f) f(x) = \ln x, \quad x_0 = 2$$

**Exercițiul 9.6.1.**

Se consideră funcția  $F: X \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ ,  $F(x) = (f_1(x), f_2(x))$ .

Să se calculeze  $\lim_{x \rightarrow 0} F(x)$  dacă:

$$a) F(x) = \left( \frac{e^{x^2} - \cos x}{x^2}, \frac{\sqrt[3]{1+x} - \sqrt[3]{1-x}}{x} \right)$$

$$b) F(x) = \left( \frac{1 - \cos x \cdot \cos 2x \dots \cos nx}{x^2}, \frac{\arcsin x - \operatorname{arctg} x}{x^3} \right)$$

$$c) F(x) = \left( \frac{\sqrt[n]{1+x} - 1}{x}, \frac{1 - \cos^3 x}{x \cdot \sin^2 x} \right)$$

### Exercițiul 9.6.2.

Se consideră funcția  $F : X \subset \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^2$ .

Să se calculeze  $\lim_{x \rightarrow \infty} F(x)$  dacă:

$$a) F(x) = \left( (1+x)^{\frac{1}{mx}}, \left( \cos \frac{n}{x} \right)^{x^n} \right)$$

$$b) F(x) = \left( \left( \frac{x^m}{x^m - 1} \right)^{\operatorname{ctg} \left( \frac{a}{x} \right)^m}, \frac{\ln(x^2 + e^x)}{\ln(x^4 + e^{2x})} \right)$$

$$c) F(x) = \left( \frac{\ln(1 + e^x)}{x}, \left( \frac{e^x - e^{-x}}{e^x + e^{-x}} \right)^x \right)$$

### Exercițiul 9.6.3.

Folosind definiția limitei să se arate că:

$$a) \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 2}} \frac{x^2}{y} = \frac{1}{2}$$

$$b) \lim_{\substack{x \rightarrow 1 \\ y \rightarrow 2}} \frac{x^2}{xy + 1} = \frac{4}{5}$$

### Exercițiul 9.6.4.

Fie  $f : \mathbb{R} = (\mathbb{R} \setminus \{0\}) \rightarrow \mathbb{R}$ ,  $f(x, y) = x \cdot \sin \frac{1}{x}$

a) Să se studieze existența limitei în  $(0,0)$  și  $(1,0)$ .

b) Să se studieze existența limitelor iterate în aceste puncte.

### Exercițiul 9.6.5.

Să se arate că pentru funcțiile de mai jos nu există  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x, y)$ .

$$a) f : \mathbb{R}^2 \setminus \{0,0\} \rightarrow \mathbb{R}, f(x, y) = \frac{x^2 \cdot y^2}{x^4 + y^4}$$

$$b) f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \rightarrow \mathbb{R}, f(x, y) = \frac{xy^2}{x^2 + y^4}$$

$$c) f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(x,y) | x+y=0\} \rightarrow \mathbb{R}, f(x,y) = \frac{x^3 \cdot y^3}{x^3 + y^3}$$

**Exercițiul 9.6.6.**

Pentru funcțiile de mai jos să se calculeze  $\lim_{\substack{x \rightarrow 0 \\ y \rightarrow 0}} f(x,y)$ .

$$a) f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \rightarrow \mathbb{R}, f(x,y) = \frac{x^2 \cdot y}{x^2 + y^2}$$

$$b) f : \mathbb{R}_+^* \times \mathbb{R}_+^* \rightarrow \mathbb{R}, f(x,y) = \frac{1}{x \cdot y} \cdot \operatorname{tg} \frac{x \cdot y}{1 + xy}$$

$$c) f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \rightarrow \mathbb{R}, f(x,y) = \frac{1}{x^4 + y^4} \cdot e^{-\frac{1}{x^2 + y^2}}$$

$$d) f : \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x,y) = \left( 1 - \frac{\cos(x^3 + y^3)}{x^2 + y^2}, \frac{\sin(x^3 + y^3)}{x^2 + y^2} \right)$$

**Exercițiul 9.6.7.**

Să se studieze continuitatea parțială a funcțiilor:

$$a) f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x,y) = \begin{cases} \frac{3x^2y^2}{x^4 + y^4}; & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & ; (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

$$b) f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x,y) = \begin{cases} e^{\frac{x}{x^2 + y^2}}; & (x,y) \neq (0,0) \\ 1 & ; (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

$$c) f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x,y) = \begin{cases} x^2 \cdot \ln(x^2 + y^2); & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & ; (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

**Exercițiul 9.6.8.**

Să se studieze continuitatea funcțiilor:

$$a) f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x,y) = \begin{cases} \frac{y \cdot e^{-\frac{1}{x^2}}}{y^2 + e^{-\frac{1}{x^2}}}; & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & ; (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

$$b) f : \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x,y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \cdot \sin \frac{1}{xy}; & x \cdot y \neq 0 \\ 0 & ; x \cdot y = 0 \end{cases}$$

$$c) f: \mathbb{R}_+ \times \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}, f(x,y) = \begin{cases} (1+xy)^{\frac{1}{\sqrt{x+\sqrt{y}}}}; & (x,y) \neq (0,0) \\ 1 & ; (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

**Exercițiul 9.6.9.**

Să se studieze continuitatea funcțiilor:

a)

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2,$$

$$f(x,y) = \begin{cases} \left( xy \cdot \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}, (x^2 + y^2) \cdot \ln(x^2 + y^2) \right); & (x,y) \neq (0,0) \\ (0,0) & ; (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

b)

$$f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}^2,$$

$$f(x,y) = \begin{cases} \left( (x^2 + y^2) \cdot \cos \frac{1}{x^2 + y^2}, \frac{\sin(x^3 + y^3)}{x^2 + y^2} \right); & (x,y) \neq (0,0) \\ (0,0) & ; (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

**Exercițiul 9.6.10.**

Să se discute după  $\alpha \in \mathbb{R}$  continuitatea funcțiilor:

$$a) f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x,y) = \begin{cases} \frac{|x|^\alpha \cdot y}{x^2 + y^2}; & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & ; (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

$$b) f: \mathbb{R}^2 \rightarrow \mathbb{R}, f(x,y) = \begin{cases} \frac{\sin(x^{2+\alpha} \cdot y^2)}{x^4 + y^4}; & (x,y) \neq (0,0) \\ 0 & ; (x,y) = (0,0) \end{cases}$$

**Exercițiul 9.6.11.**

Care din funcțiile de mai jos se pot prelungi prin continuitate?

$$a) f: \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \rightarrow \mathbb{R}, f(x,y) = \frac{x^2 + xy + y^2}{x^2 + y^2}$$

$$b) f: \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \rightarrow \mathbb{R}, f(x,y) = e^{\frac{|x-y|}{x^2 - 2xy + y^2}}$$

$$c) f: \mathbb{R}^2 \setminus \{(0,0)\} \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x,y) = \left( \frac{\ln(1 + x^2 y^2)}{x^2 + y^2}, (1 + \sin^2 y^2)^{\frac{1}{x^2 + y^2}} \right)$$

**Exercițiul 9.6.12.**

Să se studieze continuitatea uniformă a funcțiilor:

$$a) f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}, f(x,y) = \sin x$$



- b)  $f: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}, f(x, y) = x \cdot \sin^2 x^2$   
 c)  $f: [1, \infty) \rightarrow \mathbb{R}, f(x, y) = \sqrt[n]{x}, n \in \mathbb{N}$   
 d)  $f: (1, 2) \times (1, 2) \rightarrow \mathbb{R}^2, f(x, y) = \left( \frac{x-y}{x+y}, \frac{x}{y} \right)$

### Exercițiul 9.7.1.

Pornind de la definiție, să se calculeze derivatele și derivatele parțiale ale funcțiilor de mai jos în punctele specificate:

- a)  $f(x) = \sqrt{5x+1}, x_0 = 3$   
 b)  $f(x) = \ln(x^2 + 5x), x_0 = 1$   
 c)  $f(x, y) = \sqrt{\sin^2 x + \sin^2 y}, f'_x\left(\frac{\pi}{4}, 0\right), f'_y\left(\frac{\pi}{4}, \frac{\pi}{4}\right)$   
 d)  $f(x, y) = e^{\sin xy}, f'_x\left(1, \frac{\pi}{4}\right), f'_y(1, 0)$   
 e)  $f(x, y) = \sqrt[3]{x^2 y}, f'_x(-2, 2), f'_y(-2, 2), f''_{xy}(-2, 2)$

### Exercițiul 9.7.2.

Să se studieze derivabilitatea funcțiilor:

a)  $f: \mathbb{R}_+ \rightarrow \mathbb{R}^3, f(x) = (f_1(x), f_2(x), f_3(x))$

$$\text{unde } f_1(x) = \begin{cases} \ln(x^2 + 3x); & 0 < x < 1 \\ \frac{5}{4}(x-1) + 2\ln 2; & x \geq 1 \end{cases}$$

$$f_2(x) = \begin{cases} \ln^3 x; & 0 < x \leq e \\ ax + b; & x > e \end{cases}$$

$$f_3(x) = |\ln x - 1|; x > 0$$

b)  $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{R}^3, f(x) = (f_1(x), f_2(x), f_3(x))$

$$\text{unde } f_1(x) = \begin{cases} 2^{\frac{1}{x-1}} & ; x < 1 \\ 0 & ; x = 1 \\ \ln(x^2 - 2x + x); & x > 1 \end{cases}$$

$$f_2(x) = \max_{x \in \mathbb{R}} [1 - x^3, 3|x|]$$

$$f_3(x) = \min_{x \in \mathbb{R}} \{x^2 + 3x, x\}$$

### Exercițiul 9.7.3.

Să se calculeze derivatele următoarelor funcții:

a)  $f(x) = (f_1(x), f_2(x), f_3(x))$  unde:

$$f_1(x) = \sqrt{\frac{x^2-1}{x^2+1}}; f_2(x) = \sqrt[3]{1+\sqrt[3]{x^2}}; f_3(x) = e^{\sin \frac{1}{x}}$$

b)  $f(x) = (f_1(x), f_2(x), f_3(x))$  unde:

$$f_1(x) = 2^{\operatorname{tg}^3 x^2}; f_2(x) = \frac{x^2-1}{x}; f_3(x) = \arccos \frac{1}{\sqrt{x}}$$

c)  $f(x) = (f_1(x), f_2(x), f_3(x))$  unde:

$$f_1(x) = \operatorname{arctg} \frac{x}{1+\sqrt{1-x^2}}; f_2(x) = \operatorname{arctg} \frac{a-2x}{2\sqrt{ax-x^2}}; a > 0$$

#### Exercițiul 9.7.4.

Să se demonstreze următoarele egalități:

a)  $\arcsin \sqrt{1-x^2} + \arccos x = \pi, x \in (-1, 0)$

b)  $\operatorname{arctg} x + \operatorname{arctg} \frac{1-x}{1+x} = \begin{cases} \frac{\pi}{4} & ; x \in (-1, \infty) \\ -\frac{3\pi}{4} & ; x \in (-\infty, -1) \end{cases}$

c)  $\arcsin x + 3 \arccos x + \arcsin 2x\sqrt{1-x^2} = \frac{3\pi}{2}, x \in \left(-\frac{\sqrt{2}}{2}, \frac{\sqrt{2}}{2}\right)$

#### Exercițiul 9.7.5.

Să se calculeze derivatele de ordinul  $n$  pentru funcțiile:

a)  $f(x) = (f_1(x), f_2(x), f_3(x))$  unde:

$$f_1(x) = \frac{1+x}{1-x}; f_2(x) = \ln \frac{1+x}{1-x}; f_3(x) = \frac{1}{2x^2-3x+5}$$

b)  $f(x) = (f_1(x), f_2(x), f_3(x))$  unde:

$$f_1(x) = x^3 \cdot e^{mx}; f_2(x) = \ln \sqrt[5]{(1-5x+6x^2)^x}; f_3(x) = \sin 3x \cdot \cos^2 x$$

#### Exercițiul 9.7.6.

Să se arate că funcțiile următoare satisfac relația lui Euler și să se verifice prin calculul direct al derivatelor relația găsită:

a)  $f(x, y, z) = \sqrt{x^2 + y^2 + z^2} \cdot \ln \frac{x}{y}$

b)  $f(x, y, z) = \frac{x}{y} \cdot e^{\frac{x}{y}}$

c)  $f(x, y, z) = \frac{x+y+z}{(x^2+y^2+z^2)^{\frac{1}{2}}}$

**Exercițiul 9.7.7.**

Să se calculeze derivatele specificate pentru următoarele funcții:

$$a) F(x, y) = \left( \ln(ax + by), \frac{x + y}{x - y} \right); \frac{\partial^{n+m} F}{\partial x^n \cdot \partial y^m}$$

$$b) F(x, y) = \left( (x^2 + y^2) \cdot e^{x+y}, \cos(x + y) \right); \frac{\partial^{n+m} F}{\partial x^n \cdot \partial y^m}$$

$$c) F(x, y) = \left( \sin(ax + by), \sin^6(ax + by) + \cos^6(ax + by) \right); \frac{\partial^{n+m} F}{\partial x^n \cdot \partial y^m}$$

**Exercițiul 9.7.8.**

Presupunând că funcțiile  $\varphi$  și  $\psi$  sunt derivabile de un număr suficient de ori, să se verifice următoarele egalități:

$$a) y \cdot \frac{\partial z}{\partial x} - x \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = 0; z = \varphi(x^2 + y^2)$$

$$b) x^2 \cdot \frac{\partial z}{\partial x} - xy \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = 3xz; z = \frac{y^2}{3x} \varphi(x \cdot y)$$

$$c) (x^2 - y^2) \cdot \frac{\partial z}{\partial x} + xy \cdot \frac{\partial z}{\partial y} = xyz; z = e^y \cdot \varphi\left(y \cdot e^{\frac{x^2}{2y^2}}\right)$$

$$d) x \cdot \frac{\partial u}{\partial x} + y \cdot \frac{\partial u}{\partial y} + z \cdot \frac{\partial u}{\partial z} = u + \frac{xy}{z}; u = \frac{xy}{z} \cdot \ln x + x \cdot \varphi\left(\frac{y}{x}, \frac{z}{x}\right)$$

$$e) x^2 \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + 2xy \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial y \partial x} + y^2 \cdot \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0; u = \varphi\left(\frac{y}{x}\right) + x \cdot \psi\left(\frac{y}{x}\right)$$

**Exercițiul 9.7.9.**

Pornind de la definiția diferențialei să se arate că funcția:

$$f(x, y) = 27x^3 + 54x^2z + 36xy^2 - 8z^3$$

este diferențiabilă pe  $\mathbb{R}^2$ .

**Exercițiul 9.7.10.**

Se consideră funcția:

$$f(x, y) = \begin{cases} xy \cdot \frac{x^2 - y^2}{x^2 + y^2}; & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & ; (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

Să se arate că  $f$  este diferențiabilă pe  $\mathbb{R}^2$ .

Să se arate că  $f$  admite în orice punct derivate parțiale de ordinul doi.

Să se arate că  $f''_{xy}$  și  $f''_{yx}$  nu sunt continue în origine.

**Exercițiul 9.7.11.**

Să se calculeze diferențialele de ordinul indicat pentru următoarele funcții:

a)  $d^3u$ ;  $u = x^3 + y^3 - 3xy(x - y)$

b)  $d^3u$ ;  $u = \sin(x^2 + y^2)$

c)  $d^4u$ ;  $u = \ln(x^x \cdot y^y \cdot z^z)$

d)  $d^n u$ ;  $u = e^{ax+by}$

e)  $d^n u$ ;  $u = e^{ax+by+cz}$

**Exercițiul 9.7.12.**

Să se calculeze diferențialele de ordinul doi pentru următoarele funcții:

a)  $F(t) = f(t^2, \ln t)$

b)  $G(t) = g(t^2, \ln t, e^t)$

c)  $U(x, y, z) = u(x + y + z, x^2 + y^2 + z^2)$

**Exercițiul 9.7.13.**

Să se scrie formula lui Taylor pentru funcțiile de mai jos în punctele specificate:

a)  $f(x, y) = e^{x+y}$  în punctul  $(1, -1)$

b)  $f(x, y) = e^x \cdot \sin y$  în punctul  $(0, 0)$ , formula lui Taylor de ordinul trei.

**Exercițiul 9.7.14.**

Să se determine punctele de extrem local pentru funcțiile:

a)  $f(x, y) = xy + \frac{50}{x} + \frac{20}{y}$ ;  $x > 0$ ;  $y > 0$

b)  $f(x, y) = xy \ln(x^2 + y^2)$ ;  $(xy) \in \mathbb{R}^2 \setminus \{(0, 0)\}$

c)  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 - xy + x - 2z$

d)  $f(x, y, z) = x + \frac{y^2}{4x} + \frac{z^2}{y} + \frac{2}{z}$ ;  $x > 0$ ;  $y > 0$ ;  $z > 0$

e)  $f(x, y, z) = \frac{1}{x} + \frac{x}{y} + \frac{y}{z} + \frac{z}{16}$ ;  $x > 0$ ;  $y > 0$ ;  $z > 0$

**Exercițiul 9.7.15.**

Să se găsească punctele de extrem și extremele funcțiilor cu legăturile specificate:

a)  $f(x, y) = x^m + y^m$  ( $x \geq 0, y \geq 0, m > 1$ ) cu condiția  $x + y - 2 = 0$

b)  $f(x, y) = x^2 + xy + y^2 + x - y + 1$  cu condiția  $x^2 + y^2 - 1 = 0$

c)  $f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2$  cu condiția  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0$ ,  
 ( $a > 0, b > 0, c > 0$ )

d)  $f(x, y, z) = xyz$  cu condițiile  $\begin{cases} x + y - z - 3 = 0 \\ x - y - z - 8 = 0 \end{cases}$

e)  $f(x, y, z) = xyz$  cu condițiile  $\begin{cases} x + y + z = 5 \\ xy + yz + zx = 8 \end{cases}$

**Exercițiul 9.8.1.**

Să se calculeze derivata întâi și a doua a funcțiilor definite implicit de următoarele egalități:

a)  $x^3 + y^3 - 3axy = 0$ ;  $y = y(x)$

b)  $xy - \ln chxy$ ;  $y = y(x)$

**Exercițiul 9.8.2.**

Să se calculeze derivata întâi și a doua ale funcției  $y = y(x)$  definită implicit de ecuația:  $\operatorname{arctg} \frac{y}{x} - \ln(x^2 + y^2) = 0$ .

**Exercițiul 9.8.3.**

Să se calculeze  $y'$  din relația:  $x^y - y^x = 0$ .

**Exercițiul 9.8.4.**

Să se calculeze  $y''$  din relația:  $\operatorname{ch} 2y - 2e^{x^2} = 0$ .

**Exercițiul 9.8.5.**

Să se calculeze  $y''$  din relația:  $x + \sqrt{y+z} + \sqrt[3]{y-x} = 0$ .

**Exercițiul 9.8.6.**

Să se calculeze  $y''$  din relația:  $y \cdot e^{-y} - x = 0$ .

**Exercițiul 9.8.7.**

Să se calculeze derivatele parțiale de ordinul întâi și doi ale funcției  $z = z(x, y)$  definită implicit de egalitățile următoare:

a)  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} - 1 = 0$

b)  $z \cdot e^{-xz} + y \cdot e^{-xy} - \arcsin \frac{z}{x} = 0$

**Exercițiul 9.8.8.**

Știind că  $z = z(x, y)$  este definită implicit de ecuația:

$$a) \ln(x^2 + yz) - 4 \cdot e^{-z^2x} = 0$$

$$b) \operatorname{tg} \frac{zx}{2} - \operatorname{ch} \frac{zy}{2} = 0$$

să se calculeze derivatele parțiale de ordinul întâi și doi.

### Exercițiul 9.8.9.

O funcție  $u = u(x, y, z, t)$  este definită implicit de ecuația:  $f(x, y, z, t, u) = 0$ .

Să se arate că:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x \partial y} = \frac{1}{\left(\frac{\partial f}{\partial u}\right)^3} \cdot \begin{vmatrix} 0 & f'_x & f'_u \\ f'_y & f''_{xy} & f''_{yu} \\ f'_u & f''_{xu} & f''_{u^2} \end{vmatrix}$$

### Exercițiul 9.8.10.

$$\text{Relațiile } \begin{cases} x + y + z - 1 = 0 \\ x^2 + y^2 + z^2 - 2t = 0 \\ x^3 + y^3 + z^3 - t^3 = 0 \end{cases} \text{ definesc pe } x, y, z \text{ ca funcții de } t.$$

Să se calculeze:  $\frac{dx}{dt}, \frac{dy}{dt}, \frac{dz}{dt}$ .

### Exercițiul 9.8.11.

$$\text{Relațiile } \begin{cases} x^2 + y^2 + z^2 - R^2 = 0 \\ x^3 + y^3 + z^3 - 3xyz - a^3 = 0 \end{cases} \text{ definesc pe } y, z \text{ ca funcții de } x.$$

Să se calculeze:  $\frac{dy}{dx}$  și  $\frac{dz}{dx}$ .

### Exercițiul 9.8.12.

Să se arate că funcția  $z = z(x, y)$  definită implicit de ecuația  $F\left(\frac{x}{z}, \frac{y}{z}\right) = 0$ ,

$z \neq 0$  unde  $F(u, v)$  este derivabilă parțial în raport cu  $u$  și  $v$  verifică relația:

$$x \cdot z'_x + y \cdot z'_y = z$$

### Exercițiul 9.8.13.

Să se calculeze  $z'_x, z'_y, z''_{x^2}$  dacă  $z = z(x, y)$  este definită implicit de ecuația:

$$F(x, x + y, x + y + z) = 0$$

unde  $F(u, v, w)$  este o funcție care admite derivate parțiale de ordinul întâi și doi în raport cu  $u, v, w$ .

**Exercițiul 9.8.14.**

Să se arate că ecuațiile de mai jos definesc implicit o funcție  $z = f(x, y)$  în vecinătatea punctelor indicate:

a)  $xy + yz + z^3x = 1; (1, 1, 0)$

b)  $\frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} + \frac{z^2}{c^2} = 1; a, b, c > 0; (0, 0, c)$

c)  $z^3 - 3xyz = a^3; a \neq 0; (0, 1, a)$

d)  $x + y + 2z = e^z; (1, 0, 0)$

e)  $2z = \sqrt{x^2 + y^2} \cdot \operatorname{tg} \frac{z}{\sqrt{x^2 + y^2}}; (1, 1, 0)$

f)  $(x + y) \cdot e^z - xy - z = 0; (2, 2, 0)$

**Exercițiul 9.8.15.**

Să se afle extremele funcției  $y = f(x)$  definită de ecuațiile de mai jos:

a)  $x^2 + 2y^2 - 2xy + 4x - y + 6 = 0$

b)  $y^2 + 2x^2y - 3 = 0$

c)  $x^3 + y^3 - 3x^2y - 3 = 0$

**Exercițiul 9.8.16.**

Să se găsească punctele de extrem ale funcțiilor  $z = f(x, y)$  definite de ecuațiile:

a)  $2x^2 + 6y^2 + 2z^2 + 8xz - 4x - 8y + 3 = 0$

b)  $x^3y - 3xy^2 + y^2 + z^2 + 6x + 7y - 3z - 14 = 0$

c)  $x^4 + y^4 + z^4 = 2(x^2 + y^2 + z^2)$

**Exercițiul 9.8.17.**

Să se arate că funcțiile  $\begin{cases} u = x^2 + y^2 + z^2 \\ v = x + y + z \\ w = xy + yz + zx \end{cases}$  sunt în dependență funcțională

și să se determine relația dintre ele.

**Exercițiul 9.8.18.**

Să se arate că funcțiile 
$$\begin{cases} y_1 = x_1x_3 + x_2x_4 \\ y_2 = x_1x_4 + x_2x_3 \\ y_3 = x_1^2 + x_2^2 - x_3^2 - x_4^2 \\ y_4 = x_1^2 + x_2^2 + x_3^2 + x_4^2 \end{cases}$$
 sunt în dependență

funcțională și să se determine relația dintre ele.

**Exercițiul 9.8.19.**

Se consideră funcțiile:

$$u = f\left(\frac{y-z}{x+z}\right); v = f\left(\frac{x+2y+z}{x+z}\right); w = f\left(\frac{x-y}{y+z}\right)$$

unde  $f, g, h$  sunt bijecții.

Să se arate că  $u, v, w$  sunt în dependență funcțională și să se determine relația dintre ele.

**Exercițiul 9.8.20.**

Fie funcțiile 
$$\begin{cases} u = f\left(\frac{y+z}{y+z-x}\right) \\ v = g\left(\frac{z+x}{z+x-y}\right) \\ w = h\left(\frac{x+y}{x+y-z}\right) \end{cases}$$
 unde  $f, g, h$  sunt bijecții.

Să se arate că  $u, v, w$  sunt în dependență funcțională și să se determine relația dintre ele.

**Exercițiul 9.8.21.**

Fie funcțiile 
$$\begin{cases} u = \frac{a_1x + a_2y + a_3z}{a_1^1x + a_2^1y + a_3^1z} \\ v = \frac{b_1x + b_2y + b_3z}{b_1^1x + b_2^1y + b_3^1z} \\ w = \frac{c_1x + c_2y + c_3z}{c_1^1x + c_2^1y + c_3^1z} \end{cases}$$
.



Să se arate că  $u$ ,  $v$ ,  $w$  sunt în dependență funcțională și să se determine relația dintre ele.

**Exercițiul 9.8.22.**

Să se determine funcția  $\varphi$  derivabilă, astfel încât

$$u = \varphi(x+y), v = \frac{\varphi(x) + \varphi(y)}{1 - \varphi(x) \cdot \varphi(y)}$$

să fie în dependență funcțională.

**Exercițiul 9.8.23.**

Să se determine funcția  $\varphi$ , astfel ca

$$u = \varphi(x+y), v = \varphi(x) \cdot \varphi(y)$$

să fie în dependență funcțională.

## BIBLIOGRAFIE

1. Craiu M., Tănase V., **Analiză matematică**, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1974
2. Demidovitch B., **Recueil d'exercices et problemes d'analyse mathématique**, Editions Mir, Moscou, 1970
3. Dogaru Gh., Colțescu I., **Exerciții și probleme de analiză matematică**, Institutul de Marină "Mircea cel Bătrân", Constanța, 1990
4. Flondor D., Donciu N., **Culegere de probleme - Algebră și analiză matematică**, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1979
5. Flondor P., Stănășilă O., **Leccióni de analiză matematică**, Editura ALL, București, 1993
6. Niculescu M., Dinculeanu N., Marcus S., **Analiză matematică**, vol. I și II, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1971
7. Roșculeț M., **Culegere de probleme de analiză matematică**, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1968
8. Roșculeț M., **Analiză matematică**, Editura Didactică și Pedagogică, București, 1984
9. Dogaru Gh., Colțescu I., **Analiză matematică. Calcul diferențial**, Editura Academiei Navale "Mircea cel Bătrân", Constanța, 1998
10. Dogaru Gh., Andrei T., Colțescu I., **Exerciții și probleme de analiză matematică**, vol. I, Academiei Navale "Mircea cel Bătrân", Constanța, 1990